

**THÀNH PHẦN:** mỗi viên nang mềm có chứa:

- \* Sodium Chondroitin Sulfate..... 100mg
- \* Fursultiamine..... 13mg
- \*  $\gamma$ -Oryzanol..... 5mg
- \* Tocopherol Acetat..... 50mg
- \* Nicotinamide..... 50mg
- \* Pyridoxine Hydrochloride..... 25mg
- \* Calcium Pantothenate..... 15mg
- \* Riboflavin Butyrate..... 6mg
- \* Garlic ext (100→1)..... 10mg
- \* Cyanocobalamin..... 30 $\mu$ g
- \* Tá dược: ..... vừa đủ 1 viên.

### CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC ĐỘNG HỌC:

- Thuốc được hấp thu qua dạ dày, ruột và đào thải qua đường tiểu tiện và đại tiện.

### CHỈ ĐỊNH:

**Thuốc được chỉ định trong những trường hợp sau:**

- **Cung cấp vitamin nhóm B, trong các trường hợp: cơ thể mệt mỏi, trong quá trình bị ốm hoặc sau khi ốm dậy, phụ nữ mang thai, cho con bú.**
- **Cải thiện các triệu chứng sau: Đau dây thần kinh, đau cơ, viêm khớp (đau lưng...), tay chân bị tê, mỏi mắt.**

- **Bệnh beri-beri.**

### LIỀU LƯỢNG CÁCH DÙNG:

- Người lớn, trẻ em trên 8 tuổi: 1viên/lần x 2 lần/ngày

### CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Bệnh nhân mẫn cảm với các thành phần của thuốc
- Trẻ em dưới 8 tuổi
- Không dùng cùng thuốc với Levodopa

### TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

- Ngừng sử dụng thuốc và liên hệ với bác sĩ hoặc dược sĩ nếu xảy ra viêm miệng.
- Khi dùng liều cao có thể tăng nhanh vết loét tiêu hoá hoặc gây ra tăng acid uric huyết, tổn thương gan.
- Khi dùng liều cao, trong thời gian dài Pyridoxine (50mg - 2g/ngày) có thể gây ra các triệu chứng về thần kinh.

**Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.**

### NHỮNG LƯU Ý ĐẶC BIỆT VÀ CẢNH BÁO KHI SỬ DỤNG THUỐC:

- Dùng đúng liều chỉ định.
- Ngừng sử dụng và liên hệ với bác sĩ hoặc dược sĩ nếu các triệu chứng không được cải thiện trong vòng 1 tháng dùng thuốc.

### TƯƠNG TÁC VỚI CÁC THUỐC KHÁC, CÁC DẠNG TƯƠNG TÁC KHÁC:

- Chưa thấy có

### SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

- Chưa có nghiên cứu đầy đủ đối với phụ nữ mang thai. Thuốc này có thể được sử dụng cho phụ nữ sắp hoặc đang mang thai nếu hiệu quả điều trị tốt cho bào thai.

### Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc:

- Chưa có nghiên cứu có tính độ tin cậy về ảnh hưởng của thuốc khi đang lái xe và vận hành máy móc. Nên tham khảo ý kiến của bác sĩ và dược sĩ khi sử dụng thuốc.

### THẬN TRỌNG TRONG BẢO QUẢN:

- Tránh xa tầm tay trẻ em
- Không được để chung với các thuốc khác để tránh việc sử dụng nhầm lẫn và giảm chất lượng của thuốc.
- Tránh nhiệt độ và độ ẩm. Bảo quản dưới 25°C

### TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG:

Tiêu chuẩn nhà sản xuất

**BẢO QUẢN:** Bảo quản trong hộp kín tránh ánh sáng mặt trời

**THỜI HẠN SỬ DỤNG:** Trong vòng 03 năm kể từ ngày sản xuất