



TrungTamThuoc.com

THANH HUYẾT TIÊU ĐỘC P/H

Thành phần: (cho 1 lọ x 250ml)

Mỗi lọ chứa 250ml cao lỏng (1:2) được chiết xuất từ 155g dược liệu đã qua chế biến gồm:	
Huang lien (<i>Rhizoma Coptidis</i>)	15g
Ké đầu ngựa (<i>Fructus Xanthii strumarii</i>)	20g
Lien kiều (<i>Fructus Forsythiae suspensae</i>)	20g
Bồ công anh (<i>Herba Lactucae indicae</i>)	10g
Bồ bồ (<i>Herba Adenosmatis indicae</i>)	50g
Kim ngân hoa (<i>Flos Lonicerae</i>)	20g
Chí tử (<i>Fructus Gardeniae</i>)	10g
Hồng bá (<i>Cortex Phellodendri</i>)	10g
Tá dược (natri benzoat, đường kính, nước tinh khiết)	vừa đủ 250ml

Dạng bào chế: Cao lỏng.

Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 250ml.

Chỉ định:

- Mắt gan, giải độc, thanh huyết nhiệt. Chủ trị:
- Mẩn ngứa, dị ứng, nổi mề đay.
- Phụ nữ sạm da, nám mă, da khô ráp.
- Người bị táo bón, chức năng gan suy giảm.
- Trẻ em mun nhọt, rôm sẩy.

Cách dùng & liều dùng:

- Ngày uống 2 - 3 lần, uống trước bữa ăn:
- Trẻ dưới 6 tuổi, mỗi lần 10 - 15ml (2 thìa cà phê).
- Trẻ từ 6 - 14 tuổi, mỗi lần 15 - 20ml (3 thìa cà phê).
- Trẻ từ 14 tuổi trở lên và người lớn, mỗi lần 25 - 30ml (2 thìa canh).

Tác dụng phụ:

Cho đến nay, vẫn chưa có tài liệu nào báo cáo về tác dụng không mong muốn của thuốc. Nếu thấy có bất kỳ tác dụng phụ nào trong quá trình dùng thuốc, cần thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ về những tác dụng không mong muốn này.

Chống chỉ định: Không dùng thuốc cho người tỳ vị hư hàn.

Thận trọng: Thận trọng khi dùng thuốc cho bệnh nhân tiểu đường.

Dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú: Hiện vẫn chưa có tài liệu nào báo cáo về trường hợp dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú.

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Hiện vẫn chưa có bằng chứng về tác động của thuốc lên khả năng lái xe và vận hành máy móc.

Tương tác với các thuốc khác và các loại tương tác khác: Trong thời gian sử dụng thuốc, không nên ăn các thức ăn ca nô, tôm, cua, cá và các đồ uống có cồn như rượu, bia...

Quá liều và cách xử trí: Cho đến nay, vẫn chưa có tài liệu nào báo cáo về trường hợp dùng thuốc quá liều. Khi dùng thuốc quá liều, nếu thấy có dấu hiệu bất thường, cần đưa ngay bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để có biện pháp xử trí kịp thời.

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất. Nếu thuốc bị mốc, biến màu hoặc thấy có hiện tượng lạ thì phải báo cho nhà sản xuất. Sau khi mở nắp lọ thuốc, nên sử dụng trong vòng không quá 1 tháng kể từ ngày mở nắp.

Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.

Tiêu chuẩn: TCCS.

Thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến của bác sĩ.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Để xa tầm tay trẻ em.

TUQ.CỤC TRỰC

P.TRƯỞNG PHÒ

Đỗ Minh Gi

Sản phẩm này được sản xuất và phân phối bởi:

Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng

Trụ sở: Số 96-98 Nguyễn Việt Xuân, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Nhà máy: Cụm công nghiệp Thanh Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội

Website: www.dongduocphuchung.com.vn

Điện thoại: 04. 33824177 - 33826222

Fax: 04. 33978024