

## TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

### THANH HUYẾT TIÊU ĐỘC P/H

**Thành phần:** (cho 1 viên)

|   |        |
|---|--------|
| Cao đặc Hoàng liên ( <i>Extractum rhizomae coptidis</i> )     | : 36mg |
| (tương đương với 300mg dược liệu)                             |        |
| Cao đặc Hoàng bá ( <i>Extractum corticis phellodendri</i> )   | : 30mg |
| (tương đương với 300mg dược liệu)                             |        |
| Cao đặc Hoàng cầm ( <i>Extractum radialis scutellariae</i> )  | : 30mg |
| (tương đương với 300mg dược liệu)                             |        |
| Cao đặc Bồ bồ ( <i>Extractum herbae adenosmatis indiani</i> ) | : 50mg |
| (tương đương với 400mg dược liệu)                             |        |
| Cao đặc Kim ngân hoa ( <i>Extractum fli lonicerae</i> )       | : 40mg |
| (tương đương với 400mg dược liệu)                             |        |
| Cao đặc Chi tử ( <i>Extractum fructi gardeniae</i> )          | : 10mg |
| (tương đương với 100mg dược liệu)                             |        |

Tá dược (Avicel, tinh bột sắn, calci carbonat, magnesi stearat, đường kính, talc, lactose, PVP K30, nipagin, nipasol, màu Erythrosin, sắt oxyd đỏ, sáp ong trắng, carnauba wax).....vừa đủ 1 viên

**Dạng bào chế:** Viên nén bao đường.

**Quy cách đóng gói:** Hộp 1 lọ x 60 viên, hộp 2 vỉ x 20 viên, hộp 5 vỉ x 20 viên.

**Chỉ định:** Mát gan, giải độc, thanh huyết nhiệt.

Chủ trị: Mẩn ngứa, dị ứng, nổi mề đay, sạm da, râm má, da khô ráp, táo bón, suy giảm chức năng gan, trẻ em mụn nhọt, rôm sảy.

**Cách dùng & liều dùng:**

- Ngày uống 3 lần, mỗi lần 5 viên, uống sau bữa ăn.
- Bệnh nặng có thể dùng gấp rưỡi liều trên.

**Tác dụng phụ:**

Cho đến nay, vẫn chưa có tài liệu nào báo cáo về tác dụng không mong muốn của thuốc. Nếu thấy có bất kỳ tác dụng phụ nào trong quá trình dùng thuốc, cần thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ về những tác dụng không mong muốn này.

**Chống chỉ định:** Không dùng thuốc cho người tỳ vị hư hàn.

**Thận trọng:** Thận trọng khi dùng thuốc cho bệnh nhân tiểu đường.

**Dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:** Hiện vẫn chưa có tài liệu nào báo cáo về trường hợp dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú.

**Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc:** Hiện vẫn chưa có bằng chứng về tác động của thuốc lên khả năng lái xe và vận hành máy móc.

**Tương tác với các thuốc khác và các loại tương tác khác:** Trong thời gian sử dụng thuốc, không nên ăn các thức ăn cay nóng, tôm, cua, cá và các đồ uống có cồn như rượu, bia...

**Quá liều và cách xử trí:** Cho đến nay, vẫn chưa có tài liệu nào báo cáo về trường hợp dùng thuốc quá liều. Khi dùng thuốc quá liều, nếu thấy có dấu hiệu bất thường, cần đưa ngay bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để có biện pháp xử trí kịp thời.

**Hạn dùng:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

**Bảo quản:** Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.

**Tiêu chuẩn:** TCCS.

**Thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.**

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến của bác sĩ.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Rửa tay trước khi dùng. Rửa tay sau khi dùng.

**Sản phẩm này được sản xuất và phân phối bởi:**

Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng

Trụ sở: Số 96-98 Nguyễn Việt Xuân, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Nhà máy: Cụm công nghiệp Thanh Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội

Website: [www.dongduocphuchung.com.vn](http://www.dongduocphuchung.com.vn)

Điện thoại: 04. 33824177 - 33826222

Fax: 04. 33978024



TU. CỤC TRƯỞNG  
P. TRƯỞNG PHÒNG  
*Đỗ Minh Hùng*