



TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

THẤP KHỚP HOÀN P/H

Thành phần: (cho 1 gói x 5g)

Bột Phòng phong (<i>Pulveres radicis saposhnikoviae divaricatae</i>)	: 0,5g
Bột Xuyên khung (<i>Pulveres rhizomae ligustici wallichii</i>)	: 0,5g
Bột Tục đoạn (<i>Pulveres radicis dipsaci</i>)	: 0,5g
Bột Hoàng kỳ (<i>Pulveres radicis astragali membranacei</i>)	: 0,5g
Bột Bạch thược (<i>Pulveres radicis paoniae lactiflorae</i>)	: 0,5g
Bột Đường quy (<i>Pulveres radicis angelicae sinensis</i>)	: 0,5g
Bột Phục linh (<i>Pulveres poriae</i>)	: 0,4g
Bột Cam thảo (<i>Pulveres radicis glycyrrhizae</i>)	: 0,4g
Bột Thiên niên kiện (<i>Pulveres rhizomae homalomenae</i>)	: 0,4g
Cao đặc Tần giao (<i>Extractum radicis gentianae</i>)	: 0,1g
(tương đương với 1g được liệu)	
Cao đặc Đỗ trọng (<i>Extractum cortex eucommiae</i>)	: 0,1g
(tương đương với 1g được liệu)	
Cao đặc Ngưu tất (<i>Extractum radicis achyranthis bidentatae</i>)	: 0,15g
(tương đương với 1g được liệu)	
Cao đặc Độc hoa (<i>Extractum radicis angelicae pubescens</i>)	: 0,12g
(tương đương với 1g được liệu)	
Tá dược (than hoạt tính, mật ong)	: Vừa đủ 5g



Dạng bào chế: Hoàn cứng.

Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói x 5g hoàn cứng.

Chỉ định:

Chủ trị đau các khớp xương, đau lưng, đau cột sống, đau dây thần kinh tọa, đau bắp thịt.

Cách dùng & liều dùng:

- Ngày uống 3 lần, mỗi lần 1 gói, uống sau bữa ăn.
- Đợt điều trị: 4 - 6 tuần. Có thể dùng 2 - 3 đợt, mỗi đợt cách nhau 5 ngày.
- Uống thuốc với nước đun sôi để nguội.

Tác dụng phụ:

Cho đến nay, vẫn chưa có tài liệu nào báo cáo về tác dụng không mong muốn của thuốc. Nếu thấy có bất kỳ tác dụng phụ nào trong quá trình dùng thuốc, cần thông báo cho bác sĩ hoặc được sĩ về những tác dụng không mong muốn này.

Chống chỉ định: Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao, phụ nữ có thai.

Thận trọng: Thận trọng khi dùng thuốc cho phụ nữ cho con bú.

Dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Thuốc chống chỉ định cho phụ nữ có thai.

Phụ nữ cho con bú: Thuốc chống chỉ định cho trẻ em dưới 30 tháng tuổi nên cần thận trọng khi dùng thuốc cho phụ nữ cho con bú để đảm bảo an toàn cho trẻ bú mẹ.

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Hiện vẫn chưa có bằng chứng về tác động của thuốc lên khả năng lái xe và vận hành máy móc.

Tương tác với các thuốc khác và các loại tương tác khác: Chưa có tài liệu, báo cáo nào của thuốc được ghi nhận.

Quá liều và cách xử trí: Cho đến nay, vẫn chưa có tài liệu nào báo cáo về trường hợp dùng thuốc quá liều. Khi dùng thuốc quá liều, nếu thấy có dấu hiệu bất thường, cần đưa ngay bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để có biện pháp xử trí kịp thời.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.

Tiêu chuẩn: TCCS.

Thông báo cho bác sĩ hoặc được sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến của bác sĩ.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Để xa tầm tay trẻ em.

Sản phẩm này được sản xuất và phân phối bởi:

Công ty TNHH Đồng Dược Phúc Hưng

Trụ sở: Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Nhà máy: Cụm Công nghiệp Thanh Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội

Website: www.dongduocphuchung.com.vn

Điện thoại: 04. 33824177 - 33826222

Fax: 04. 33978024

TỔ CHỨC TRƯỞNG
P. TRƯỞNG PHÒNG
Đỗ Minh Hùng