

# THẬP TOÀN ĐẠI BỔ

**CÔNG THỨC:** Cho 1 hoàn

Bạch thược ( <i>Radix Paeoniae lactiflorae</i> ).....	302,5mg...605mg	4,5g	9g
Phục linh ( <i>Poria</i> ).....	302,5mg...605mg		
Bạch truật ( <i>Rhizoma Atractylodis marcocephalae</i> ).....	302,5mg...605mg		
Quế nhục ( <i>Cortex Cinnamomi</i> ).....	75,5mg...151mg		
Cam thảo ( <i>Radix Glycyrrhizae</i> ).....	151,5mg...303mg		
Thực địa ( <i>Radix Rehmanniae glutinosae praeparata</i> )...454,0mg...908mg			
Đẳng sâm ( <i>Radix Codonopsis pilosulae</i> ).....	302,5mg...605mg		
Xuyên khung ( <i>Rhizoma Ligustici wallichii</i> ).....	151,5mg...303mg		
Đương quy ( <i>Radix Angelicae sinensis</i> ).....	454,0mg...908mg		
Hoàng kỳ ( <i>Radix Astragali membranacei</i> ).....	302,5mg...605mg		
Tá dược (mật ong, kali sorbat).....	vừa đủ 1 hoàn		1 hoàn

## CHỈ ĐỊNH:

Bồi bổ khí huyết, cơ thể suy nhược, thiếu máu, kém ăn, phụ nữ mới sanh.  
Dùng cho người có sắc mặt xanh xao, hơi thở ngắn, đánh trống ngực, chóng mặt, dễ ra mồ hôi, sức yếu, mệt mỏi, tay chân lạnh, kinh nguyệt ra nhiều.

## LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG:

Nhai mỗi lần 1 hoàn 9g, ngày 2 lần hoặc 2 hoàn 4,5g, ngày 2 lần.

Dùng vào buổi sáng sớm và tối trước khi đi ngủ.

## CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Phụ nữ có thai.

Bệnh nhân mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

## THẬN TRỌNG:

Người cao huyết áp.

Khi bị cảm mạo thì tạm ngưng dùng thuốc.

Không ăn các thứ cay nóng khi đang dùng thuốc.

## SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

Không dùng cho phụ nữ có thai.

Phụ nữ cho con bú: được sử dụng.

## TÁC DỤNG ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG LÁI XE

**VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:** Không.

**TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:** Cho đến nay chưa có thông tin báo cáo về tác dụng không mong muốn của thuốc.

*Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.*

**TƯƠNG TÁC THUỐC:** Cho đến nay chưa có thông tin báo cáo về tương tác thuốc.

**DẠNG THUỐC VÀ TRÌNH BÀY:** Thuốc hoàn mềm.

Hộp 1 vỉ 6 hoàn x 9g. Hộp 2 vỉ bấm 10 hoàn x 4,5g.

**HẠN DÙNG:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

**BẢO QUẢN:** Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C.

**TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:** TCCS.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.