

95 x 52 x 75mm

3374/0196

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT
Lần đầu: 12 / 8 / 2014

Composition: Each tablet contains:
Thiocolchicoside.....4 mg

Indications, contra-indications, dosage, administration:
Please refer to enclosed package insert.

Storage:
In a cool and dry place, below 30°C,
protect from direct sunlight.

Specification:
Manufacturer.

Manufacturer: **US PHARMA USA CO., LTD**
Lot B1-10, D2 Street, Tay Bac Cu Chi Industrial Zone, HCMC.
Distributed by: **NHAN SINH** **CONG TY TNHH NHAN SINH**
20-25 Bao Cat Street, W. 14, Tan Binh City, HCMC.

Keep out of reach of children.
Read the package insert carefully before use.

R_x Prescription drug

Thiochicod 4 mg
Thiocolchicoside 4mg

10 blisters x 10 tablets

Thiochicod 4 mg
Thiocolchicoside 4mg

Thành phần:
Mỗi viên nén chứa:
Thiocolchicoside.....4 mg

Chỉ định, chống chỉ định, liều dùng, cách dùng:
Xem tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp.

Bảo quản:
Nơi khô thoáng, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

Tiêu chuẩn:
Nhà sản xuất.

Nhà sản xuất: **CÔNG TY TNHH US PHARMA USA**
Lô B1-10, Đường D2, KCN Tây Bắc Củ Chi, TP.HCM.
Nhà phân phối: **NHAN SINH** **CÔNG TY TNHH NHAN SINH**
20-25 Bao Cat St, P.14, Q. Tân Bình, TP. HCM

Đã xem xét và phê duyệt.
Được ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

SĐX (Reg. No.):
Số SX (Batch No.):
Ngày SX (Mfd):
HD (Exp.):

R_x Thuốc bán theo đơn

Thiochicod 4 mg
Thiocolchicoside 4mg

10 vỉ x 10 viên nén

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN US PHARMA USA
M.S.D.N: 0310976550 - C.T. TNHH
H. CỬ CHỈ - T. PHÂN PHỐI
Nhà sản xuất: **CÔNG TY TNHH US PHARMA USA**
phân phối bởi: **CÔNG TY TNHH NHAN SINH**

90 x 70mm

Manufacturer: **US PHARMA USA Co., LTD**
Distributed by: **NHAN SINH CO., LTD**

Thiochicod 4 mg
Thiocolchicoside 4mg

Nhà sản xuất: **CÔNG TY TNHH US PHARMA USA**
Phân phối bởi: **CÔNG TY TNHH NHAN SINH**

Manufacturer: **US PHARMA USA Co., LTD**
Distributed by: **NHAN SINH CO., LTD**

Thiochicod 4 mg
Thiocolchicoside 4mg

Nhà sản xuất: **CÔNG TY TNHH US PHARMA USA**
Phân phối bởi: **CÔNG TY TNHH NHAN SINH**

Manufacturer: **US PHARMA USA Co., LTD**
Distributed by: **NHAN SINH CO., LTD**

Thiochicod 4 mg
Thiocolchicoside 4mg

Nhà sản xuất: **CÔNG TY TNHH US PHARMA USA**
Phân phối bởi: **CÔNG TY TNHH NHAN SINH**

Viên nén Thiocolchicoside 4 mg

Mỗi viên nén chứa :

Tá dược: Tinh bột ngô, Avicel PH 101, Starch 1500, Polyvinyl pyrrolidon K30, Natri starch glycolat ,
Talc, Magnesi Stearat, Colloidal silicon dioxyd.....vd 1 viên.

Dược lực học

Thiocolchicoside là hợp chất tổng hợp có lưu huỳnh của colchicoside, tác động như một chất đối kháng thụ thể GABA-A có tác dụng gây giãn cơ thông qua một cơ chế điều hòa phức tạp.

Thiocolchicoside được hấp thu nhanh chóng sau khi uống và chuyển hóa thành hai dẫn chất aglycon thiocolchicoside và ở dạng liên hợp glucuronic là dạng có hoạt tính. Khoảng 13% thiocolchicoside liên kết với protein huyết tương chủ yếu là albumin và không phụ thuộc vào nồng độ trị liệu của thiocolchicoside.

Thời gian để dạng liên hợp glucuronic của thiocolchicoside đạt nồng độ đỉnh trong huyết tương trung bình khoảng 1 giờ và thời gian bán thải là khoảng 7 giờ.

THIOCHICOD có tác dụng điều trị hỗ trợ cho chứng co cứng cơ cấp tính trong bệnh lý cột sống cho đối tượng người lớn và thanh thiếu niên từ 16 tuổi trở lên.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần biết thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.

Thuốc này chỉ dùng theo sự kê đơn của thầy thuốc.

Liều lượng và đường dùng

Chỉ dùng thuốc cho người lớn (trên 16 tuổi)

Liều dùng thông thường là 4 viên mỗi ngày, chia làm 2 lần.

Lưu ý: luôn luôn dùng đúng liều theo toa Bác sĩ.

Cách dùng

Uống nguyên viên thuốc.

Chống chỉ định

KHÔNG NÊN DÙNG THIOCHICOD trong những trường hợp sau đây:

- Tiền sử dị ứng với Thiocolchicoside, Colchicine hoặc với bất cứ thành phần tá dược nào của thuốc.
- Phụ nữ mang thai và đang cho con bú.

Trong trường hợp có nghi ngờ phải hỏi ý kiến của Bác sĩ hay Dược sĩ.

Thân trọng

Sử dụng thận trọng ở người có tiền sử động kinh hay co giật.

Khi bị tiêu chảy, phải báo cho Bác sĩ để điều chỉnh liều dùng phù hợp.

Nếu có đau da dày phải thông báo ngay cho Bác sĩ.

Trong trường hợp có nghi ngờ đừng ngần ngại hỏi ý kiến của Bác sĩ hay Dược sĩ.

Phụ nữ có thai và cho con bú

Thuốc không nên sử dụng ở phụ nữ mang thai hoặc cho con bú hoặc những phụ nữ có khả năng mang thai do không sử dụng biện pháp tránh thai phù hợp.

Lái xe và vận hành máy móc

Chưa có báo cáo cho thấy thuốc có ảnh hưởng đến khả năng lái tàu xe hay vận hành máy móc.

Tương tác thuốc



THIOCHICOD có thể tương tác với một số loại thuốc dẫn đến thay đổi tác dụng của thuốc như aspirin, các loại thuốc dị ứng, các thuốc chống đông máu như wafarin, các steroid như prednisone, insulin, probenecid và lithium.

Để tránh các tương tác có thể xảy ra giữa các thuốc, phải luôn thông báo cho Bác sĩ hay Dược sĩ biết các thuốc khác đang dùng.

Tác dụng phụ

- Rất hiếm gặp các phản ứng dị ứng như: nổi mề đay, phù mắt và đặc biệt là sốc phản vệ.
- Rất hiếm gặp các phản ứng da như: ngứa, nổi ban đỏ, phát ban và đặc biệt là ban với mụn và bóng nước.
- Hiếm khi có các rối loạn tiêu hóa như: tiêu chảy, đau dạ dày.

Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Quá liều và cách xử trí

Các triệu chứng thường gặp khi quá liều THIOCHICOD bao gồm: buồn nôn, nôn mửa, chóng mặt, buồn ngủ, nhức đầu, ù tai, co giật, đổ mồ hôi, mờ mắt, tê hoặc ngứa ran, thở chậm.

Cần đưa bệnh nhân đến Trung tâm y tế gần nhất ngay khi có các dấu hiệu quá liều.

Dạng trình bày

Hộp 10 vỉ, vỉ 10 viên.

Tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn cơ sở.

Hạn dùng

36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Bảo quản

Bảo quản thuốc ở nơi khô, thoáng, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

Để thuốc xa tầm tay trẻ em.

Nhà sản xuất:

CÔNG TY TNHH US PHARMA USA

Địa chỉ : Lô B1- 10, Đường D2, KCN Tây Bắc Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh

Mọi thắc mắc và thông tin chi tiết, xin liên hệ về số điện thoại 08 37908860 – 08 37908861, Fax: 08 37908856



PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Việt Hùng

