

Thuốc này chỉ dùng theo sự kê đơn của bác sĩ.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Đề xa tâm tay trẻ em.

Để kiểm soát đáp ứng miễn dịch

THIOSERIN

(Thymomodulin 60mg)

► **THÀNH PHẦN**

Mỗi ống 10 mL chứa:

Hoạt chất chính:

Thymomodulin60 mg

Tá dược: Sucrose, Acid citric khan, Concentrated Glycerin, Methyl parahydroxybenzoat, Propyl parahydroxybenzoat, Champagne cider flavor, Ethanol, nước tinh khiết, D-sorbitol solution 70%.

► **ĐẶC TÍNH DƯỢC ĐỘNG HỌC**

Thuốc được hấp thu tốt sau khi uống, mức độ hấp thu của thuốc được đánh giá thông qua sự xuất hiện của FTS (facteur thymique sérique: peptide được bài tiết bởi tế bào biểu mô tuyến ức). Trên đối tượng khoẻ mạnh, sau khi uống Thymomodulin, khoảng 2-6 giờ sự xuất hiện của FTS đạt được là tối đa, nó được duy trì trong khoảng 12 giờ và biến mất sau khoảng 48 giờ.

► **ĐẶC TÍNH DƯỢC LỰC HỌC**

Thymomodulin có tác dụng điều hòa miễn dịch trên mô hình thử nghiệm.

► **DẠNG BÀO CHẾ:** Dung dịch uống

► **CHỈ ĐỊNH:**

- Hỗ trợ dự phòng tái phát nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em và người lớn.
- Viêm mũi dị ứng.
- Hỗ trợ dự phòng tái phát dị ứng thức ăn.
- Hỗ trợ cải thiện các triệu chứng lâm sàng ở bệnh nhân HIV/AIDS.
- Hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch đã suy giảm ở người cao tuổi.

► **LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG**

- Hỗ trợ dự phòng tái phát nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em và người lớn: Liều dùng 120 mg/ngày, dùng trong thời gian 4-6 tháng.
- Viêm mũi dị ứng: Liều dùng 120mg/ngày, dùng trong thời gian 4 tháng.



- Hỗ trợ dự phòng tái phát dị ứng thức ăn: Liều dùng 120mg/ngày, dùng trong thời gian 3-6 tháng
- Hỗ trợ cải thiện các triệu chứng lâm sàng ở bệnh nhân HIV/AIDS: Liều dùng 60 mg/ngày, dùng trong thời gian 50 ngày.
- Hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch đã suy giảm ở người cao tuổi: Liều dùng 160mg/ngày, dùng trong thời gian 6 tuần.

► **CHỐNG CHỈ ĐỊNH**

Không dùng cho bệnh nhân quá mẫn với thuốc này hay bất cứ thành phần nào của thuốc.

► **TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN**

Có thể gặp phản ứng dị ứng ở bệnh nhân quá mẫn.

* *Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc.*

* *Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến dược sĩ hoặc bác sĩ.*

► **THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC**

- 1) Tuân thủ liều dùng và đường dùng.
- 2) Trẻ em dùng thuốc phải có giám sát của cha mẹ.
- 3) Thuốc chỉ dùng đường uống, không được tiêm.
- 4) Không dùng chế phẩm này như là chất bổ sung dinh dưỡng.

SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Sử dụng ở phụ nữ mang thai:

Chưa có nghiên cứu đầy đủ xác định độ an toàn của thuốc đối với người mang thai. Do đó chỉ sử dụng thuốc ở những người mang thai khi những lợi ích dự kiến mang lại vượt hơn hẳn những rủi ro có thể xảy ra.

Sử dụng ở phụ nữ cho con bú:

Chưa có nghiên cứu đầy đủ xác định độ an toàn của thuốc đối với người đang cho con bú. Vì vậy thận trọng khi dùng cho đối tượng này.

► **ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC ĐẾN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:**

Không ảnh hưởng

► **TƯƠNG TÁC THUỐC**

Chưa có ghi nhận nào về tương tác của Thymomodulin với các thuốc khác.

► **QUÁ LIỀU**

Chưa có báo cáo về trường hợp quá liều khi sử dụng thuốc chứa Thymomodulin.

Trong trường hợp quá liều, điều trị triệu chứng và dùng các biện pháp điều trị hỗ trợ.



► **BẢO QUẢN:**

Giữ thuốc trong hộp kín, ở nhiệt độ dưới 30⁰C. Tránh ánh sáng,

► **HẠN DÙNG:**

24 tháng kể từ ngày sản xuất.

** Không dùng thuốc quá thời hạn sử dụng.*

► **ĐÓNG GÓI:**

10 mL / ống, 20 ống / hộp.

Sản xuất bởi:

CHO-A PHARM. CO., LTD.

465, Pasu-ri, Haman-myeon, Haman-gun, Gyeongsangnam-do, Hàn Quốc.



Dong Seok Seo

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Red handwritten mark]