

VIÊN NANG CỨNG

Ampelop®

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 9 vỉ x 10 viên

DẠNG BẢO CHẾ: Viên nang cứng

Mô tả: Viên nang cứng, thân nang màu trắng, nắp màu xanh, trên nắp nang có chữ Tra.

THÀNH PHẦN: Mỗi viên chứa:

Thành phần hoạt chất:

Cao đặc lá Chè dây 7:1 (*Extractum Folii Ampelopsis spissum*).....625 mg

Thành phần tá dược: Colloidal silicon dioxid, Magnesi stearat, Talc.....vừa đủ

TÁC DỤNG: Thuốc có tác dụng:

- Giảm tiết acid dịch vị, làm liền sẹo nhanh vết loét dạ dày - hành tá tràng.
- Chống viêm, giảm đau dạ dày.
- Ức chế xoắn khuẩn *Helicobacter pylori*, một trong những tác nhân gây bệnh viêm loét dạ dày - hành tá tràng.
- An thần.

CHỈ ĐỊNH:

- Điều trị viêm loét dạ dày - hành tá tràng do tăng tiết acid dịch vị.
- Dự phòng tái phát viêm loét dạ dày - hành tá tràng bao gồm do tăng tiết acid dịch vị và do *Helicobacter pylori*.
- Phối hợp với kháng sinh theo phác đồ điều trị được dùng trong các trường hợp viêm loét dạ dày - hành tá tràng có liên quan tới *Helicobacter pylori*.

LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG:

Phác đồ điều trị đơn độc:

Uống 2 viên/lần x 3 lần/ngày, uống sau bữa ăn. Đợt điều trị 30 ngày liên tục.

Phác đồ điều trị làm tăng hiệu lực diệt *Helicobacter Pylori*:

Điều trị liên tục trong 30 ngày kết hợp với kháng sinh:

♦ **10 ngày đầu:**

1. Ampelop 2 viên/lần x 3 lần/ngày. Uống sau bữa ăn.
2. Amoxycillin 1000 mg/lần x 2 lần/ngày. Uống vào buổi sáng và buổi tối.
3. Metronidazol 500 mg/lần x 2 lần/ngày. Uống vào buổi sáng và buổi tối.

♦ **20 ngày tiếp theo:** Ampelop 2 viên/lần x 3 lần/ngày. Uống sau bữa ăn.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC:

Phụ nữ có thai và cho con bú cần hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng.

SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

Xem mục "Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc"

ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:

Không ảnh hưởng.

TƯƠNG TÁC THUỐC: Chưa có dữ liệu về tương tác thuốc.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

Chưa ghi nhận được báo cáo về phản ứng có hại của thuốc.

Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:

Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc.

Trường hợp sử dụng thuốc quá liều, cần tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời.

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30 °C, tránh ánh sáng.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG: TCCS

Traphaco

Sản phẩm của: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO**

75 Yên Ninh - Ba Đình - Hà Nội Tel: (84-24) 36810724 Fax: (84-24) 36811542

Điện thoại liên hệ: 18006612

Sản xuất tại: **CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO**

Xá Tân Quang - Huyện Văn Lâm - Tỉnh Hưng Yên