

Hướng dẫn sử dụng thuốc:

Anpemux

- Dạng thuốc: Viên nang cứng

- Thành phần: Mỗi viên nang cứng chứa:

Carbocystein..... 250mg

Tá dược vđ..... 1 viên

(Tá dược gồm: Bột talc, magnesi stearat, microcrystalline cellulose, bột hương cam, bột hương đào).

- Các đặc tính được lực học: Thuốc biến đổi dịch tiết, có tính chất tiêu nhầy.

- Các đặc tính được động học: Thuốc hấp thu nhanh và đạt nồng độ tối đa trong huyết tương sau 2 giờ.

Thuốc chuyển hóa mạnh và chịu ảnh hưởng khi qua gan lần đầu.

Thời gian bán hủy khoảng 2h, thuốc và các chất chuyển hóa đào thải chủ yếu qua thận.

- Chỉ định: Điều trị những rối loạn của sự tiết phế quản, nhất là trong các bệnh phế quản cấp tính: Viêm phế quản cấp, giai đoạn cấp tính của các bệnh phổi - phế quản mạn.

- Cách dùng và liều lượng: Uống theo chỉ dẫn của thầy thuốc

Người lớn và trẻ em trên 15 tuổi: mỗi lần 2 viên x 3 lần/ngày. Nên uống thuốc xa bữa ăn. Trẻ em dưới 15 tuổi: nên dùng dạng syrup

- Chống chỉ định: Quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Trẻ em dưới 2 tuổi.

- thận trọng: Thận trọng với bệnh nhân loét dạ dày tá tràng

- Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Thời kỳ mang thai: Chỉ nên dùng thuốc cho người mang thai khi thật cần thiết.

Thời kỳ cho con bú: Có thể dùng thuốc khi đang cho con bú.

- Tác dụng không mong muốn của thuốc: Có thể gặp nôn, buồn nôn. Khi đó nên giảm liều.

* Ghi chú: "Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc".

- Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Thuốc không gây ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc.

- Tương tác thuốc: Khi dùng đồng thời, Carbocystein làm tăng sự hấp thu amoxicillin natri.

Nếu trước đó điều trị bằng cimetidin sẽ làm giảm thải trừ Carbocystein trong nước tiểu.

- Quá liều và cách xử trí: Các trường hợp quá liều Carbocystein chưa được ghi nhận. Trong trường hợp quá liều, bệnh nhân nên được gây buồn nôn và nôn. Nếu không gây nôn được nên tiến hành các biện pháp thường quy, bao gồm rửa dạ dày.

- Hạn dùng: 24 tháng tính từ ngày sản xuất. Không dùng thuốc đã quá hạn sử dụng.

* Lưu ý: Khi thấy nang thuốc bị ẩm mốc, nang thuốc bị rách, b López, bột thuốc chuyển màu, nhăn thuốc in số lô SX, HD mờ...hay có các biểu hiện nghi ngờ khác phải đem thuốc tới hỏi lại nơi bán hoặc nơi sản xuất theo địa chỉ trong đơn.

- Qui cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 10 viên nang.

- Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

- Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

ĐẾ XA TẨM TAY TRẺ EM.

"Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ"

THUỐC SẢN XUẤT TẠI:

CÔNG TY C.P DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Tổ dân phố số 4 - La Khê - Hà Đông - TP Hà Nội

ĐT: 04 33824685 * FAX: 04 33 829054