

376/HS



Bát tiên Trường Thọ P/H



THÀNH PHẦN: (cho 1 viên)
Bột Thục địa 50mg; Bột Hoài sơn 60mg; Bột Bạch linh 40mg; Cao đặc dược liệu 100mg
(tương đương với: Thục địa 270mg; Sơn thù 69mg; Mẫu đơn bì 52mg; Trạch tả 52mg; Mạch môn 69mg; Ngũ vị tử 34mg; Câu kỷ tử 43mg); Mật ong vớ 1 viên

CHỈ ĐỊNH:
Bát tiên trường thọ P/H có tác dụng tu bổ can thận. Thuốc được dùng trong các trường hợp người già yếu, can thận âm hư gây chóng mặt, vàng mắt, ù tai, đau lưng, mỏi gối, di mộng tinh, ra mồ hôi trộm, tiểu huyết, bí tiểu, tiểu tiện sẫm đỏ, đại tiện táo, khí ứ trệ mà đờm dãi, mờ mắt, hoa mắt, thị lực giảm sút, khô cổ, đau họng, ho hen khát nước, lòng bàn tay, bàn chân nóng.

Bát tiên Trường Thọ P/H



Hộp 1 lọ
240 hoàn mềm

CÁCH DÙNG & LIỀU DÙNG - CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp.

TIÊU CHUẨN: TCCS.
BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM

SDK:
Số lô SX:
Ngày SX:
HD :

C. TY TNHH ĐỒNG DƯỢC PHÚC HƯNG

135 x 45 (mm)

THÀNH PHẦN: (cho 1 viên)
Bột Thục địa.....50mg
Bột Hoài sơn.....60mg
Bột Bạch linh.....40mg
Cao đặc dược liệu.....100mg
Tương đương với:
Thục địa.....270mg
Sơn thù.....69mg
Mẫu đơn bì.....52mg
Trạch tả.....52mg
Mạch môn.....69mg
Ngũ vị tử.....34mg
Câu kỷ tử.....43mg
Mật ong vớ 1 viên

CHỈ ĐỊNH - CÁCH DÙNG & LIỀU DÙNG - CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp.

Bát tiên Trường Thọ P/H



Hộp 1 lọ
240 hoàn mềm

TIÊU CHUẨN: TCCS.
BẢO QUẢN:
Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM

SDK:
Số lô SX:
Ngày SX:
HD :

CÔNG TY TNHH ĐỒNG DƯỢC PHÚC HƯNG
Trụ sở: số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
Nhà máy: Cụm công nghiệp Thanh Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội
ĐT: 04.33826222 * Fax: 04.33978024

Bát tiên Trường Thọ P/H



Hộp 1 lọ
240 hoàn mềm

KT: (48x48x85)

**BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT**

05-09-2016

Lần đầu:.....

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

BÁT TIỀN TRƯỜNG THỌ P/H

Thành phần: (cho 1 viên)

Bột Thục địa (<i>Pulveres radices rehmanniae glutinosae praeparata</i>)	: 50mg
Bột Hoài sơn (<i>Pulveres tuberis dioscoreae persimilis</i>)	: 60mg
Bột Bạch linh (<i>Pulveres poriae</i>)	: 40mg
Cao đặc dược liệu (<i>Extractum</i>)	: 100mg
tương đương với:	
Thục địa (<i>Radix rehmanniae glutinosae praeparata</i>)	: 270mg
Sơn thù (<i>Fructus Corni officinalis</i>)	: 69mg
Mẫu Đơn bì (<i>Cortex Paeoniae suffruticosae</i>)	: 52mg
Trạch tả (<i>Rhizoma Alismatis</i>)	: 52mg
Mạch môn (<i>Radix Ophiopogonis japonici</i>)	: 69mg
Ngũ vị tử (<i>Fructus Schisandrae</i>)	: 34mg
Câu kỷ tử (<i>Fructus Lycii</i>)	: 43mg
Mật ong (<i>Mel</i>)	: vừa đủ 1 viên

Dạng bào chế: Hoàn mềm.

Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 240 viên.

Chỉ định:

Bát tiên trường thọ P/H có tác dụng tư bổ can thận. Thuốc được dùng trong các trường hợp người gầy yếu, can thận âm hư gây chóng mặt, vàng đầu, ù tai, đau lưng, mỏi gối, di mộng tinh, ra mồ hôi trộm, tiện huyết, bí tiểu, tiểu tiện sẫm đỏ, đại tiện táo, khí ủng trệ mà đờm rãi, mờ mắt, hoa mắt, thị lực giảm sút, khô cổ, đau họng, ho hen khát nước, lòng bàn tay, bàn chân nóng.

Cách dùng & liều dùng:

- Ngày uống 2 lần sau bữa ăn:
- Trẻ dưới 6 tuổi, mỗi lần 5 - 10 viên.
 - Trẻ từ 6 - 14 tuổi, mỗi lần 15 - 20 viên.
 - Trẻ từ 14 tuổi trở lên và người lớn, mỗi lần 25 - 30 viên.

Tác dụng phụ:

Cho đến nay, vẫn chưa có tài liệu nào báo cáo về tác dụng không mong muốn của thuốc. Nếu thấy có bất kỳ tác dụng phụ nào trong quá trình dùng thuốc, cần thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ về những tác dụng không mong muốn này.

Chống chỉ định: Người đang rối loạn tiêu hóa, ỉa chảy.

Dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú: Hiện vẫn chưa có tài liệu nào báo cáo về trường hợp dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú.

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Hiện vẫn chưa có bằng chứng về tác động của thuốc lên khả năng lái xe và vận hành máy móc.

Tương tác với các thuốc khác và các loại tương tác khác: Chưa có tài liệu, báo cáo nào của thuốc được ghi nhận.

Quá liều và cách xử trí: Cho đến nay, vẫn chưa có tài liệu nào báo cáo về trường hợp dùng thuốc quá liều. Khi dùng thuốc quá liều, nếu thấy có dấu hiệu bất thường, cần đưa ngay bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để có biện pháp xử trí kịp thời.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.

Tiêu chuẩn: TCCS.

Thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến của bác sĩ.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Để xa tầm tay trẻ em.

Sản phẩm này được sản xuất và phân phối bởi:

Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng

Trụ sở: Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Nhà máy: Cụm Công nghiệp Thanh Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội

Website: www.dongduocphuchung.com.vn

Điện thoại: 04. 33824177 - 33826222

Fax: 04. 33978024



TU. CỤC TRƯỞNG
P. TRƯỞNG PHÒNG

Đ. Minh Hùng