

Thành phần (cho 1 hoàn mấm):				Chỉ định:	
Quế chi:	0,198g	Hoài sơn:	0,792g	Bổ tỳ - thận dương, bổ mệnh môn hỏa.	
Hắc Phụ tử:	0,198g	Phục linh:	0,594g	Chủ trị: Tỳ - Thận dương hư gây nên các chứng: Đau lưng, mỏi gối, đau đầu, chóng mặt, suy nhược cơ thể, ăn ít, ngủ ít, di tinh, chức năng sinh lý kém, tiểu tiện nhiều lần, chân tay lạnh.	
Thục địa:	1,584g	Trạch tả:	0,594g		
Sơn thù:	0,792g	Tã dược:	vừa đủ 9g		
Mẫu đơn bì:	0,594g				



PHUOC HUNG

Hộp 10 hoàn mấm x 9g

BÁT VỊ HOÀN P/H

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG - ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM



Cách dùng & liều dùng:	Số lô SX:	
Ngày uống 2-3 lần, mỗi lần 1 viên, uống trước bữa ăn.	Ngày SX:	
Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.	HD:	
Tiêu chuẩn: TCCS.	SĐK:	
Chống chỉ định: Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.		

PHUOC HUNG

Hộp 10 hoàn mấm x 9g

BÁT VỊ HOÀN P/H

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG - ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM

CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC HƯNG
 Trụ sở: số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, phường Quang Trung,
 quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
 Nhà máy: Công ty Cổ phần Dược phẩm Việt Nam,
 huyện Thuận An, tỉnh Bình Phước
 ĐT: 04.33626222 * Fax: 04.33978024



BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT
 Lần đầu: 09/1/2015

Handwritten signature

SĐK:
 Số lô SX:
 Ngày SX:
 HD:
PHUOC HUNG
P/H

Thành phần (cho 1 hoàn mấm):
Quế chi: 0,198g
Hắc Phụ tử: 0,198g
Thục địa: 1,584g
Sơn thù: 0,792g
Mẫu đơn bì: 0,594g
Hoài sơn: 0,792g
Phục linh: 0,594g
Trạch tả: 0,594g
Tã dược: vừa đủ 9g
Cách dùng & liều dùng:
Ngày uống 2-3 lần, mỗi lần 1 viên, uống trước bữa ăn.

Hoàn mấm 9g

BÁT VỊ HOÀN P/H

Chỉ định:
Bổ tỳ - thận dương, bổ mệnh môn hỏa.
Chủ trị: Tỳ - Thận dương hư gây nên các chứng: Đau lưng, mỏi gối, đau đầu, chóng mặt, suy nhược cơ thể, ăn ít, ngủ ít, di tinh, chức năng sinh lý kém, tiểu tiện nhiều lần, chân tay lạnh.
Chống chỉ định:
Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc
Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.
Tiêu chuẩn: TCCS.

Hoàn mấm 9g

BÁT VỊ HOÀN P/H

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

BÁT VỊ HOÀN P/H

Thành phần: (cho 1 hoàn mềm)

Quế chi (<i>Ramunlus Cinnamomi</i>)	: 0,198g
Hắc Phụ tử (<i>Radix Aconiti lateralis</i>)	: 0,198g
Thục địa (<i>Radix Rehmanniae glutinosae praeparata</i>)	: 1,584g
Sơn thù (<i>Fructus Corni officinalis</i>)	: 0,792g
Mẫu đơn bì (<i>Cortex Paeoniae suffruticosae</i>)	: 0,594g
Hoài sơn (<i>Tuber Dioscoreae persimilis</i>)	: 0,792g
Phục linh (<i>Poria</i>)	: 0,594g
Trạch tả (<i>Rhizoma Alismatis</i>)	: 0,594g
Tá dược (mật ong, nước tinh khiết)	: vừa đủ 9g



Dạng bào chế: Hoàn mềm.

Quy cách đóng gói: Hộp 10 hoàn mềm x 9g.

Chỉ định:

Bổ tỳ - thận dương, bổ mệnh môn hỏa. Chủ trị: Tỳ - thận dương hư gây nên các chứng: Đau lưng, mỏi gối, đau đầu, chóng mặt, suy nhược cơ thể, ăn ít, ngủ ít, di tinh, chức năng sinh lý kém, tiểu tiện nhiều lần, chân tay lạnh.

Cách dùng & liều dùng:

Ngày uống 2 - 3 lần, mỗi lần 1 viên, uống trước bữa ăn.

Tác dụng phụ:

Cho đến nay, vẫn chưa có tài liệu nào báo cáo về tác dụng không mong muốn của thuốc. Nếu thấy có bất kỳ tác dụng phụ nào trong quá trình dùng thuốc, cần thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ về những tác dụng không mong muốn này.

Chống chỉ định:

Không dùng thuốc cho người tăng huyết áp, trẻ em dưới 10 tuổi, người thể nhiệt, âm hư, hảo khát, hao tổn tân dịch.

Thận trọng: Thận trọng khi dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú.

Dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú: Thuốc chống chỉ định cho trẻ em dưới 10 tuổi nên cần thận trọng khi dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú để đảm bảo an toàn cho thai nhi và cho trẻ bú mẹ.

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Hiện vẫn chưa có bằng chứng về tác động của thuốc lên khả năng lái xe và vận hành máy móc.

Tương tác với các thuốc khác và các loại tương tác khác: Chưa có tài liệu, báo cáo nào của thuốc được ghi nhận.

Quá liều và cách xử trí: Cho đến nay, vẫn chưa có tài liệu nào báo cáo về trường hợp dùng thuốc quá liều. Khi dùng thuốc quá liều, nếu thấy có dấu hiệu bất thường, cần đưa ngay bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để có biện pháp xử trí kịp thời.

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.

Tiêu chuẩn: TCCS.

Thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến của bác sĩ.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Để xa tầm tay trẻ em.

Sản phẩm này được sản xuất và phân phối bởi:

Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng

Trụ sở: Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Nhà máy: Cụm Công nghiệp Thanh Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội

Website: www.dongduocphuchung.com.vn

Điện thoại: 04. 33824177 - 33826222

Fax: 04. 33978024



TU QU CỤC TRƯỞNG
P. TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Thị Thu Thủy