

**BỘ Y TẾ  
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC  
ĐÃ PHÊ DUYỆT**

Lần đầu: 14 / 5 / 2014

**THÀNH PHẦN:** mỗi viên nang cứng chứa:  
- Diệp hạ châu (*Herba Phyllanthi urinariae*): 2 g  
- Tương đương 200 mg cao khô  
- Nhân trần (*Herba Adenosmatis caerulei*): 2 g  
- Tương đương 180 mg cao khô  
- Bồ công anh (*Herba Lactucae indicae*): 1 g  
- Tương đương 100 mg cao khô  
*Tà dược:* Calci carbonat, Tinh bột sắn, Talc, Magnesi stearat, vđ 1 viên.

**TƯƠNG TÁC THUỐC, TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN, VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:**  
Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng.

**LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG:**

- Ngày uống 3 lần, uống sau bữa ăn.
- Người lớn: Mỗi lần uống 3 viên.
- Trẻ em: Mỗi lần uống 1-2 viên.

**THỜI GIAN ĐIỀU TRỊ:**

- Viêm gan do siêu vi B: mỗi đợt điều trị ít nhất 3 tháng; Có thể uống lâu dài.
- Các trường hợp khác, mỗi đợt điều trị thông thường là 30 ngày.

Số lô SX:  
HD:

NSX:

**Bình Can ACP**

Sản xuất tại:  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MÊ DI SUN**  
Số 521 - An Lợi - Hòa Lợi - Bến Cát - Bình Dương  
ĐT: 0650 3589 036 - Fax: 0650 3589 297  
Theo hợp đồng gia công với:  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DÔNG DƯỢC Á CHÂU**  
Do Lê - Yên Nghĩa - Hà Đông - Hà Nội



**CTCP DÔNG DƯỢC Á CHÂU**  
Thuộc CTCTPD Dược Phẩm và TM SOHACO

GMP-WHO

Hộp 5 vi x 10 viên nang cứng

## Bình Can ACP



**CHỈ ĐỊNH:**

- Viêm gan mạn tính do siêu vi B, có HBsAg dương tính.
- Viêm gan cấp và mạn tính do mọi nguyên nhân.
- Các biểu hiện do suy giảm chức năng gan: mệt mỏi, chán ăn, ăn uống khó tiêu, vàng da.
- Dự ứng miễn ngứa, mụn nhọt ngoài da.
- Phòng và hỗ trợ điều trị xơ gan, ung thư gan.
- Viêm túi mật, ống dẫn mật.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH:**

- Người mẫn cảm với thành phần của thuốc, phụ nữ có thai, người tỳ vị hư hàn.

**BẢO QUẢN:**

- Nơi khô thoáng, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

**Tiêu chuẩn:** TCCS

**SĐK:**

**ĐỂ XA TẤM TAY TRẺ EM  
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG  
TRƯỚC KHI DÙNG**

## Bình Can ACP



Hộp 5 vi x 10 viên nang cứng

GMP-WHO

CTCP DÔNG DƯỢC Á CHÂU  
Thuộc CTCTPD Dược Phẩm và TM SOHACO

### Bình Can ACP

Diệp hạ châu (*Herba Phyllanthi urinariae*) 2g  
Nhân trần (*Herba Adenosmatis caerulei*) 2g  
Bồ công anh (*Herba Lactucae indicae*) 1g

### Bình Can ACP

Diệp hạ châu (*Herba Phyllanthi urinariae*) 2g  
Nhân trần (*Herba Adenosmatis caerulei*) 2g  
Bồ công anh (*Herba Lactucae indicae*) 1g

### Bình Can ACP

Diệp hạ châu (*Herba Phyllanthi urinariae*) 2g  
Nhân trần (*Herba Adenosmatis caerulei*) 2g  
Bồ công anh (*Herba Lactucae indicae*) 1g

### Bình Can ACP

Sản xuất tại:  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MÊ DI SUN**  
Theo hợp đồng gia công với:  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DÔNG DƯỢC Á CHÂU**  
A.Châu



GIÁM ĐỐC

*Đs: Phạm Phan Thanh Vân*

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

### VIÊN NANG BÌNH CAN ACP

**Trình bày :** Hộp 5 vỉ x 10 viên nang cứng+ HDSD.

**Công thức cho 1 viên nang:**

Diệp hạ châu ( <i>Herba Phyllanthi urinariae</i> )	2,0g (tương đương 200mg cao khô)
Nhân trần ( <i>Herba Adenosmatis caerulei</i> )	2,0g (tương đương 180mg cao khô)
Bồ công anh ( <i>Herba Lactucae indicae</i> )	1,0g (tương đương 100mg cao khô)
Calci carbonat, Tinh bột sắn, Talc, Magnesi stearrat vđ	1 viên.

**Chỉ định:**

- Viêm gan mãn do siêu vi B, có HBsAg dương tính
- Viêm gan cấp và mãn tính do mọi nguyên nhân
- Các biểu hiện do suy giảm chức năng gan: mệt mỏi, chán ăn, ăn uống khó tiêu, vàng da.
- Dị ứng, mẩn ngứa ngoài da.
- Phòng và hỗ trợ điều trị xơ gan, ung thư gan.
- Viêm túi mật, ống dẫn mật.

**Chống chỉ định:** Người mẫn cảm với thành phần của thuốc, phụ nữ có thai, người tỳ vị hư hàn.

**Liều dùng:** Ngày uống 3 lần, uống sau bữa ăn.

Người lớn: Mỗi lần uống 3 viên.

Trẻ em : Mỗi lần uống 1 — 2 viên.

**Thời gian điều trị:**

Viêm gan do siêu vi B: mỗi đợt điều trị ít nhất 3 tháng; Có thể uống lâu dài.

Các trường hợp khác, mỗi đợt điều trị thông thường là 30 ngày.

**Thận trọng và các trường hợp cần lưu ý khi sử dụng thuốc:** Chưa có báo cáo.

**Tương tác thuốc:** Chưa có báo cáo.

**Người vận hành máy móc tàu xe:** Thuốc không ảnh hưởng gì với người vận hành máy móc tàu xe.

**Phụ nữ có thai và cho con bú:** Không dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú.

**Tác dụng không mong muốn:** Chưa có hiện tượng gì xảy ra, nếu có hiện tượng bất thường khác khi dùng, nên ngừng sử dụng và báo ngay cho Bác sĩ hoặc Dược sĩ biết để giúp đỡ sử lý.

**Hạn dùng:** 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

**Bảo quản:** Nơi khô thoáng, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

**Tiêu chuẩn:** TCCS

*Để xa tầm tay trẻ em.*

*Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng*

*Sản xuất tại:*

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ME DI SUN**

Địa chỉ: Số 521- An Lợi- Hòa Lợi- Bến Cát- Bình Dương



Tel: 0650.3589036; Fax :0650.3589297; Email: medisun.medisun@gmail.com

*Theo hợp đồng gia công với:*

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG DƯỢC Á CHÂU**

Địa chỉ: Do Lộ - Yên Nghĩa - Hà Đông - Hà Nội.



PHÓ CỤC TRƯỞNG  
*Nguyễn Việt Hùng*



Giám Đốc

GIÁM ĐỐC  
*Ds: Phạm Phan Thanh Vân*

