

Thận trọng và cảnh báo:

Như với tất cả các sản phẩm nhuận tràng, Viên đạn Bisacodyl không nên được sử dụng hàng ngày liên tục trong hơn năm ngày mà không điều trị nguyên nhân gây táo bón.

Sử dụng kéo dài và quá mức có thể dẫn đến mất cân bằng chất nước và chất điện giải và hạ kali máu.

Bệnh nhân có thể gặp phải chứng xuất huyết (máu trong phân) nhẹ

Chóng mặt và / hoặc ngất đã được báo cáo ở những bệnh nhân đã sử dụng viên đạn Bisacodyl.

Đã có báo cáo riêng biệt về đau bụng và tiêu chảy ra máu xảy ra sau khi dùng bisacodyl. Một số trường hợp đã được chứng minh là có liên quan đến thiếu máu niêm mạc đại tràng.

Việc sử dụng viên đạn có thể dẫn đến cảm giác đau đớn và kích thích tại chỗ, đặc biệt là ở những bệnh nhân bị nứt hậu môn và viêm loét trực tràng.

Viên đạn Bisacodyl không nên được sử dụng cho trẻ em dưới 10 tuổi mà không có lời khuyên của bác sĩ

Bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất

Nhà sản xuất



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC I HÀ NỘI.

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
VIÊN ĐẠT BICOLAX SUPP 10mg

Giới thiệu:

Viên đạ**t BICOLAX SUPP 10mg** chứa Bisacodyl, kích thích niêm mạc ruột già, trực tràng dẫn đến tăng nhu động đại tràng và tích tụ nước, điện giải dẫn đến việc kích thích đại tiện và làm mềm phân.

Thành phần:

Bisacodyl, Hardfat

Quy cách đóng gói:

5, 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 35, 40, 50, 100 viên

Chỉ định:

Điều trị táo bón và làm sạch ruột trước chẩn đoán và phẫu thuật.

Chống chỉ định:

Bisacodyl chống chỉ định ở những bệnh nhân bị tắc ruột, đau bụng cấp tính bao gồm viêm ruột thừa, bệnh viêm ruột cấp tính và đau bụng dữ dội liên quan đến buồn nôn và nôn có thể là dấu hiệu của tình trạng nghiêm trọng nói trên.

Bisacodyl cũng chống chỉ định trong tình trạng mất nước nghiêm trọng và ở những bệnh nhân đã biết quá mẫn cảm với bisacodyl hoặc bất kỳ thành phần nào khác của sản phẩm.

Viên đạ**n Bisacodyl** không nên được sử dụng khi có vết nứt hậu môn hoặc viêm loét trực tràng với tổn thương niêm mạc.

Hướng dẫn sử dụng:

Điều trị táo bón:

Người lớn và trẻ em trên 10 tuổi:

1 viên/lần nếu chưa hiệu quả có thể chèn thêm 1 viên nữa.

Tối đa không được quá 2 viên/ngày

Để chuẩn bị các chẩn đoán và trước phẫu thuật:

Chỉ nên được sử dụng dưới sự giám sát y tế.

Người lớn và trẻ em trên 10 tuổi

2 viên vào buổi sáng và 2 viên vào buổi tối và 1 viên đạ**n** vào sáng hôm sau.

Trẻ em dưới 10 tuổi

Không nên dùng cho trẻ dưới 10 tuổi.

Cách dùng:

Vệ sinh sạch sẽ vùng hậu môn bằng nước ấm hoặc nước muối loãng. Sau đó lau khô nhẹ nhàng

Dùng tay đẩy viên đạ**n** theo hướng đi của viên đạ**n** vào sâu trong hậu môn từ 2- 3cm sao cho tay không chạm đến viên đạ**n**.

