

BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM: TCCS.

SDK:

Chú ý: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Để xa tầm tay trẻ em. Các thông tin khác để nghị xem tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo.

Số lô SX:

NSX:

HD:



Nhà sản xuất: Công ty TNHH NAM DƯỢC
Lô M13 (C4-9) KCN Hòa Xá, Xã Mỹ Xá, TP. Nam Định
Điện thoại: 024.73056199/ 028.73056199



BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 22/02/2016



HỘ 3 VỈ X 10 VIÊN NANG CỨNG

Dùng cho người:
• Giảm trí nhớ, kém tập trung
• Thiếu năng tuần hoàn não

**BỔ HUYẾT
ÍCH NÃO**

Thuốc từ dược liệu

THÀNH PHẦN: Mỗi viên nang chứa:

Cao khô Đương quy0,3g
(Tương đương với Đương quy1,3g)
Cao khô lá bạch quả0,04g
Tá dược vừa đủ 1 viên

CHỈ ĐỊNH: Dùng cho người:

- Giảm trí nhớ, kém tập trung đặc biệt ở người lớn tuổi.
- Thiếu năng tuần hoàn não, ù tai, chóng mặt, giảm thính lực.

LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG:

Người lớn: Ngày uống 3 lần, mỗi lần 1 viên.
Trẻ em: Ngày uống 1-2 lần, mỗi lần 1 viên.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Không dùng cho bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.
- Không dùng cho phụ nữ có thai.
- Không dùng cho người đang có xuất huyết, có rối loạn đông máu.

THẬN TRỌNG:

Thận trọng khi dùng thuốc cho những bệnh nhân sau:
- Bệnh nhân đang dùng thuốc chống đông.
- Phụ nữ cho con bú, trẻ em dưới 12 tuổi.



**BỔ HUYẾT
ÍCH NÃO**

Dùng cho người:
• Giảm trí nhớ, kém tập trung
• Thiếu năng tuần hoàn não

Thuốc từ dược liệu



**BỔ HUYẾT
ÍCH NÃO**

Dùng cho người:

• Giảm trí nhớ, kém tập trung
• Thiếu năng tuần hoàn não



HỘ 3 VỈ X 10 VIÊN NANG CỨNG

110x75x40mm

GIÁM ĐỐC
DS: Phạm Văn Đông

BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM: TCCS.

SĐK:

Chú ý: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Để xa tầm tay trẻ em.

Các thông tin khác để nghị xem tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo.

Số lô SX:

NSX:

HD:



Nhà sản xuất: **Công ty TNHH NAM DƯỢC**

Lô M13 (C4-9) KCN Hòa Xá, Xã Mỹ Xá, TP. Nam Định

Điện thoại: 024.73056199/ 028.73056199



Dùng cho người:
• Giảm trí nhớ, kém tập trung
• Thiếu năng tuần hoàn não

BỔ HUYẾT ÍCH NÃO

Thuốc từ dược liệu

THÀNH PHẦN: Mỗi viên nang chứa:

Cao khô Đương quy0,3g
(Tương đương với Đương quy1,3g)
Cao khô lá bạch quả0,04g
Tá dược vừa đủ 1 viên

CHỈ ĐỊNH: Dùng cho người:

- Giảm trí nhớ, kém tập trung đặc biệt ở người lớn tuổi.
- Thiếu năng tuần hoàn não, ù tai, chóng mặt, giảm thính lực.

LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG:

Người lớn: Ngày uống 3 lần, mỗi lần 1 viên.

Trẻ em: Ngày uống 1-2 lần, mỗi lần 1 viên.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Không dùng cho bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.
- Không dùng cho phụ nữ có thai.
- Không dùng cho người đang có xuất huyết, có rối loạn đông máu.

THẬN TRỌNG:

Thận trọng khi dùng thuốc cho những bệnh nhân sau:

- Bệnh nhân đang dùng thuốc chống đông.
- Phụ nữ cho con bú, trẻ em dưới 12 tuổi.



BỔ HUYẾT ÍCH NÃO

Dùng cho người:

• Giảm trí nhớ, kém tập trung
• Thiếu năng tuần hoàn não

Thuốc từ dược liệu



BỔ HUYẾT ÍCH NÃO

Dùng cho người:

• Giảm trí nhớ, kém tập trung
• Thiếu năng tuần hoàn não



HỘP 5 VỈ X 10 VIÊN NANG CỨNG

BỔ HUYẾT ÍCH NÃO

Dùng cho người:

• Giảm trí nhớ, kém tập trung
• Thiếu năng tuần hoàn não



SĐK:		CÔNG TY TNHH NAM DƯỢC	
Thuốc từ dược liệu			
BỔ HUYẾT ÍCH NÃO			
Cao khô Đương quy		0,3g	
(tương đương với Đương quy		1,3g)	
Cao khô lá bạch quả		0,04g	
Dùng cho người:		• Giảm trí nhớ, kém tập trung • Thiếu năng tuần hoàn não	
SĐK:			
Thuốc từ dược liệu			
BỔ HUYẾT ÍCH NÃO			
Cao khô Đương quy		0,3g	
(tương đương với Đương quy		1,3g)	
Cao khô lá bạch quả		0,04g	
Dùng cho người:		• Giảm trí nhớ, kém tập trung • Thiếu năng tuần hoàn não	
SĐK:		CÔNG TY TNHH NAM DƯỢC	
Thuốc từ dược liệu			
BỔ HUYẾT ÍCH NÃO			
Cao khô Đương quy		0,3g	
(tương đương với Đương quy		1,3g)	
Cao khô lá bạch quả		0,04g	
Dùng cho người:		• Giảm trí nhớ, kém tập trung • Thiếu năng tuần hoàn não	



GIÁM ĐỐC
ĐS: Phạm Văn Đông

Hướng dẫn sử dụng thuốc cho người bệnh

BỔ HUYẾT ÍCH NÃO

- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
- Để xa tầm tay trẻ em.
- Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

THÀNH PHẦN: Mỗi viên nang chứa:

Cao khô Đương quy (*Extractum Radix Angelicae sinensis siccus*) 0,3g
(tương đương với Đương quy (*Radix Angelicae sinensis*) 1,3g)
Cao khô lá bạch quả (*Extractum Folii Ginkgo siccus*) 0,04g
Tá dược vừa đủ 1 viên
(Avicel, calci carbonat, PEG 6000, tween 80, talc, magnesi stearate, kali sorbat)

DẠNG BẢO CHẾ: viên nang cứng

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 3 vỉ, 5 vỉ x 10 viên nang cứng.

THUỐC DÙNG CHO BỆNH GÌ: Dùng cho người:

- Giảm trí nhớ, kém tập trung đặc biệt ở người lớn tuổi.
- Thiếu năng tuần hoàn não, ù tai, chóng mặt, giảm thính lực.

NÊN DÙNG THUỐC NÀY NHƯ THẾ NÀO VÀ LIỀU LƯỢNG:

- Người lớn: Ngày uống 3 lần, mỗi lần 1 viên.
- Trẻ em: Ngày uống 1-2 lần, mỗi lần 1 viên.
- Hoặc dùng theo chỉ dẫn của thầy thuốc.

KHI NÀO KHÔNG NÊN DÙNG THUỐC NÀY:

- Không dùng cho bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.
- Không dùng cho phụ nữ có thai.
- Không dùng cho người đang có xuất huyết, có rối loạn đông máu.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN: Rối loạn tiêu hóa, nhức đầu, dị ứng da. Thường do dùng thuốc lâu ngày. Có thể kéo dài thời gian chảy máu.

NÊN TRÁNH DÙNG NHỮNG THUỐC HOẶC THỰC PHẨM GÌ KHI ĐANG SỬ DỤNG THUỐC NÀY:

Không dùng cùng thuốc chống đông.

CẦN LÀM GÌ KHI MỘT LẦN QUÊN KHÔNG DÙNG THUỐC: Chưa có báo cáo

CẦN BẢO QUẢN THUỐC NÀY NHƯ THẾ NÀO: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

NHỮNG DẤU HIỆU VÀ TRIỆU CHỨNG KHI DÙNG THUỐC QUÁ LIỀU: Chưa có báo cáo

CẦN PHẢI LÀM GÌ KHI DÙNG THUỐC QUÁ LIỀU KHUYẾN CÁO: Chưa có báo cáo

NHỮNG ĐIỀU CẦN THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC NÀY: Thận trọng khi dùng thuốc cho những bệnh nhân sau:

- Bệnh nhân đang dùng thuốc chống đông.
- Phụ nữ cho con bú, trẻ em dưới 12 tuổi.

KHI NÀO CẦN THAM VẤN BÁC SỸ, DƯỢC SĨ:

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sỹ hoặc dược sỹ.

HẠN DÙNG CỦA THUỐC: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.



Nhà sản xuất: Công ty TNHH NAM DƯỢC
ĐC: Lô M13 (C4-9) KCN Hòa Xá, Xã Mỹ Xá, TP. Nam Định
ĐT: 024. 73056199 - 028.73056199
Website: www.namduoc.vn



NGÀY XEM XÉT SỬA ĐỔI, CẬP NHẬT LẠI NỘI DUNG HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC:

GIÁM ĐỐC
DS: Phạm Văn Đông



Hướng dẫn sử dụng thuốc cho cán bộ y tế

BỔ HUYẾT ÍCH NÃO

TUQ.CỤC TRƯỞNG

P.TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Ngọc Anh

Dùng cho người:

- Giảm trí nhớ, kém tập trung
- Thiếu năng tuần hoàn não

- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
- Để xa tầm tay trẻ em.
- Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

THÀNH PHẦN: Mỗi viên nang chứa:

Cao khô Đương quy (*Extractum Radix Angelicae sinensis siccus*) 0,3g
(tương đương với Đương quy (*Radix Angelicae sinensis*).....1,3g)
Cao khô lá bạch quả (*Extractum Folii Ginkgo siccus*) 0,04g
Tá dược vừa đủ 1 viên
(Avicel, calci carbonat, PEG 6000, tween 80, talc, magnesi stearate, kali sorbat)

DẠNG BẢO CHẾ: viên nang cứng

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 3 vỉ, 5 vỉ x 10 viên nang cứng

CHỈ ĐỊNH: Dùng cho người:

- Giảm trí nhớ, kém tập trung đặc biệt ở người lớn tuổi.
- Thiếu năng tuần hoàn não, ù tai, chóng mặt, giảm thính lực.

LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG:

- Người lớn: Ngày uống 3 lần, mỗi lần 1 viên.
- Trẻ em: Ngày uống 1-2 lần, mỗi lần 1 viên.
- Hoặc dùng theo chỉ dẫn của thầy thuốc.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Không dùng cho bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.
- Không dùng cho phụ nữ có thai.
- Không dùng cho người đang có xuất huyết, có rối loạn đông máu.

TƯƠNG TÁC THUỐC: chưa có báo cáo

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN: Rối loạn tiêu hóa, nhức đầu, dị ứng da. Thường do dùng thuốc lâu ngày. Có thể kéo dài thời gian chảy máu.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ: chưa có báo cáo

CÁC DẤU HIỆU LƯU Ý VÀ CÁC KHUYẾN CÁO KHÁC CỦA THUỐC:

Thận trọng khi dùng thuốc cho những bệnh nhân sau:

- Bệnh nhân đang dùng thuốc chống đông.
- Phụ nữ cho con bú, trẻ em dưới 12 tuổi.

BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

HẠN DÙNG CỦA THUỐC: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.



Nhà sản xuất: Công ty TNHH NAM DƯỢC
ĐC: Lô M13 (C4-9) KCN Hòa Xá, Xã Mỹ Xá, TP. Nam Định
ĐT: 024. 73056199 - 028.73056199
Website: www.namduoc.vn



NGÀY XEM XÉT SỬA ĐỔI, CẬP NHẬT LẠI NỘI DUNG HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC: