


MẪU HỘP GIÁN TIẾP TỈ LỆ 80/100 SO VỚI KÍCH THƯỚC HỘP THẬT



Tiền Giang, Ngày 2 tháng 12 năm 2015
CƠ SỞ SẢN XUẤT
ĐÔNG NAM DƯỢC TRUNG AN
CHỦ CƠ SỞ



LY: Nguyễn Văn Diệp

MẪU NHÃN TRỰC TIẾP TỈ LỆ 100/100 SO VỚI KÍCH THƯỚC NHÃN THẬT

BỔ THẬN ÂM

TƯ ÂM BỔ THẬN

Chai 45 gam




CSSX Đông Nam Dược Trung An
43/1A, KP.Trung Lương, P.10, TP.Mỹ Tho
Tiền giang, ĐT: (073) - 858789 - 857380
E mail: trungantg@gmail.com

Chung thảo: chai 45 gam
- 30 gam Bột được liện tương đương với:
- Thục địa: (*Radix Rehmanniae glutinosa preparata*) 9,4 gam
- Sơn thù: (*Fructus corni officinalis*) 4,7 gam
- Hoài sơn: (*Rhizoma Dioscoreae peruviana*) 4,7 gam
- Mâm đơn bì: (*Cortex Paconiae suffruticosa*) 3,8 gam
- Trạch tả: (*Rhizoma Alismatis*) 3,8 gam
- Phục linh: (*Poria cocos*) 3,8 gam
- 27,6 ml Cao lỏng được liện tương đương với:
- Thục địa: (*Radix Rehmanniae glutinosa preparata*) 8,6 gam
- Sơn thù: (*Fructus corni officinalis*) 4,3 gam
- Sơn dược: (*Rhizoma Dioscoreae peruviana*) 4,3 gam
- Mâm đơn bì: (*Cortex Paconiae suffruticosa*) 3,4 gam
- Trạch tả: (*Rhizoma Alismatis*) 3,4 gam
- Phục linh: (*Poria cocos*) 3,4 gam
Tà dược:
- Tinh bột sắn (*Amylon Manihoti*) 3,15 gam
- Bột Talc: (*Talcum*) 5,4 gam
- Than hoạt: (*Carbo activatus*) 3,6 gam
- Acid benzoic (*Acidum benzoicum*) 0,09 gam
- Ethanol 96% (*Ethanolium 96%*) 0,45 gam

Công năng: - Tư âm bổ thận.
Chủ trị: - Trị thận âm suy, đau lưng, hoa mắt, chóng mặt, ù tai, thất lưng đau gối mỏi yếu, đổ mồ hôi trộm, di tinh, tiểu khát.
Chống chỉ định: - Không dùng cho trẻ em dưới 2 tuổi, người huyết áp thấp, cảm mạo, tỷ vị hàn tiêu chảy.
Liều dùng - Cách dùng:
*Ngày uống 2-3 lần
- Người lớn mỗi lần uống 20 hoản (tương đương 2,5 gam)
- Trẻ em: 6-12 tuổi, mỗi lần uống 8 hoản (tương đương 1 gam)
- Trẻ em: 2-6 tuổi, mỗi lần uống 2 hoản (tương đương 0,25 gam)
Chú ý: Để xa tầm tay trẻ em.
- Đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng.
- BQ: Để nơi khô ráo, thoáng mát, dưới 30°C
- Tiêu chuẩn: tiêu chuẩn cơ sở

SDK:.....
Ngày SX:.....
Số lô:.....
Hạn dùng:.....

Tiền Giang, Ngày 2 tháng 12 năm 2015
CƠ SỞ SẢN XUẤT
ĐÔNG NAM DƯỢC TRUNG AN
CHỦ CƠ SỞ



LY: Nguyễn Văn Diệp

✓

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Tên sản phẩm: BỔ THẬN ÂM

2. Mô tả sản phẩm: Hoàn cứng, hình cầu, nhân bên trong màu nâu đen, thơm mùi dược liệu, vị hơi ngọt.

3. Thành phần của thuốc: Công thức (cho một đơn vị đóng gói nhỏ nhất):
Chai 45gam (tương đương 360 viên hoàn cứng)
- CƠ SỞ SẢN XUẤT ĐÔNG Y
TRUNG
SỐ KKĐ: 53A/80
T. KP. Trưng Vương - P.10

STT	Thành phần (INN)	Khối lượng
Dược chất:		
30gam Bột dược liệu tương đương với:		
1	Thục địa (<i>Radix Rhemanniae glutinosae praeparata</i>)	9,4gam
2	Sơn thù (<i>Fructus corni officinalis</i>)	4,7gam
3	Hoài sơn (<i>Tuber Dioscoreae Persimilis</i>)	4,7gam
4	Mẫu đơn bì (<i>Cortex Paeoniae suffruticosae</i>)	3,8gam
5	Trạch tả (<i>Rhizoma Alismatis</i>)	3,8gam
6	Phục linh (<i>Poria cocos</i>)	3,8gam
27,6ml Cao lỏng dược liệu tương đương với		
1	Thục địa (<i>Radix Rhemanniae glutinosae praeparata</i>)	8,6gam
2	Sơn thù (<i>Fructus corni officinalis</i>)	4,3gam
3	Hoài sơn (<i>Tuber Dioscoreae Persimilis</i>)	4,3gam
4	Mẫu đơn bì (<i>Cortex Paeoniae suffruticosae</i>)	3,4gam
5	Trạch tả (<i>Rhizoma Alismatis</i>)	3,4gam
6	Phục linh (<i>Poria cocos</i>)	3,4gam
Tá dược:		
1	Tinh bột sắn (<i>Amylum Manihoti</i>)	3,15gam
2	Bột Talc (<i>Talcum</i>)	5,4gam
3	Than hoạt (<i>Carbo activatus</i>)	3,6gam
4	Acid Benzoic (<i>Acidum benzoicum</i>)	0,09gam
5	Ethanol 96% (<i>Ethanolum 96%</i>)	0,45gam

- 4.Hàm lượng thuốc:
- 5.Công năng- Chủ trị:

-Công năng: Tư âm, bổ thận

-Chủ trị: thận âm suy, đầu vầng, hoa mắt, chóng mặt, ù tai, thất lung đầu gối mỏi yếu, đồ mồ hôi trộm, di tinh, tiêu khát.
- 6.Chống chỉ định:

-Không dùng cho trẻ em dưới 2 tuổi.

-Người huyết áp thấp, cảm mạo, tỳ vị hàn tiêu chảy.
- 7.Tác dụng không mong muốn: Chưa có báo cáo.

20

8.Liều dùng - Cách dùng : *Ngày uống 2-3 lần

–Người lớn mỗi lần uống 20 hoàn (tương đương 2,5gam).

–Trẻ em: 6-12 tuổi, mỗi lần 8 hoàn (tương đương 1 gam)

–Trẻ em: 2-6 tuổi, mỗi lần uống 2 hoàn (tương đương 0,25gam).



9.Kiêng cử khi dùng thuốc:

Không nên ăn rau má, rau răm, diếp cá, củ cải trắng, đồ biển như: Ốc, sò nghêu v...v...

10.Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú: Được sử dụng

11.Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc:

Thuốc thường không gây ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc.

12.Tương tác với các thuốc khác và các dạng tương tác khác : Chưa có báo cáo.

13.Quá liều và xử trí:

Khi dùng quá liều có thể gặp một số tác dụng không mong muốn. Sử dụng đúng liều các tác dụng phụ sẽ hết

14.Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất

15.Bảo quản: Để nơi khô ráo, thoáng mát, dưới 30°C

16.Tiêu chuẩn chất lượng: Tiêu chuẩn cơ sở.

17.Trình bày: Hộp 1lọ x 45 g hoàn cứng và 01 tờ hướng dẫn sử dụng.

Chú ý:

Thông báo cho bác sỹ tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Để xa tầm tay trẻ em – Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần biết thêm thông tin xin hỏi ý kiến của thầy thuốc

CƠ SỞ SẢN XUẤT ĐÔNG NAM DUỐC TRUNG AN

Số 43/1A, Khu phố Trung Lương, F10, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang


Điện thoại: (0733)857380

Fax: (0733) 858789

Tiền Giang, ngày 01 tháng 12 năm 2015



**TUQ.CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG**
Lô Minh Hùng



LY: Nguyễn Văn Diệp