

Nhãn Dán Bô Tỳ 110x53mm

Thành phần

Đảng sâm (<i>Radix Codonopsis</i>).....	7 g
Bạch truật (<i>Rhizoma Atractylodis</i>).....	11 g
Bạch linh (<i>Poria</i>).....	6 g
Cam thảo (<i>Radix Glycyrrhizae</i>).....	10 g
Thục địa (<i>Radix Rehmanniae glutinosae praeparata</i>).....	4 g
Liên nhục (<i>Semen Nelumbinis</i>).....	4 g
Đại táo (<i>Fructus Ziziphi Jujubae</i>).....	4 g
Gừng tươi (<i>Rhizoma Zingiberis</i>).....	1g
Natri benzoat (<i>Natrii benzoas</i>).....	0,125 g
Đường trắng (<i>Saccharum</i>).....	75 g
Nước Ro (<i>Aqua purificata</i>).....	vđ 125 ml

Chỉ định:
Kích thích tiêu hóa, giúp ăn ngon miệng. Dùng cho trẻ kén ăn, còi xương, suy dinh dưỡng, chậm lớn. Dùng cho người lớn trong thời kỳ dưỡng bệnh.

Liều dùng:
Ngày uống 3 – 4 lần.
+ Trẻ em 6 tháng – 3 tuổi: Mỗi lần 10 ml.
+ Trẻ em từ 3 – 12 tuổi: Mỗi lần 15 ml.
+ Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: Mỗi lần 20 ml.

Cách dùng:
Uống trực tiếp hoặc có thể pha với một ít nước ấm hoặc nước đun sôi để nguội cho dễ uống.

Lắc kỹ trước khi sử dụng

SDK:
Số lô SX:
Ngày SX:
HD:

GMP WHO

BÔ TỖ

NGUỒN GỐC THẢO DƯỢC

CT C.P DƯỢC PHẨM YÊN BÀI
725 Đường Yên Ninh - T.P Yên Bái

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 19/09/2017

503/159

Phy



Thuốc uống

BÔ TỖ

- Kém ăn, chậm lớn
- Còi xương, suy dinh dưỡng
- Kích thích tiêu hoá

Hộp Bô Tỳ 50x50x130

Thuốc uống

BÔ TỖ



NGUỒN GỐC THẢO DƯỢC

Thành phần

Đảng sâm (<i>Radix Codonopsis</i>).....	7 g
Bạch truật (<i>Rhizoma Atractylodis</i>).....	11 g
Bạch linh (<i>Poria</i>).....	6 g
Cam thảo (<i>Radix Glycyrrhizae</i>).....	10 g
Thục địa (<i>Radix Rehmanniae glutinosae praeparata</i>).....	4 g
Liên nhục (<i>Semen Nelumbinis</i>).....	4 g
Đại táo (<i>Fructus Ziziphi Jujubae</i>).....	4 g
Gừng tươi (<i>Rhizoma Zingiberis</i>).....	1g
Natri benzoat (<i>Natrii benzoas</i>).....	0,125 g
Đường trắng (<i>Saccharum</i>).....	75 g
Nước Ro (<i>Aqua purificata</i>).....	vđ 125 ml

Chỉ định:

Kích thích tiêu hóa, giúp ăn ngon miệng. Dùng cho trẻ kén ăn, còi xương, suy dinh dưỡng, chậm lớn. Dùng cho người lớn trong thời kỳ dưỡng bệnh.

Bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát, nhiệt độ không quá 30°C.

Tiêu chuẩn: TCCS

Thuốc uống

GMP WHO

BÔ TỖ

NGUỒN GỐC THẢO DƯỢC

125ml Sirô



Thuốc uống

BÔ TỖ



NGUỒN GỐC THẢO DƯỢC

Liều dùng:

Ngày uống 3 – 4 lần,
+ Trẻ em 6 tháng – 3 tuổi: Mỗi lần 10 ml.
+ Trẻ em từ 3 – 12 tuổi: Mỗi lần 15 ml.
+ Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: Mỗi lần 20 ml.

CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH, TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN, KIỂM KÝ, TƯƠNG TÁC, LẠI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC: Xin xem tờ hướng dẫn sử dụng trong hộp thuốc.

Lắc kỹ trước khi sử dụng
ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

SDK:

Số lô SX:

Ngày sx:

HD:

Manufactured by:
YEN BAI PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY
725 Yen Ninh - Yen Bai City



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM YÊN BÀI
725 Đường Yên Ninh - T.P Yên Bái

Thuốc uống

GMP WHO

BÔ TỖ

NGUỒN GỐC THẢO DƯỢC

125ml Sirô



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM YÊN BÀI
725 Đường Yên Ninh - T.P Yên Bái

Tờ hướng dẫn sử dụng BỔ TỶ

1. Thông tin cho người bệnh:

* Tên sản phẩm: BỔ TỶ

* Khuyến cáo:

“Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng”

“Để xa tầm tay trẻ em”

“Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc”

* Công thức cho 1 đơn vị đóng gói nhỏ nhất (1 chai):

Hoạt chất:	Tên khoa học	Hàm lượng	Tiêu chuẩn
Đảng sâm	<i>Radix Codonopsis</i>	7 g	ĐDVN IV
Bạch truật	<i>Rhizoma Atractylodis macrocephalae</i>	11 g	
Bạch linh	<i>Poria</i>	6 g	
Cam thảo	<i>Radix Glycyrrhizae</i>	10 g	
Thục địa	<i>Radix Rehmanniae glutinosae praeparata</i>	4 g	
Liên nhục	<i>Semen Nelumbinis</i>	4 g	
Đại táo	<i>Fructus Ziziphi Jujubae</i>	4 g	
Gừng tươi	<i>Rhizoma Zingiberis</i>	1 g	
Tá dược		Hàm lượng	
Natri benzoat	<i>Natrii benzoas</i>	0,125 g	ĐDVN IV
Đường trắng	<i>Saccharum</i>	75 g	
Nước Ro	<i>Aqua purificata</i>	vđ 125 ml	

* **Mô tả sản phẩm:** Chế phẩm là chất lỏng sánh màu nâu đen, mùi thơm được liệu, vị ngọt.

* **Quy cách đóng gói:** Thuốc được đóng trong chai nhựa 125 ml, dán nhãn, nút chắc chắn, 1 chai + 1 tờ HDSD/ hộp, nhãn đúng quy chế.

* **Thuốc dùng cho** trẻ kém ăn, còi xương, suy dinh dưỡng, chậm lớn. Dùng cho người lớn trong thời kỳ dưỡng bệnh.

* **Liều lượng và cách dùng:**

Liều lượng: Ngày uống 3 – 4 lần,

+ Trẻ em 6 tháng – 3 tuổi: Mỗi lần 10 ml.

+ Trẻ em từ 3 – 12 tuổi: Mỗi lần 15 ml.

+ Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: Mỗi lần 20 ml.

Cách dùng: Uống trực tiếp hoặc có thể pha với một ít nước ấm hoặc nước đun sôi để nguội cho dễ uống.

* **Thuốc này không dùng cho** bệnh nhân đái tháo đường, người mẫn cảm với các thành phần nào của thuốc.

* **Tác dụng không mong muốn:** Trong suốt thời gian lưu hành, chưa thấy có phản hồi về tác dụng không mong muốn của thuốc.

* **Những thuốc hoặc thực phẩm khi đang sử dụng thuốc này nên tránh:**

- Chưa có báo cáo

* **Khi một lần quên không dùng thuốc:**

- Uống thuốc ngay khi bạn nhớ ra và KHÔNG uống gấp đôi liều dùng để bù lại thuốc chưa uống.

* **Bảo quản:** Nơi khô ráo, thoáng mát, nhiệt độ không quá 30°C.

* **Những dấu hiệu và triệu chứng khi dùng thuốc quá liều:** Chưa có báo cáo.

* Khi dùng thuốc quá liều khuyến cáo, đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ.

* **Thận trọng khi dùng thuốc này:** - Chưa có báo cáo

* **Cần tham vấn bác sỹ hoặc dược sĩ của bạn:** Nếu có bất kỳ phản ứng nào khác thường xuất hiện khi bạn sử dụng thuốc.

* **Hạn dùng của thuốc:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

* **Tên nhà sản xuất, chủ sở hữu giấy phép đăng ký sản phẩm:**

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM YÊN BÁI

Địa chỉ: Số 725 - Đường Yên Ninh – TP. Yên Bái – Tỉnh Yên Bái

* **Ngày xem xét sửa đổi lại nội dung hướng dẫn sử dụng thuốc:**

2. Thông tin cho cán bộ y tế

* **Chỉ định:** Kích thích tiêu hóa, giúp ăn ngon miệng. Dùng cho trẻ kém ăn, còi xương, suy dinh dưỡng, chậm lớn. Dùng cho người lớn trong thời kỳ dưỡng bệnh.

* **Liều dùng – Cách dùng:**

Liều dùng: Ngày uống 3 – 4 lần,

+ Trẻ em 6 tháng – 3 tuổi: Mỗi lần 10 ml.

+ Trẻ em từ 3 – 12 tuổi: Mỗi lần 15 ml.

+ Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: Mỗi lần 20 ml.

Cách dùng: Uống trực tiếp hoặc có thể pha với một ít nước ấm hoặc nước đun sôi để nguội cho dễ uống.

* **Chống chỉ định:** Không dùng cho bệnh nhân đái tháo đường và người mẫn cảm với các thành phần của thuốc.

* **Kiên kỵ, tương tác:** Không.

* **Tác dụng không mong muốn:** Trong suốt thời gian lưu hành, chưa thấy có phản hồi về tác dụng không mong muốn của thuốc.

* **Quá liều và cách xử trí:** Chưa có báo cáo về việc sử dụng quá liều. Trong trường hợp vô tình uống nhầm thuốc với liều lượng lớn, cần báo ngay cho nhân viên y tế để có các biện pháp hỗ trợ kịp thời.

* **Lái xe và vận hành máy móc:** Không ảnh hưởng.

Mọi chi tiết xin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM YÊN BÁI

Địa chỉ: Số 725 - Đường Yên Ninh – TP. Yên Bái – Tỉnh Yên Bái

ĐT: 0293 852 523

Fax: 0293 850 364

Yên Bái, ngày 14 tháng 04 năm 2017

GIÁM ĐỐC



HOÀNG THỊ BÌNH



**TUQ. CỤC TRƯỞNG
P. TRƯỞNG PHÒNG
Đỗ Minh Hùng**