

Hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng

BỘ Y TẾ  
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC  
ĐÃ PHÊ DUYỆT

10 vỉ x 10 viên nang cứng  
Lần đầu: 08/07/2017



LONG ĐỒM  
GIẢM HO

**Bromhexin 8**

*Bromhexin hydrochlorid 8mg*



**Bromhexin 8**

*Bromhexin hydrochlorid 8mg*

LONG ĐỒM  
GIẢM HO





**THÀNH PHẦN**

Bromhexin hydrochlorid ..... 8mg  
Tá dược v.đ ..... 1 viên nang cứng

**CHỈ ĐỊNH**

Bromhexin 8 được dùng để điều trị triệu chứng ho đờm trong các bệnh lý đường hô hấp như: viêm phế quản cấp tính; đợt cấp tính của viêm phế quản mạn tính; nhiễm khuẩn đường hô hấp nặng (sử dụng như chất bổ trợ với kháng sinh).

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH**

Mẫn cảm với bromhexin hoặc thành phần có trong thuốc.

**LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG**

Uống với một cốc nước.

Người lớn và trẻ em trên 10 tuổi: 1 viên/lần, ngày 3 lần.

Thời gian điều trị không quá 8-10 ngày trừ khi có ý kiến của Thầy thuốc.

**Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM**

59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An  
ĐT: (072) 3.829.311 • Fax: (072) 3.842.244

Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh,  
Thành phố Tân An, Tỉnh Long An [www.vacopharm.com](http://www.vacopharm.com)

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

10 blisters x 10 capsules

**Bromhexin 8**

*Bromhexin hydrochlorid 8mg*

EXPECTORANT  
COUGH SUPPRESSANT



**Bromhexin 8**

*Bromhexin hydrochlorid 8mg*

EXPECTORANT  
COUGH SUPPRESSANT



**Bromhexin 8**

*Bromhexin hydrochlorid 8mg*

EXPECTORANT  
COUGH SUPPRESSANT





Để xa tầm tay của trẻ em  
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng  
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,  
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

SĐK :  
Số lô SX :  
Ngày SX :  
HD :

Hộp 20 vỉ x 10 viên nang cứng



LONG ĐỒM  
GIẢM HO

*Bromhexin hydroclorid 8mg*



**Bromhexin 8**

20 vỉ x 10 viên nang cứng

**Bromhexin 8**

*Bromhexin hydroclorid 8mg*

**LONG ĐỒM  
GIẢM HO**



**THÀNH PHẦN**  
Bromhexin hydroclorid ..... 8mg  
Tá được v.d ..... 1 viên nang cứng

**CHỈ ĐỊNH**  
Bromhexin 8 được dùng để điều trị triệu chứng ho đờm trong các bệnh lý đường hô hấp như: viêm phế quản cấp tính; đợt cấp tính của viêm phế quản mạn tính; nhiễm khuẩn đường hô hấp nặng (sử dụng như chất bổ trợ với kháng sinh).

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH**  
Mẫn cảm với bromhexin hoặc thành phần có trong thuốc.

**LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG**  
Uống với một cốc nước.  
Người lớn và trẻ em trên 10 tuổi: 1 viên/lần, ngày 3 lần.  
*Thời gian điều trị không quá 8-10 ngày trừ khi có ý kiến của Thầy thuốc.*

**Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM**  
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An  
ĐT: (072) 3.829.311 \* Fax: (072) 3.822.244  
Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh,  
Thành phố Tân An, Tỉnh Long An [www.vacopharm.com](http://www.vacopharm.com)

MOI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỔ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

20 blisters x 10 capsules

**Bromhexin 8**

*Bromhexin hydroclorid 8mg*

**EXPECTORANT  
COUGH SUPPRESSANT**



**Bromhexin 8**

*Bromhexin hydroclorid 8mg*

**EXPECTORANT  
COUGH SUPPRESSANT**



Để xa tầm tay của trẻ em  
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng  
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,  
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

SĐK :  
Số lô SX :  
Ngày SX :  
HD :

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN



Hộp 100 vỉ x 10 viên nang cứng

**Bromhexin 8**

100 vỉ x 10 viên nang cứng

**THÀNH PHẦN**  
Bromhexin hydroclorid ..... 8mg  
Tá dược v.d ..... 1 viên nang cứng

**CHỈ ĐỊNH, LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH:**  
xem tờ hướng dẫn sử dụng.

**Mọi thông tin chi tiết xin đọc  
trong tờ hướng dẫn sử dụng**

**Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM**  
Số Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An  
ĐT: (0272) 3 629.311      Fax: (075) 3 622.244  
Địa chỉ nhà máy: Km 1054, quốc lộ 1A, Phường  
Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An  
[www.vacopharm.com](http://www.vacopharm.com)

SER: :  
Số lô SX:  
Ngày SX:  
HD :

**ĐỂ XA TÂM TAY CỦA TRẺ EM**  
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG  
BẢO QUẢN NƠI KHÔ RÁO, THOÁNG MÁT,  
TRÁNH ÁNH SÁNG, NHIỆT ĐỘ KHÔNG QUÁ 30°C

**THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN**



*(Handwritten signature)*

Hộp 10 vỉ x 15 viên nang cứng



LONG ĐỒM  
GIẢM HO

Bromhexin 8

Bromhexin hydroclorid 8mg

10 vỉ x 15 viên nang cứng

Bromhexin 8

Bromhexin hydroclorid 8mg

LONG ĐỒM  
GIẢM HO





**THÀNH PHẦN**

Bromhexin hydroclorid .....8mg  
Tà được v.đ ..... 1 viên nang cứng

**CHỈ ĐỊNH**

Bromhexin 8 được dùng để điều trị triệu chứng ho đờm trong các bệnh lý đường hô hấp như: viêm phế quản cấp tính; đợt cấp tính của viêm phế quản mạn tính; nhiễm khuẩn đường hô hấp nặng (sử dụng như chất bổ trợ với kháng sinh).

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH**

Mẫn cảm với bromhexin hoặc thành phần có trong thuốc.

**LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG**

Uống với một cốc nước.  
Người lớn và trẻ em trên 10 tuổi: 1 viên/lần, ngày 3 lần.  
Thời gian điều trị không quá 8-10 ngày trừ khi có ý kiến của Thầy thuốc.

**Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM**

59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An  
ĐT: (072) 3.829.311 \* Fax: (072) 8.822.244  
Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường Tân Hưng,  
Thành phố Tân An, Tỉnh Long An [www.viacopharm.com](http://www.viacopharm.com)

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

10 blisters x 15 capsules

Bromhexin 8

Bromhexin hydroclorid 8mg

EXPECTORANT  
COUGH SUPPRESSANT





Bromhexin 8

Bromhexin hydroclorid 8mg

EXPECTORANT  
COUGH SUPPRESSANT



Để xa tầm tay của trẻ em  
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng  
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,  
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

SDK :  
Số lô SX :  
Ngày SX :  
HD :





Hộp 100 vỉ x 15 viên nang cứng

**Bromhexin 8**

100 vỉ x 15 viên nang cứng

*Bromhexin hydroclorid 8mg*

**THÀNH PHẦN**  
Bromhexin hydroclorid ..... 8mg  
Tá dược v ..... 1 viên nang cứng

**CHỈ ĐỊNH, LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH:**  
xem tờ hướng dẫn sử dụng

**MỖI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**

**Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM**  
Số Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An  
ĐT: 0270 3 695 311      Fax: 0270 3 432 244  
Đồ gó và máy: Km 1054, quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An  
[www.vacopharm.com](http://www.vacopharm.com)

SĐH:      ☐  
Số lô SX:      ☐  
Ngày SX:      ☐  
HĐ:      ☐

Để XA TẮM TAY CỦA TRẺ EM  
ĐƯỢC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG  
BẢO QUẢN NƠI KHÔ RÁO, THOÁNG MÁT,  
TRÁNH ÁNH SÁNG, NHIỆT ĐỘ KHÔNG QUÁ 30°C

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN



*[Handwritten signature]*



Hộp 5 vỉ x 20 viên nang cứng



LONG ĐỒM  
GIẢM HO

Bromhexin hydroclorid 8mg

**Bromhexin 8**

5 vỉ x 20 viên nang cứng

**Bromhexin 8**

*Bromhexin hydroclorid 8mg*

LONG ĐỒM  
GIẢM HO





**THÀNH PHẦN**

Bromhexin hydroclorid ..... 8mg  
Tá được v.đ ..... 1 viên nang cứng

**CHỈ ĐỊNH**

Bromhexin 8 được dùng để điều trị triệu chứng ho đờm trong các bệnh lý đường hô hấp như: viêm phế quản cấp tính; đợt cấp tính của viêm phế quản mạn tính; nhiễm khuẩn đường hô hấp nặng (sử dụng như chất bổ trợ với kháng sinh).

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH**

Mẫn cảm với bromhexin hoặc thành phần có trong thuốc.

**LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG**

Uống với một cốc nước.  
Người lớn và trẻ em trên 10 tuổi: 1 viên/lần, ngày 3 lần.  
Thời gian điều trị không quá 8-10 ngày trừ khi có ý kiến của Thầy thuốc.

**Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM**

59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An  
ĐT: (072) 3.829.311 • Fax: (072) 3.822.244  
Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh,  
Thành phố Tân An, Tỉnh Long An [WWW.VACOPHARM.COM](http://WWW.VACOPHARM.COM)

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



**Bromhexin 8**

*Bromhexin hydroclorid 8mg*

EXPECTORANT  
COUGH SUPPRESSANT



5 blisters x 20 capsules

**Bromhexin 8**

*Bromhexin hydroclorid 8mg*

EXPECTORANT  
COUGH SUPPRESSANT





*Bromhexin hydroclorid 8mg*

**Bromhexin 8**

EXPECTORANT  
COUGH SUPPRESSANT



Để xa tầm tay của trẻ em  
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng  
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,  
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

SĐK :  
Số lô SX :  
Ngày SX :  
HD :

Hộp 10 vỉ x 20 viên nang cứng

**LONG ĐỜM  
GIẢM HO**

**Bromhexin 8**

*Bromhexin hydroclorid 8mg*



10 vỉ x 20 viên nang cứng

**Bromhexin 8**

*Bromhexin hydroclorid 8mg*

**LONG ĐỜM  
GIẢM HO**





**THÀNH PHẦN**  
Bromhexin hydroclorid ..... 8mg  
Tá dược v.đ ..... 1 viên nang cứng

**CHỈ ĐỊNH**  
Bromhexin 8 được dùng để điều trị triệu chứng ho đờm trong các bệnh lý đường hô hấp như: viêm phế quản cấp tính; đợt cấp tính của viêm phế quản mạn tính; nhiễm khuẩn đường hô hấp nặng (sử dụng như chất bổ trợ với kháng sinh).

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH**  
Mẫn cảm với bromhexin hoặc thành phần có trong thuốc.

**LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG**  
Uống với một cốc nước.  
Người lớn và trẻ em trên 10 tuổi: 1 viên/lần, ngày 3 lần.  
*Thời gian điều trị không quá 8-10 ngày trừ khi có ý kiến của Thầy thuốc.*

**Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM**  
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An  
ĐT: (072) 3.829.311 • Fax: (072) 3.822.244  
Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường Tân Kiên, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An [www.vacopharm.com](http://www.vacopharm.com)

**MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỔ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**



**Bromhexin 8**

*Bromhexin hydroclorid 8mg*

**EXPECTORANT  
COUGH SUPPRESSANT**





10 blisters x 20 capsules

**Bromhexin 8**

*Bromhexin hydroclorid 8mg*

**EXPECTORANT  
COUGH SUPPRESSANT**



Để xa tầm tay của trẻ em  
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng  
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,  
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

SDK :  
Số lô SX :  
Ngày SX :  
HD :

**THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN**





2. Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất

Nhãn vì 10 viên



Nhãn vì 15 viên



Nhãn vì 20 viên



## 2. Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất

### Nhãn chai 100 viên nang cứng

**THÀNH PHẦN**  
Bromhexin hydroclorid ..... 8mg  
Tà được v.đ ..... 1 viên nang cứng

**CHỈ ĐỊNH**  
Bromhexin 8 được dùng để điều trị triệu chứng ho đờm trong các bệnh lý đường hô hấp như: viêm phế quản cấp tính; đợt cấp tính của viêm phế quản mạn tính; nhiễm khuẩn đường hô hấp nặng (sử dụng như chất bổ trợ với kháng sinh).

**LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG**  
Uống với một cốc nước.  
Người lớn và trẻ em trên 10 tuổi: 1 viên/lần, ngày 3 lần.  
Thời gian điều trị không quá 8-10 ngày trừ khi có ý kiến của Thầy thuốc.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH**  
Mẫn cảm với bromhexin hoặc thành phần có trong thuốc.

**Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM**  
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An  
ĐT: (072) 3.829.311 \* Fax: (072) 3.822.244  
Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh,  
Thành phố Tân An, Tỉnh Long An [www.vacopharm.com](http://www.vacopharm.com)

100 viên nang cứng

**Bromhexin 8**

Bromhexin hydroclorid 8mg

LONG ĐỒM  
GIẢM HO





SĐK :  
Số lô SX :  
Ngày SX :  
HD :

Để xa tầm tay của trẻ em  
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng  
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,  
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC  
TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

### Nhãn chai 200 viên nang cứng

**THÀNH PHẦN**  
Bromhexin hydroclorid ..... 8mg  
Tà được v.đ ..... 1 viên nang cứng

**CHỈ ĐỊNH**  
Bromhexin 8 được dùng để điều trị triệu chứng ho đờm trong các bệnh lý đường hô hấp như: viêm phế quản cấp tính; đợt cấp tính của viêm phế quản mạn tính; nhiễm khuẩn đường hô hấp nặng (sử dụng như chất bổ trợ với kháng sinh).

**LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG**  
Uống với một cốc nước.  
Người lớn và trẻ em trên 10 tuổi: 1 viên/lần, ngày 3 lần.  
Thời gian điều trị không quá 8-10 ngày trừ khi có ý kiến của Thầy thuốc.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH**  
Mẫn cảm với bromhexin hoặc thành phần có trong thuốc.

**Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM**  
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An  
ĐT: (072) 3.829.311 \* Fax: (072) 3.822.244  
Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh,  
Thành phố Tân An, Tỉnh Long An [www.vacopharm.com](http://www.vacopharm.com)

200 viên nang cứng

**Bromhexin 8**

Bromhexin hydroclorid 8mg

LONG ĐỒM  
GIẢM HO





SĐK :  
Số lô SX :  
Ngày SX :  
HD :

Để xa tầm tay của trẻ em  
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng  
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,  
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC  
TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

### Nhãn chai 500 viên nang cứng

**THÀNH PHẦN**  
Bromhexin hydroclorid ..... 8mg  
Tà được v.đ ..... 1 viên nang cứng

**CHỈ ĐỊNH**  
Bromhexin 8 được dùng để điều trị triệu chứng ho đờm trong các bệnh lý đường hô hấp như: viêm phế quản cấp tính; đợt cấp tính của viêm phế quản mạn tính; nhiễm khuẩn đường hô hấp nặng (sử dụng như chất bổ trợ với kháng sinh).

**LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG**  
Uống với một cốc nước.  
Người lớn và trẻ em trên 10 tuổi: 1 viên/lần, ngày 3 lần.  
Thời gian điều trị không quá 8-10 ngày trừ khi có ý kiến của Thầy thuốc.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH**  
Mẫn cảm với bromhexin hoặc thành phần có trong thuốc.

**Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM**  
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An  
ĐT: (072) 3.829.311 \* Fax: (072) 3.822.244  
Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh,  
Thành phố Tân An, Tỉnh Long An [www.vacopharm.com](http://www.vacopharm.com)

500 viên nang cứng

**Bromhexin 8**

Bromhexin hydroclorid 8mg

LONG ĐỒM  
GIẢM HO





SĐK :  
Số lô SX :  
Ngày SX :  
HD :

Để xa tầm tay của trẻ em  
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng  
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,  
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC  
TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

### Nhãn chai 1000 viên nang cứng

**THÀNH PHẦN**  
Bromhexin hydroclorid ..... 8mg  
Tà được v.đ ..... 1 viên nang cứng

**CHỈ ĐỊNH**  
Bromhexin 8 được dùng để điều trị triệu chứng ho đờm trong các bệnh lý đường hô hấp như: viêm phế quản cấp tính; đợt cấp tính của viêm phế quản mạn tính; nhiễm khuẩn đường hô hấp nặng (sử dụng như chất bổ trợ với kháng sinh).

**LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG**  
Uống với một cốc nước.  
Người lớn và trẻ em trên 10 tuổi: 1 viên/lần, ngày 3 lần.  
Thời gian điều trị không quá 8-10 ngày trừ khi có ý kiến của Thầy thuốc.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH**  
Mẫn cảm với bromhexin hoặc thành phần có trong thuốc.

**Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM**  
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An  
ĐT: (072) 3.829.311 \* Fax: (072) 3.822.244  
Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh,  
Thành phố Tân An, Tỉnh Long An [www.vacopharm.com](http://www.vacopharm.com)

1000 viên nang cứng

**Bromhexin 8**

Bromhexin hydroclorid 8mg

LONG ĐỒM  
GIẢM HO





SĐK :  
Số lô SX :  
Ngày SX :  
HD :

Để xa tầm tay của trẻ em  
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng  
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,  
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC  
TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

**1. Tên thuốc: BROMHEXIN 8**

**2. Các câu khuyến cáo**

Đề xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

**3. Thành phần, hàm lượng của thuốc**

Bromhexin hydroclorid 8mg  
Tá dược v.đ 1 viên nang cứng  
(Tinh bột sắn, Polyvinyl pyrrolidon K30, Acid stearic)

**4. Mô tả sản phẩm:** Viên nang cứng số 4, hai màu nâu – trắng ngà, không bẹp nứt, bên trong chứa bột thuốc màu trắng.

**5. Quy cách đóng gói**

| STT | Mô tả tóm tắt quy cách đóng gói |
|-----|---------------------------------|
| 1   | Ép vỉ, vỉ 10 viên, hộp 10 vỉ    |
| 2   | Ép vỉ, vỉ 10 viên, hộp 20 vỉ    |
| 3   | Ép vỉ, vỉ 10 viên, hộp 50 vỉ    |
| 4   | Ép vỉ, vỉ 10 viên, hộp 100 vỉ   |
| 5   | Ép vỉ, vỉ 15 viên, hộp 10 vỉ    |
| 6   | Ép vỉ, vỉ 15 viên, hộp 20 vỉ    |
| 7   | Ép vỉ, vỉ 15 viên, hộp 50 vỉ    |
| 8   | Ép vỉ, vỉ 15 viên, hộp 100 vỉ   |

| STT | Mô tả tóm tắt quy cách đóng gói |
|-----|---------------------------------|
| 9   | Ép vỉ, vỉ 20 viên, hộp 5 vỉ     |
| 10  | Ép vỉ, vỉ 20 viên, hộp 10 vỉ    |
| 11  | Ép vỉ, vỉ 20 viên, hộp 25 vỉ    |
| 12  | Ép vỉ, vỉ 20 viên, hộp 50 vỉ    |
| 13  | Đóng chai 100 viên              |
| 14  | Đóng chai 200 viên              |
| 15  | Đóng chai 500 viên              |
| 16  | Đóng chai 1000 viên             |

**6. Thuốc dùng cho bệnh gì?**

Bromhexin 8 được dùng để điều trị triệu chứng ho đờm trong các bệnh lý đường hô hấp như: viêm phế quản cấp tính; đợt cấp tính của viêm phế quản mạn tính; nhiễm khuẩn đường hô hấp nặng (sử dụng như chất bổ trợ với kháng sinh).

**7. Nên dùng thuốc này như thế nào và liều lượng?**

Uống với một cốc nước.

Người lớn và trẻ em trên 10 tuổi: 1 viên/lần, ngày 3 lần.

Thời gian điều trị không quá 8-10 ngày trừ khi có ý kiến của Thầy thuốc.

**8. Khi nào không nên dùng thuốc này?**

Mẫn cảm với bromhexin hoặc thành phần có trong thuốc.

**9. Tác dụng không mong muốn (ADR)**

Ít gặp, 1/1 000 < ADR < 1/100

Tiêu hóa: Đau vùng thượng vị, buồn nôn, nôn, tiêu chảy.

Thần kinh: Nhức đầu, chóng mặt, ra mồ hôi.

Da: Ban da, mẩn ngứa.

Hô hấp: Nguy cơ ứ dịch tiết phế quản ở người bệnh không có khả năng khạc đờm.

Hiếm gặp: ADR < 1/1 000

Tiêu hóa: Khô miệng.

Gan: Có thể làm tăng men aminotransferase AST, ALT.

**10. Nên tránh dùng những thuốc hoặc thực phẩm gì khi đang sử dụng thuốc này**

Không phối hợp với thuốc làm giảm tiết dịch (giảm cả dịch tiết khí phế quản) như các thuốc kiểu atropin (hoặc anticholinergic) vì làm giảm tác dụng của bromhexin.

Không phối hợp với các thuốc chống ho.

Dùng phối hợp bromhexin với kháng sinh (amoxicilin, cefuroxim, erythromycin, doxycyclin) làm tăng nồng độ kháng sinh vào mô phổi và phế quản. Như vậy, bromhexin có thể có tác dụng như thuốc bổ trợ trong điều trị nhiễm khuẩn hô hấp, làm tăng tác dụng của kháng sinh.

**11. Cần làm gì khi một lần quên không dùng thuốc?**

Tiếp tục dùng thuốc, bỏ qua liều đã quên, không dùng bù.



Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

**13. Những dấu hiệu và triệu chứng khi dùng thuốc quá liều**

Chưa có báo cáo.

**14. Cần phải làm gì khi dùng thuốc quá liều khuyến cáo**

Nếu xảy ra trường hợp quá liều, cần điều trị triệu chứng và hỗ trợ.

**15. Những điều cần thận trọng khi dùng thuốc này**

Cần tránh phối hợp với thuốc ức chế ho vì có nguy cơ ứ đọng đờm ở đường hô hấp.

Bromhexin, do có tác dụng làm tiêu dịch nhầy, nên có thể gây hủy hoại hàng rào niêm mạc dạ dày; vì vậy, khi dùng cho người bệnh có tiền sử loét dạ dày phải rất thận trọng.

Cần thận trọng khi dùng cho người bệnh hen, vì bromhexin có thể gây co thắt phế quản ở một số người dễ mẫn cảm.

Sự thanh thải bromhexin và chất chuyển hóa có thể bị giảm ở người bệnh suy gan hoặc suy thận nặng, nên cần phải thận trọng và theo dõi.

Cần thận trọng khi dùng bromhexin cho người cao tuổi hoặc suy nhược quá yếu vì không có khả năng khạc đờm có hiệu quả do đó càng tăng ứ đờm.

**Phụ nữ có thai và cho con bú**

*Thời kỳ mang thai*

Chưa nghiên cứu tác dụng sinh quái thai của bromhexin ở động vật thí nghiệm. Chưa có nghiên cứu đầy đủ và có kiểm soát về dùng bromhexin cho người mang thai, vì vậy, không khuyến cáo dùng bromhexin cho người mang thai.

*Thời kỳ cho con bú*

Còn chưa biết bromhexin có bài tiết vào sữa mẹ không. Vì vậy, không khuyến cáo dùng bromhexin cho phụ nữ nuôi con bú. Nếu cần dùng thì tốt nhất không cho con bú.

**Người lái xe và vận hành máy móc:** Thuốc không có tác dụng an thần, sử dụng được cho người lái xe và vận hành máy móc.

**16. Khi nào cần tham vấn bác sỹ, dược sỹ**

Thông báo cho Bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

**17. Hạn dùng của thuốc:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất

**18. Tên, địa chỉ, biểu tượng (nếu có) của cơ sở sản xuất**



Công ty Cổ phần Dược VACOPHARM  
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An  
Điện thoại: (072) 3826111 - 3829311  
Địa chỉ nhà máy: km 1954, Quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh,  
Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

**19. Ngày xem xét, sửa đổi, cập nhật: ... / ... / ...**

Long An, ngày 05 tháng 9 năm 2016

KT. Tổng Giám đốc Công ty

Phó Tổng Giám đốc



KS. Phan Thị Minh Thu

## BROMHEXIN 8

### Thành phần

|                                                        |                  |
|--------------------------------------------------------|------------------|
| Bromhexin hydroclorid                                  | 8mg              |
| Tá dược v.đ                                            | 1 viên nang cứng |
| (Tinh bột sắn, Polyvinyl pyrrolidon K30, Acid stearic) |                  |

**Dạng bào chế:** Viên nang cứng số 4, hai màu nâu – trắng ngà, không bẹp nứt, bên trong chứa bột thuốc màu trắng.

### Dược lực học

Loại thuốc: Thuốc long đờm.

Mã ATC: R05CB02

Bromhexin hydroclorid là chất có tác dụng long đờm. Do hoạt hóa sự tổng hợp sialomucin và phá vỡ các sợi acid mucopolysaccharid nên thuốc làm đờm lỏng hơn và ít quánh hơn. Giúp đờm từ phế quản thoát ra ngoài có hiệu quả.

### Dược động học

Bromhexin hydroclorid hấp thu nhanh qua đường tiêu hóa và bị chuyển hóa bước đầu ở gan rất mạnh, nên sinh khả dụng khi uống chỉ đạt khoảng 20%. Thức ăn làm tăng sinh khả dụng của bromhexin hydroclorid. Nồng độ đỉnh trong huyết tương đạt được sau khi uống, từ ½ giờ đến 1 giờ.

Bromhexin hydroclorid phân bố rộng rãi vào các mô của cơ thể. Thuốc liên kết rất mạnh (95-99%) với protein của huyết tương.

Bromhexin bị chuyển hóa chủ yếu ở gan. Đã phát hiện được ít nhất 10 chất chuyển hóa trong huyết tương, trong đó, có chất ambroxol là chất chuyển hóa vẫn còn hoạt tính. Nửa đời thải trừ của thuốc ở pha cuối là 13-40 giờ tùy theo từng cá thể. Bromhexin qua được hàng rào máu não, và một lượng nhỏ qua được nhau thai.

Khoảng 85 – 90% liều dùng được thải trừ qua nước tiểu, chủ yếu là dưới dạng các chất chuyển hóa, ở dạng liên hợp sulfo hoặc glucuro và một lượng nhỏ được thải trừ nguyên dạng. Bromhexin được thải trừ rất ít qua phân, chỉ khoảng dưới 4%.

### Quy cách đóng gói

| STT | Mô tả tóm tắt quy cách đóng gói |
|-----|---------------------------------|
| 1   | Ép vỉ, vỉ 10 viên, hộp 10 vỉ    |
| 2   | Ép vỉ, vỉ 10 viên, hộp 20 vỉ    |
| 3   | Ép vỉ, vỉ 10 viên, hộp 50 vỉ    |
| 4   | Ép vỉ, vỉ 10 viên, hộp 100 vỉ   |
| 5   | Ép vỉ, vỉ 15 viên, hộp 10 vỉ    |
| 6   | Ép vỉ, vỉ 15 viên, hộp 20 vỉ    |
| 7   | Ép vỉ, vỉ 15 viên, hộp 50 vỉ    |
| 8   | Ép vỉ, vỉ 15 viên, hộp 100 vỉ   |

| STT | Mô tả tóm tắt quy cách đóng gói |
|-----|---------------------------------|
| 9   | Ép vỉ, vỉ 20 viên, hộp 5 vỉ     |
| 10  | Ép vỉ, vỉ 20 viên, hộp 10 vỉ    |
| 11  | Ép vỉ, vỉ 20 viên, hộp 25 vỉ    |
| 12  | Ép vỉ, vỉ 20 viên, hộp 50 vỉ    |
| 13  | Đóng chai 100 viên              |
| 14  | Đóng chai 200 viên              |
| 15  | Đóng chai 500 viên              |
| 16  | Đóng chai 1000 viên             |

### Chỉ định

Bromhexin 8 được dùng để điều trị triệu chứng ho đờm trong các bệnh lý đường hô hấp như: viêm phế quản cấp tính; đợt cấp tính của viêm phế quản mạn tính; nhiễm khuẩn đường hô hấp nặng (sử dụng như chất bổ trợ với kháng sinh).

### Liều dùng và cách dùng

Uống với một cốc nước.

Người lớn và trẻ em trên 10 tuổi: 1 viên/lần, ngày 3 lần.

Thời gian điều trị không quá 8-10 ngày trừ khi có ý kiến của Thầy thuốc.

### Chống chỉ định

Mẫn cảm với bromhexin hoặc thành phần có trong thuốc.

### Thận trọng và cảnh báo đặc biệt khi sử dụng thuốc

Cần tránh phối hợp với thuốc ức chế ho vì có nguy cơ ứ đọng đờm ở đường hô hấp.

Bromhexin, do có tác dụng làm tiêu dịch nhầy, nên có thể gây hủy hoại hàng rào niêm mạc dạ dày; vì vậy, khi dùng cho người bệnh có tiền sử loét dạ dày phải rất thận trọng.

Cần thận trọng khi dùng cho người bệnh hen, vì bromhexin có thể gây co thắt phế quản ở một

Sự thanh thải bromhexin và chất chuyển hóa có thể bị giảm ở người bệnh suy gan hoặc suy thận nặng, nên cần phải thận trọng và theo dõi.

Cần thận trọng khi dùng bromhexin cho người cao tuổi hoặc suy nhược quá yếu vì không có khả năng khạc đờm có hiệu quả do đó càng tăng ứ đờm.

### Phụ nữ có thai và cho con bú

#### Thời kỳ mang thai

Chưa nghiên cứu tác dụng sinh quái thai của bromhexin ở động vật thí nghiệm. Chưa có nghiên cứu đầy đủ và có kiểm soát về dùng bromhexin cho người mang thai, vì vậy, không khuyến cáo dùng bromhexin cho người mang thai.

#### Thời kỳ cho con bú

Còn chưa biết bromhexin có bài tiết vào sữa mẹ không. Vì vậy, không khuyến cáo dùng bromhexin cho phụ nữ nuôi con bú. Nếu cần dùng thì tốt nhất không cho con bú.

**Người lái xe và vận hành máy móc:** Thuốc không có tác dụng an thần, sử dụng được cho người lái xe và vận hành máy móc.

### Tương tác thuốc

Không phối hợp với thuốc làm giảm tiết dịch (giảm cả dịch tiết khí phế quản) như các thuốc kiểu atropin (hoặc anticholinergic) vì làm giảm tác dụng của bromhexin.

Không phối hợp với các thuốc chống ho.

Dùng phối hợp bromhexin với kháng sinh (amoxicilin, cefuroxim, erythromycin, doxycyclin) làm tăng nồng độ kháng sinh vào mô phổi và phế quản. Như vậy, bromhexin có thể có tác dụng như thuốc hỗ trợ trong điều trị nhiễm khuẩn hô hấp, làm tăng tác dụng của kháng sinh.

### Tác dụng không mong muốn

Ít gặp,  $1/1\ 000 < ADR < 1/100$

Tiêu hóa: Đau vùng thượng vị, buồn nôn, nôn, tiêu chảy.

Thần kinh: Nhức đầu, chóng mặt, ra mồ hôi.

Da: Ban da, mề đay.

Hô hấp: Nguy cơ ứ dịch tiết phế quản ở người bệnh không có khả năng khạc đờm.

Hiếm gặp:  $ADR < 1/1\ 000$

Tiêu hóa: Khô miệng.

Gan: Có thể làm tăng men aminotransferase AST, ALT.

### Quá liều và xử trí

Chưa có báo cáo. Nếu xảy ra trường hợp quá liều, cần điều trị triệu chứng và hỗ trợ.

**Điều kiện bảo quản:** nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

**Hạn dùng:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất

Đề xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến Bác sĩ.

Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất

Công ty Cổ phần Dược VACOPHARM  
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

Điện thoại: (072) 3826111 - 3829311

Địa chỉ nhà máy: km 1954, Quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh,  
Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

Ngày xem xét, sửa đổi, cập nhật: ... / ... / ...



TUQ.CỤC TRƯỞNG  
P.TRƯỞNG PHÒNG  
Nguyễn Ngọc Anh



KS. Phan Thị Minh Thu

Long An, ngày 05 tháng 9 năm 2016

K.T. Tổng Giám đốc Công ty

Phó Tổng Giám đốc