

Các hợp chất đã được thử nghiệm trong các nghiên cứu được động học lâm sàng bao gồm hydrochlorothiazide, warfarin, digoxin, thuốc tránh thai đường uống ethinylprogestin/levonorgestrel, glibenclamide, nifedipine và enalapril. Kết quả cho thấy không có tương tác được động học có ý nghĩa lâm sàng với các thuốc này.

Sử dụng thuốc (ví dụ: heparin) có thể làm tăng nồng độ kali. Nên thực hiện theo dõi kali khi thích hợp.

Việc nâng đỡ và độc tính của huyết thanh có thể tăng hội phức được đã được báo cáo trong quá trình sử dụng đồng thời với thuốc ức chế men chuyển. Tác dụng tương tác có thể xảy ra với AURAS. Không nên sử dụng candesartan với lithium. Nếu cần kết hợp nên theo dõi cẩn thận nồng độ lithium trong huyết thanh.

Khi AURAS được dùng đồng thời với các thuốc chống viêm không steroid (NSAID) (các thuốc ức chế chọn lọc COX-2, adalimumab, acetylsalicylic (> 3g/ngày) và NSAID không chọn lọc), có thể gây suy giảm huyết áp.

Cung như các thuốc ức chế men chuyển, sử dụng đồng thời AURAS và NSAID có thể dẫn đến tăng nguy cơ suy giảm chức năng thận, bao gồm suy thận cấp và tăng kali huyết thanh, đặc biệt là ở những bệnh nhân có chức năng thận kém. Nên thận trọng thực hiện việc kết hợp này, đặc biệt là ở bệnh nhân cao tuổi. Bệnh nhân cần được cung cấp đủ nước và nên xem xét theo dõi chức năng thận sau khi bắt đầu điều trị đồng thời, và định kỳ sau đó.

Sử dụng ở trẻ em: các nghiên cứu tương tác chỉ được thực hiện ở người lớn và chưa có báo cáo về các nghiên cứu trên trẻ em.

Tương tác của thuốc: (không áp dụng).

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN TRONG ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP:

Tác dụng không mong muốn trong điều trị tăng huyết áp:

- Các nghiên cứu lâm sàng có kiểm soát cho thấy các tác dụng không mong muốn nhẹ và thoáng qua, và không có mối liên hệ với liều lượng hoặc tuổi tác. Tỷ lệ ngưng điều trị do tác dụng không mong muốn với candesartan cilexetil là (3,1%) và giảm được (3,2%).
- Trong một phân tích tổng hợp dữ liệu thử nghiệm lâm sàng của bệnh nhân tăng huyết áp, các tác dụng không mong muốn với candesartan cilexetil được xác định dựa trên tỷ lệ các tác dụng không mong muốn của candesartan cilexetil cao hơn ít nhất 1% so với tỷ lệ các tác dụng không mong muốn của thuốc giả dược. Theo định nghĩa này, các tác dụng không mong muốn thường gặp là chóng mặt, mất thăng bằng, đau đầu và nhiễm trùng đường hô hấp.
- Bảng dưới đây thể hiện các phản ứng không mong muốn từ các thử nghiệm lâm sàng và thực tế sử dụng trong điều trị.
- Các tần số được sử dụng trong các bảng ở mức độ là: rất thường gặp (ADR $\geq 1/10$), thường gặp (ADR $\geq 1/100$ đến $< 1/10$), ít gặp (ADR $\geq 1/1000$ đến $< 1/100$), hiếm gặp (ADR $\geq 1/10000$ đến $< 1/1000$) và rất hiếm gặp (ADR $< 1/10000$).

Các hệ cơ quan	Tần suất	Tác dụng không mong muốn
Viêm nhiễm và bạch tu	Thường gặp	Viêm đường hô hấp
Rối loạn hệ thống máu	Rất hiếm gặp	Tăng bạch cầu, giảm bạch cầu trung tính và mất bạch cầu hạt
Rối loạn chuyển hóa	Thường gặp	Tăng kali huyết
Đường ruột	Rất hiếm gặp	Hạ pH huyết
Rối loạn hệ thần kinh	Rất hiếm gặp	Chóng mặt, đau đầu
Rối loạn mắt	Thường gặp	Hạ huyết áp
Rối loạn hô hấp	Rất hiếm gặp	Ho
Rối loạn da và mô liên kết	Rất hiếm gặp	Buồn nôn
Rối loạn gan mật	Rất hiếm gặp	Chưa rõ tần suất
Rối loạn da và mô liên kết	Rất hiếm gặp	Tăng men gan, chức năng gan bất thường hoặc viêm gan
Rối loạn cơ xương	Rất hiếm gặp	Đau lưng, đau khớp, đau cơ
Rối loạn thận và tiết niệu	Thường gặp	Suy thận, bao gồm suy thận ở những bệnh nhân nhạy cảm (xem Thận trọng)

Các kết quả thử nghiệm

Nhìn chung, candesartan cilexetil không có ảnh hưởng quan trọng về mặt lâm sàng đối với các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm thông thường. Đối với các chất ức chế hệ thống renin-angiotensin-aldoesterone khác, người ta đã thấy một lượng nhỏ hemoglobin bị giảm. Việc theo dõi thường xuyên các biến số thông thường trong phòng thí nghiệm là không cần thiết với bệnh nhân đang dùng candesartan cilexetil. Tuy nhiên, nên theo dõi định kỳ nồng độ kali và creatinin trong huyết thanh ở bệnh nhân suy thận.

Bệnh nhân:

Sự an toàn của candesartan cilexetil được theo dõi ở 255 trẻ em và thanh thiếu niên từ 6 đến <18 tuổi bị tăng huyết áp, nghiên cứu hiệu quả lâm sàng trong 4 tuần và nghiên cứu mở rộng 1 năm. Gần như tất cả các hệ cơ quan khác nhau, tần suất các tác dụng không mong muốn ở trẻ em nằm trong phạm vi phổ biến/không phổ biến. Mặc dù tình trạng và mức độ nghiêm trọng của các tác dụng không mong muốn tương tự như ở người lớn (xem Bảng trên), tần suất của tất cả các tác dụng không mong muốn, bao gồm ở trẻ em và thanh thiếu niên, đặc biệt là: nhức đầu, chóng mặt và nhiễm trùng đường hô hấp trên, là những tác dụng không mong muốn rất thường gặp ($\geq 1/10$) ở trẻ em và thường gặp ($\geq 1/100$ đến $< 1/100$) ở người lớn.

Ho: rất thường gặp ($> 1/10$) ở trẻ em và rất hiếm gặp ($< 1/10.000$) ở người lớn.

Phát ban: rất thường gặp ($\geq 1/100$ đến $< 1/10$) ở trẻ em và rất hiếm gặp ($< 1/10.000$) ở người lớn.

It gáp ($\geq 1/1.000$ đến $< 1/100$) tăng kali huyết, hạ natri huyết và chức năng gan bất thường ở trẻ em và rất hiếm gặp ($< 1/10.000$) ở người lớn.

Thường gặp ($\geq 1/100$ đến $< 1/10$) rối loạn nhịp xoang, viêm mũi họng, rất thường gặp ($\geq 1/10$) sốt và đau vùng họng là tình trạng ở trẻ em, nhưng không có báo cáo ở người lớn. Tuy nhiên, đây là những bệnh thông thường thời kỳ đầu và có liên kết tạm thời.

Ho sơ an toàn tổng thể đối với candesartan cilexetil ở bệnh nhân không khác biệt đáng kể so với ho sơ an toàn ở người lớn.

Tác dụng không mong muốn trong điều trị suy tim:

- Các tác dụng không mong muốn của thuốc ở bệnh nhân suy tim từ thuốc tim chất được lý của thuốc và tình trạng suy tim của bệnh nhân. Trong chương trình lâm sàng CHARM, so sánh candesartan cilexetil với liều tới 32mg (n = 3.804) với giả dược (n = 3.796), 21,0% nhóm candesartan cilexetil và 16,1% nhóm giả dược đã được đặt ngưng điều trị vì các tác dụng không mong muốn. Các tác dụng không mong muốn phổ biến nhất được báo cáo là tăng kali huyết, hạ huyết áp và suy thận. Những biểu hiện này phổ biến hơn ở những bệnh nhân trên 70 tuổi. Bệnh nhân liều thuốc hoặc ngưng điều trị tương tự dùng các sản phẩm thuốc khác ảnh hưởng đến hệ thống renin-angiotensin-aldoesterone, đặc biệt là thuốc ức chế men chuyển và/hoặc spironolactone.
- Bảng dưới đây trình bày các tác dụng không mong muốn từ các thử nghiệm lâm sàng và những kinh nghiệm sau khi lưu hành thuốc.

Các hệ cơ quan	Tần suất	Tác dụng không mong muốn
Rối loạn máu <td>Rất hiếm gặp<td>Giảm bạch cầu, giảm bạch cầu trung tính và mất bạch cầu hạt</td></td>	Rất hiếm gặp <td>Giảm bạch cầu, giảm bạch cầu trung tính và mất bạch cầu hạt</td>	Giảm bạch cầu, giảm bạch cầu trung tính và mất bạch cầu hạt
Rối loạn chuyển hóa <td>Thường gặp<td>Tăng kali huyết</td></td>	Thường gặp <td>Tăng kali huyết</td>	Tăng kali huyết
Đường ruột <td>Rất hiếm gặp<td>Hạ pH huyết</td></td>	Rất hiếm gặp <td>Hạ pH huyết</td>	Hạ pH huyết
Rối loạn hệ thần kinh <td>Rất hiếm gặp<td>Chóng mặt, đau đầu</td></td>	Rất hiếm gặp <td>Chóng mặt, đau đầu</td>	Chóng mặt, đau đầu
Rối loạn mắt <td>Thường gặp<td>Hạ huyết áp</td></td>	Thường gặp <td>Hạ huyết áp</td>	Hạ huyết áp
Rối loạn hô hấp <td>Rất hiếm gặp<td>Ho</td></td>	Rất hiếm gặp <td>Ho</td>	Ho
Rối loạn da và mô liên kết <td>Rất hiếm gặp<td>Buồn nôn</td></td>	Rất hiếm gặp <td>Buồn nôn</td>	Buồn nôn
Rối loạn gan mật <td>Rất hiếm gặp<td>Chưa rõ tần suất</td></td>	Rất hiếm gặp <td>Chưa rõ tần suất</td>	Chưa rõ tần suất
Rối loạn da và mô liên kết <td>Rất hiếm gặp<td>Tăng men gan, chức năng gan bất thường hoặc viêm gan</td></td>	Rất hiếm gặp <td>Tăng men gan, chức năng gan bất thường hoặc viêm gan</td>	Tăng men gan, chức năng gan bất thường hoặc viêm gan
Rối loạn cơ xương <td>Rất hiếm gặp<td>Đau lưng, đau khớp, đau cơ</td></td>	Rất hiếm gặp <td>Đau lưng, đau khớp, đau cơ</td>	Đau lưng, đau khớp, đau cơ
Rối loạn thận và tiết niệu <td>Thường gặp<td>Suy thận, bao gồm suy thận ở những bệnh nhân nhạy cảm (xem Thận trọng)</td></td>	Thường gặp <td>Suy thận, bao gồm suy thận ở những bệnh nhân nhạy cảm (xem Thận trọng)</td>	Suy thận, bao gồm suy thận ở những bệnh nhân nhạy cảm (xem Thận trọng)

Các phát hiện trong phòng thí nghiệm

Phát ban là tăng kali huyết và suy thận ở những bệnh nhân dùng candesartan cilexetil đã điều trị suy tim. Nên theo dõi định kỳ creatinin và kali huyết thanh.

QUẢ LIỆU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:

Quả liều:

- Dựa trên các đánh giá và được lý, biểu hiện chính của quá liều giống như triệu chứng của hạ huyết áp và chóng mặt. Trong các báo cáo trường hợp quá liều nặng nhất (tổng đến 572mg candesartan cilexetil), bệnh nhân đã hồi phục bình thường.
- Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc.

Cách xử trí khi dùng thuốc quá liều:

- Nếu bệnh nhân có biểu hiện hạ huyết áp, cần lưu ý điều trị triệu chứng và theo dõi các dấu hiệu sinh tồn. Đặt bệnh nhân nằm ngửa với hai chân nâng cao. Nếu vẫn chưa hiệu quả, nên tăng thể tích huyết tương bằng cách vận dụng dịch, ví dụ, dung dịch muối đẳng trương. Có thể sử dụng các sản phẩm thuốc điều trị giao cảm nếu cần biện pháp nếu trên không đủ hiệu quả.
- Chạy thận nhân tạo không loại bỏ được candesartan cilexetil.

ĐÁP ỨNG ĐƯỢC LỢI HỢC:

- Nhóm được lý và mATC: thuốc đối kháng angiotensin II, mã ATC: C09CA06
- Cơ chế tác dụng:
- Angiotensin II là hormone vận mạch chính của hệ thống renin-angiotensin-aldoesterone và đóng vai trò trong sinh lý bệnh tăng huyết áp, suy tim và các rối loạn tim mạch khác. Nó cũng có một vai trò trong sinh lý bệnh hạ huyết áp, suy tim và các rối loạn tim mạch khác. Các tác dụng sinh lý bệnh chính của angiotensin II, như gây co mạch, kích thích aldosterone, gây hòa tan đồng nội mô và nước và kích thích tăng trưởng tế bào, thông qua trung gian thụ thể loại 1 (AT1).
- Candesartan cilexetil thích hợp để sử dụng bằng đường uống. Nó nhanh chóng được chuyển hóa thành chất hoạt động candesartan, bằng cách thủy phân ester trong quá trình hấp thu từ đường tiêu hóa. Candesartan là một AURAS, chọn lọc cho các thụ thể AT1, liên kết chặt chẽ và phân ly chậm từ thụ thể. Nó không có hoạt động chủ vận.
- Candesartan không ức chế ACE, chuyển angiotensin I thành angiotensin II và làm thoái hóa bradykinin. Không có tác dụng đối với ACE và không có tác dụng ức chế bradykinin hoặc chất P. Trong các thử nghiệm lâm sàng có kiểm soát, sự sinh sản candesartan với thuốc ức chế ACE, lý lẽ cho thấy nó không khác biệt so với các thuốc khác. Candesartan không liên kết trực tiếp với các thụ thể hormone hoặc các kênh ion khác được biết là quan trọng trong điều hòa tim mạch.

Việc đối kháng của các thụ thể angiotensin II (AT1) dẫn đến tăng liên quan đến việc tăng nồng độ renin trong huyết tương, nồng độ angiotensin I và angiotensin II và giảm nồng độ aldosterone trong huyết tương.

ĐÁP ỨNG ĐƯỢC LỢI HỢC:

- Sau khi uống, candesartan cilexetil được chuyển thành chất hoạt động candesartan. Sinh khả dụng huyết của candesartan là khoảng 40% sau khi uống cùng lúc với thuốc giả dược. Sinh khả dụng tương đối của dạng viên nén với dạng dung dịch uống cũng tương đương là khoảng 34% và rất ít thay đổi. Do đó, sinh khả dụng huyết của các dạng viên nén là 14%. Đạt nồng độ đỉnh huyết thanh (C_{max}) 3-4 giờ sau khi uống thuốc. Nồng độ trong huyết thanh candesartan tăng tuyến tính khi tăng liều trong khoảng liều điều trị. Không có sự khác biệt liên quan đến giới tính trong dược động học của candesartan. Diện tích dưới đường cong (AUC) của candesartan không bị ảnh hưởng đáng kể bởi thực phẩm.
- Candesartan liên kết cao với protein huyết tương (hơn 99%). Thể tích phân bố của candesartan là 0,1 l/kg.
- Sinh khả dụng của candesartan không bị ảnh hưởng bởi thực phẩm.

Chuyển hóa và thải trừ:

- Candesartan được bài bỏ chủ yếu ở dạng không thay đổi qua nước tiểu và mật và chỉ ở một lượng nhỏ được bài bỏ bằng chuyển hóa ở gan (CYP2C9 và CYP3A4). Dựa trên dữ liệu in vitro, sẽ không có tương tác đáng kể với CYP2C9 và CYP3A4. Dựa trên dữ liệu in vivo, sẽ không có tương tác đáng kể xảy ra về mặt dược động học của candesartan cilexetil với cyclosporin P450 isoenzyme CYP2A2, CYP2A6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1 hoặc CYP3A.
- Tổng độ thanh thải trong huyết tương của candesartan là khoảng 0,37 ml/kg/h, với độ thanh thải ở thận khoảng 0,19 ml/kg/h. Thận đào thải candesartan bằng lọc cầu thận và bài tiết ở ống thận. Sau một liều uống được đánh dấu ¹⁴C-candesartan cilexetil, khoảng 28% liều được bài tiết qua nước tiểu dưới dạng candesartan và 7% dưới dạng chất chuyển hóa không hoạt động trong khi khoảng 55% liều được tìm thấy trong phân là candesartan và 10% là chất chuyển hóa không hoạt động.

Được động học nhóm bệnh nhân đặc biệt

- Ở người cao tuổi (trên 65 tuổi) C_{max} và AUC của candesartan tăng tương ứng khoảng 50% và 80% so với độ tuổi trẻ tuổi. Tuy nhiên, đáp ứng huyết áp và tỷ lệ các tác dụng không mong muốn là tương tự nhau sau khi uống một liều candesartan cilexetil ở bệnh nhân trẻ tuổi và người già (xem Liều lượng và cách dùng).
- Ở bệnh nhân suy thận nhẹ đến trung bình C_{max} và AUC của candesartan tăng khi dùng liều lặp lại lần lượt khoảng 50% và 70%, nhưng t_{1/2} không thay đổi, so với bệnh nhân có chức năng thận bình thường. Những thay đổi về dược động học của bệnh nhân suy thận nặng lần lượt khoảng 50% và 110%. t_{1/2} cuối của candesartan đã tăng gấp đôi ở bệnh nhân suy thận nặng. AUC của candesartan ở bệnh nhân chảy thận nặng gấp đôi so với bệnh nhân suy thận nặng.
- Trong hai nghiên cứu, cả hai bệnh nhân bị suy gan nhẹ đến trung bình, có sự gia tăng AUC trung bình của candesartan khoảng 20% trong một nghiên cứu và 80% trong nghiên cứu khác (xem Liều lượng và cách dùng). Không có kinh nghiệm ở bệnh nhân suy gan nặng.

Bệnh nhân:

- Tính chất dược động học của candesartan được đánh giá ở trẻ tăng huyết áp từ 1 đến 6 tuổi và 6 đến <17 tuổi trong hai nghiên cứu PK đơn liều.
- Ở trẻ em từ 1 đến < 6 tuổi, 10 trẻ em nặng 10 đến < 25kg nhận được một liều duy nhất 0,2mg/kg dạng hỗn dịch uống. Không có mối tương quan giữa C_{max} và AUC với tuổi hoặc cân nặng. Không thu thập được dữ liệu thải trừ, do đó, không rõ khả năng có mối tương quan giữa thải trừ và trọng lượng/tuổi trong nhóm bệnh nhân này.
- Ở trẻ em từ 6 đến <17 tuổi, 22 trẻ em nhận được một liều duy nhất 16mg. Không có mối tương quan giữa C_{max} và AUC với tuổi. Tuy nhiên, trọng lượng được như tương quan đáng kể với C_{max} (p = 0,012) và AUC (p = 0,011). Không thu thập được dữ liệu thải trừ, do đó, không rõ khả năng có mối tương quan giữa thải trừ và trọng lượng/tuổi ở thanh thiếu niên và trọng lượng/tuổi trong nhóm bệnh nhân này.
- Trên em > 6 tuổi có phân nhóm lượng từ 40 người lớn cho uống cùng một liều.
- Được động học của candesartan cilexetil chưa được nghiên cứu ở bệnh nhi <1 tuổi.

HUỖI CÁCH DÙNG GÓI:

- 1 vỉ, 3 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ, 20 vỉ x 10 viên nén.

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN, HẠN DÙNG, TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG CỦA THUỐC:

Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Tiêu chuẩn: TCCS

TÊN, ĐỊA CHỈ CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT THUỐC:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPA

Địa chỉ: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG
BINH DƯƠNG - Khu phố Tân Bình, phường Tân Hiệp, thành phố Tân
Uyên, tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Điện thoại: (028) 384440106 Email: vanthu@vidipa.com.vn

VIDIPA