

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 14/6/2013

KT: 130 x 20 x 55

 Keep out of reach of children
Read the package insert carefully before use.

CINNARIZIN
 Cinnarizin 25mg

WHO/GMP

CINNARIZIN
Cinnarizin 25mg

3 blisters x 10 tablets

Thành phần: Mỗi viên nén chứa:
Cinnarizin.....25mg
Tá dược v.đ.....1 viên.

Chỉ định, chống chỉ định, liều dùng, cách dùng:
Xem tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp.

Bảo quản: Nơi khô thoáng, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

Tiêu chuẩn: Nhà sản xuất.

 Nhà sản xuất: CÔNG TY TNHH US PHARMA USA
Lô B1-10, Đường D2, KCN Tây Bắc Củ Chi, TP. HCM.

SDK (Reg. No.):
Số lô SX (Batch No.):
Ngày SX (Mfg.):
HĐ (Exp.):

 Để xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

CINNARIZIN
 Cinnarizin 25mg

WHO/GMP

3 vỉ x 10 viên nén

Composition: Each tablet contains:
Cinnarizin.....25mg
Excipients q.s.....1 tablet.

Indications, contra-indications, dosage, administration:
Please refer to enclosed package insert.

Storage: In a dry and cool place, below 30°C, protect from direct sunlight.



Specification: Manufactured

 Nhà sản xuất: CÔNG TY TNHH US PHARMA USA
Lô B1-10, Đường D2, KCN Tây Bắc Củ Chi, TP. HCM.

KT: 120 x 46 mm



KT: 125 x 46 x 50 mm



KT: 120 x 46 mm





CINNARIZIN

Viên nén Cinnarizin 25 mg

Thành phần

Mỗi viên nén chứa:

Cinnarizin

25 mg

Tá dược: Tinh bột ngô, Lactose, Natri starch glycolate, Magnesi stearate, Talc, Aerosil.

Phân loại

Cinnarizin là thuốc kháng histamin, đối kháng thụ thể H1. Ngoài ra Cinnarizin còn là một chất chẹn calcium chọn lọc, thuộc nhóm IV các chất đối kháng calcium.

Chỉ định

CINNARIZIN được dùng trong các trường hợp sau:

- Phòng say tàu xe.
- Rối loạn tiền đình như chóng mặt, ù tai, buồn nôn, nôn trong bệnh Ménière.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần biết thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.

Liều lượng và đường dùng

Liều dùng và thời gian dùng thuốc cho từng trường hợp cụ thể theo chỉ định của Bác sĩ điều trị.

Liều dùng thông thường như sau:

- Rối loạn tuần hoàn não: 1 viên/lần x 3 lần/ngày.
- Rối loạn tuần hoàn ngoại biên: 2-3 viên/lần x 3 lần/ngày.
- Say tàu xe: uống trước khi khởi hành nửa giờ, 1 viên/lần, uống lặp lại mỗi 6 giờ.

Trẻ em uống nửa liều người lớn.

Cách dùng

CINNARIZIN được dùng đường uống. Nên uống sau bữa ăn.

Chống chỉ định

- Chống chỉ định ở bệnh nhân mẫn cảm với Cinnarizin và bất cứ thành phần nào của thuốc.
- Loạn chuyển hóa porphyrin.

Thận trọng

- Giống như các kháng histamin khác, CINNARIZIN có thể gây kích ứng dạ dày. Vì thế nên uống thuốc sau bữa ăn.
- Không dùng Cinnarizin dài ngày ở người cao tuổi vì có thể gây tăng hoặc xuất hiện những triệu chứng ngoại tháp.

Phụ nữ mang thai

Mặc dù nghiên cứu trên súc vật không thấy gây quái thai nhưng chưa có nghiên cứu đầy đủ trên phụ nữ mang thai vì vậy chỉ dùng cho phụ nữ mang thai khi lợi ích của việc dùng thuốc lớn hơn cả nguy cơ đối với bào thai.

Phụ nữ cho con bú

Chưa có số liệu cho thấy thuốc được bài tiết vào sữa mẹ, vì vậy không chỉ định cho phụ nữ đang cho con bú.

Lái xe và vận hành máy móc

Lúc khởi đầu điều trị có thể gây buồn ngủ vì vậy không được dùng khi lái tàu xe hay vận hành máy móc.

Tương tác thuốc

Rượu, thuốc ức chế thần kinh trung ương, thuốc chống trầm cảm 3 vòng khi dùng đồng thời với CINNARIZIN có thể làm tăng tác dụng gây buồn ngủ của các thuốc này hoặc CINNARIZIN.

Tác dụng phụ



- Thuốc có những tác dụng phụ thường gặp như ngủ gà và rối loạn tiêu hóa, thường các tác dụng này tự biến mất sau vài ngày.
- Một số ít trường hợp gây nhức đầu, khô miệng, tăng cân, ra mồ hôi, dị ứng.
- Đối với người lớn tuổi, có thể xuất hiện những triệu chứng ngoại tháp thường kèm theo trầm cảm khi dùng dài ngày, nên ngưng sử dụng trong trường hợp này.

Thông báo cho Bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Quá liều và cách xử trí:

Triệu chứng: Dấu hiệu phổ biến khi quá liều bao gồm: buồn ngủ, choáng váng, hôn mê, nôn mửa, có dấu hiệu triệu chứng ngoại tháp, giảm trương lực cơ.

Cách xử trí: Chưa có thuốc giải độc đặc hiệu, biện pháp thông thường là điều trị triệu chứng và chăm sóc tích cực, tiến hành rửa dạ dày bằng than hoạt, tốt nhất là trong giờ đầu tiên sau khi uống quá liều.

Dạng trình bày

Hộp 3 vỉ, mỗi vỉ 10 viên nén.

Hộp 10 vỉ, mỗi vỉ 10 viên nén.

Tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn cơ sở.

Bảo quản

Bảo quản thuốc ở nơi khô, mát, dưới 30°C, tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp.

Hạn dùng

36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Để thuốc xa tầm tay trẻ em.

Nhà Sản xuất

CÔNG TY TNHH US PHARMA USA

Địa chỉ : Lô B1- 10, Đường D2, KCN Tây Bắc Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh

Mọi thắc mắc và thông tin chi tiết, xin liên hệ về số điện thoại 08 37908860 – 08 37908861, Fax: 08 37908856.



PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thanh

