

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAO KIM



MÃU NHÃN
(Bổ sung lần 02)

<i>Tên thuốc</i>	: COLLUDOLL
<i>Nồng độ, hàm lượng</i>	: Diacerein 25 mg
<i>Dạng bào chế</i>	: Viên nang cứng
<i>Mã đăng ký</i>	: TN - 30780

Năm 2017

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu:.....2/2-02-2013.....



COMPOSITION
Each capsule contains Diacerein..... 25mg
Excipients qs..... 1 tablet

INDICATIONS, CONTRAINDICATED, DOSAGE, ADMINISTRATION AND OTHER INFORMATION:
Please read the enclosed leaflet.
STORAGE:
Store in a cool and dry place below 30°C, protect from light.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
READ ENCLOSED LEAFLET CAREFULLY BEFORE USE.

SDK/Reg.No:

Ngày SX/Mtd:
Số lô SX/Lot:
HĐ/Exp. :

Ⓡ Prescription drug



Colludoll
Diacerein.....25mg

Box of 3 blisters x 10 capsules



THÀNH PHẦN
Mỗi viên nang chứa Diacerein.....25mg
Tà được vd.....1 viên
ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.
BẢO QUẢN: Nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.
Xin xem tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp thuốc.
CÁC THÔNG TIN KHÁC:
CHỈ ĐỊNH, CHỐNG CHỈ ĐỊNH, LIỀU DÙNG, CÁCH DÙNG VÀ

Sản xuất tại: CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM SAO KIM
KCN Quang Minh - Mê Linh - Hà Nội - Việt Nam • ĐT: 024.35841213/14/16 • Fax: 024.35840788



Hộp 3 vỉ x 10 viên nang cứng

Colludoll
Diacerein.....25mg



Ⓡ Thuốc bán theo đơn

Colludoll
Diacerein.....25mg



Colludoll
Diacerein.....25mg

Colludoll
Diacerein.....25mg

Colludoll
Diacerein.....25mg

Colludoll
Diacerein.....25mg

Colludoll
Diacerein.....25mg

Colludoll
Diacerein.....25mg

Colludoll
Diacerein.....25mg

Colludoll
Diacerein.....25mg

Colludoll
Diacerein.....25mg

Colludoll
Diacerein.....25mg



Số lô SX: HD:

Số lô SX, Hạn dùng
được ép chìm trên vỉ (cuối vỉ)

✓

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHO CÁN BỘ Y TẾ

Viên nang cứng **COLLUDOLL**

THÀNH PHẦN

Diacerein

25mg

Tá dược: maize starch, talc, PVP K30, magnesi stearat

vừa đủ 1 viên

DẠNG BÀO CHẾ

Viên nang cứng

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

Hộp 3 vỉ x 10 viên nang cứng

CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC LỰC HỌC

Nhóm dược lý: Thuốc chống viêm và chống thấp khớp không steroid

Mã ATC: M01AX21

Diacerein là một dẫn xuất của anthraquinon có hoạt tính kháng viêm trung bình được dùng trong điều trị thoái hóa khớp. Liều cao có hoạt tính kháng viêm tốt, mà không ảnh hưởng tới dạ dày do không ức chế tổng hợp prostaglandin.

Diacerein có tác dụng chậm, sau khoảng 30 ngày điều trị mới bắt đầu có tác dụng và sau 45 ngày tác dụng mới có ý nghĩa. Vì vậy có thể kết hợp với các NSAIDs trong những ngày đầu điều trị.

Trên *in vitro*, diacerein có các tác dụng sau:

- Ức chế thực bào và sự di chuyển của đại thực bào
- Ức chế sản xuất interleukin-1
- Làm giảm hoạt động của collagenlytic

Trong một số trường hợp, diacerein kích thích tổng hợp proteoglycan, glycosaminoglycan và acid hyaluronic.

Trong một số mô hình động vật, diacerein có tác động tích cực lên sụn.

CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC ĐỘNG HỌC

Sau khi dùng đường uống, diacerein bị chuyển hóa qua gan lần đầu và tất cả bị khử acetyl và chuyển thành rhein. Chất này được liên hợp với sulfo. Sau khi uống một liều đơn 50mg diacerein, nồng độ đỉnh trong huyết tương xuất hiện trung bình sau 2,5 giờ và nồng độ tối đa (C_{max}) khoảng 3mg/L. Dùng COLLODOLL trong bữa ăn làm chậm sự hấp thu thuốc nhưng lại làm tăng sinh khả dụng (diện tích dưới đường cong tăng khoảng 25%). Khi dùng liều 50mg đến 200mg COLLUDOLL dưới dạng liều đơn, tất cả thông số dược động học đều không phụ thuộc vào liều dùng.

Diacerein liên kết mạnh với protein huyết tương (99%), chủ yếu với albumin.

Thời gian bán thải của rhein khoảng 4,5 giờ.

Tổng lượng thuốc được đào thải qua nước tiểu khoảng 30%. Khoảng 80% rhein được bài tiết qua nước tiểu dưới dạng liên hợp với sulfo và glucuro và khoảng 20% dưới dạng rhein không đổi.

Sau khi dùng liều nhắc lại (50mg x 2 lần/ngày), diacerein cho thấy có tích lũy nhẹ.

Ở những bệnh nhân bị suy thận nặng (độ thanh thải creatinin dưới 30 ml/phút), diện tích dưới đường cong và thời gian bán thải tăng gấp đôi và đào thải qua nước tiểu giảm một nửa.

Ở những bệnh nhân lớn tuổi, khi thuốc được dung nạp tốt thì không cần thiết thay đổi liều dùng mặc dù sự đào thải chậm hơn.

CHỈ ĐỊNH

Điều trị triệu chứng cho các bệnh nhân trên 15 tuổi bị thoái hóa khớp hông hoặc gối, với tác dụng chậm.

Không khuyến cáo điều trị bằng diacerein cho những bệnh nhân thoái hóa khớp hông có tiến triển nhanh do những bệnh nhân này có thể đáp ứng yếu hơn với diacerein.

LIỀU DÙNG, CÁCH DÙNG

Việc sử dụng COLLUDOLL nên được bắt đầu bởi bác sĩ có kinh nghiệm trong điều trị thoái hóa khớp.

COLLUDOLL được sử dụng cho người lớn (trên 15 tuổi) và không nên dùng cho bệnh nhân trên 65 tuổi.

Do thuốc có thể gây tiêu chảy hoặc đi ngoài phân lỏng, liều khởi đầu khuyến cáo của diacerein là 50mg (2 viên nang COLLUDOLL) một lần/ngày uống vào bữa tối trong vòng 2-4 tuần đầu tiên. Sau đó tăng lên liều 50mg (2 viên nang COLLUDOLL)/lần x 2 lần/ngày, uống thuốc vào sáng và bữa tối.

Thuốc phải được nuốt nguyên viên (không được làm vỡ thuốc) với một ly nước.

Người bị suy thận

Không cần phải thay đổi liều ở bệnh nhân suy thận vừa và nhẹ.

Bệnh nhân suy thận nặng (độ thanh thải < 30 ml/phút), dùng ½ liều bình thường.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

COLLUDOLL chống chỉ định trong các trường hợp sau:

- Viêm đại tràng kích thích (viêm loét đại –trực tràng, bệnh Crohn...).
- Hội chứng tắc và bán tắc ruột.
- Đau bụng không rõ nguyên nhân.
- Mẫn cảm với rhein và các dẫn chất.
- Mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.
- Bệnh nhân đang mắc các bệnh về gan hoặc có tiền sử bệnh gan.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC

Tiêu chảy

Sử dụng diacerein thường xuyên có thể gây ra tiêu chảy, dẫn tới mất nước và hạ kali máu. Nếu có dấu hiệu bị tiêu chảy, cần ngừng dùng thuốc ngay lập tức. Bác sĩ nên xem xét biện pháp điều trị thay thế.

Bệnh nhân đang dùng thuốc lợi tiểu cần thận trọng để tránh các rủi ro vì mất nước và hạ kali máu.

Bệnh nhân đang dùng các thuốc glycosid (digoxin, digitoxin) cần có các biện pháp phòng ngừa trong trường hợp bị mất nước và hạ kali máu, dẫn tới rối loạn nhịp tim.

Không nên sử dụng đồng thời diacerein với thuốc nhuận tràng.

Độc tính trên gan

Diacerein có thể gây tăng men gan trong huyết thanh và tổn thương gan cấp tính. Trước khi bắt đầu điều trị với diacerein, bác sĩ cần hỏi bệnh nhân về các bệnh đi kèm, bệnh gan đang tiến triển hay tiền sử bệnh gan nếu có và nguyên nhân chính của bệnh gan đó. Diacerein là chống chỉ định cho các bệnh nhân đang bị bệnh về gan hoặc có tiền sử bệnh gan.

Các dấu hiệu tổn thương gan cần được theo dõi chặt chẽ và diacerein nên được sử dụng cẩn trọng khi dùng đồng thời cùng với các thuốc có khả năng gây tổn thương gan. Cần khuyến cáo bệnh nhân nên hạn chế uống rượu khi đang điều trị với diacerein.

Điều trị với diacerein nên được ngừng nếu thấy dấu hiệu tăng men gan trong huyết tương hoặc nghi ngờ có dấu hiệu hay triệu chứng tổn thương gan xảy ra. Bệnh nhân cần được tư vấn về các dấu hiệu tổn thương gan có thể xảy ra và liên hệ với bác sĩ ngay khi thấy có dấu hiệu tổn thương gan.

Người cao tuổi

Diacerein không được khuyến cáo dùng cho người trên 65 tuổi.

Trẻ em

Diacerein không nên được dùng cho trẻ em dưới 15 tuổi do chưa có dữ liệu an toàn và hiệu quả.

Phụ nữ có thai

Chống chỉ định dùng COLLUDOLL cho phụ nữ có thai.

Phụ nữ cho con bú

Chống chỉ định dùng COLLUDOLL cho phụ nữ đang nuôi con bú vì có báo cáo cho thấy những lượng nhỏ các dẫn xuất của diacerein đi vào sữa mẹ.

Người lái xe và vận hành máy móc

COLLUDOLL không ảnh hưởng tới khả năng lái xe và vận hành máy móc.

TƯƠNG TÁC CỦA THUỐC VỚI CÁC THUỐC KHÁC VÀ CÁC LOẠI TƯƠNG TÁC KHÁC

Các thuốc dạ dày – ruột tại chỗ (muối, oxid hoặc hydroxid của nhôm, magie, calci) làm giảm hấp thu diacerein. Nên dùng các thuốc này cách xa (ít nhất 2 giờ) với COLLUDOLL.

Thuốc lợi tiểu và/hoặc thuốc trợ tim glycosid

Diacerein có khả năng gây ra mất nước và hạ kali máu. Vì vậy, cần đặc biệt cẩn trọng khi dùng đồng thời diacerein với các thuốc lợi tiểu (đặc biệt là nhóm thuốc lợi tiểu tác dụng lên

quai Henlé và nhóm thiazid) và/hoặc thuốc trợ tim glycosid và cần có các biện pháp phòng ngừa để tránh nguy cơ rối loạn nhịp tim.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN (ADR)

Rối loạn hệ tiêu hóa:

Rất phổ biến ($ADR \geq 1/10$): đau bụng, tiêu chảy

Phổ biến ($1/10 > ADR \geq 1/100$): đại tiện nhiều lần, đầy hơi

Các tác dụng này sẽ giảm dần hoặc tự biến mất sau một thời gian điều trị. Một số trường hợp bị tiêu chảy nặng, có thể dẫn tới mất nước và rối loạn cân bằng điện giải.

Bệnh hắc tố kết tràng hiếm khi được quan sát thấy.

Rối loạn gan – mật:

Hiếm gặp ($1/100 \geq ADR > 1.000$): tăng men gan huyết thanh

Rối loạn da và mô mềm:

Phổ biến ($1/10 > ADR \geq 1/100$): ngứa, phát ban, eczema

Khác:

Dùng COLLUDOLL có thể làm cho nước tiểu vàng sậm hơn, điều này liên quan tới cấu trúc phân tử diacerein và không có ý nghĩa lâm sàng.

Dữ liệu theo dõi hậu mại

Các trường hợp tổn thương gan cấp tính, bao gồm cả tăng men gan huyết thanh và viêm gan có liên quan đến diacerein đã được báo cáo trong thời gian hậu mại. Phần lớn các trường hợp xảy ra trong những tháng đầu tiên khi bắt đầu điều trị. Cần theo dõi chặt chẽ các dấu hiệu và triệu chứng tổn thương gan trên bệnh nhân (xem phần *Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc*).

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ

Trường hợp quá liều, bệnh nhân có thể bị tiêu chảy cấp. Điều trị triệu chứng và can thiệp các biện pháp y tế như bù nước và điện giải nếu cần thiết.

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN

Nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C .

HẠN DÙNG

36 tháng kể từ ngày sản xuất

Không dùng quá hạn sử dụng ghi trên bao bì.

SẢN XUẤT TẠI



Saokim Pharma

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAO KIM

KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội

Điện thoại: 024.35841216 Fax: 024.35840788

Ngày xem xét sửa đổi, cập nhật lại nội dung hướng dẫn sử dụng thuốc:

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2017

Giám đốc nhà máy



GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY
Lê Văn Tú

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHO NGƯỜI BỆNH

Viên nang cứng

COLLUDOLL

R_x – THUỐC BÁN THEO ĐƠN

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC TRƯỚC KHI DÙNG

ĐỂ XA TÀM TAY TRẺ EM

Thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc

THÀNH PHẦN

Diacerein

25mg

Tá dược: maize starch, talc, PVP K30, magnesi stearat

vừa đủ 1 viên

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Viên nang cứng số 1, màu xanh đậm-xanh nhạt, bên trong chứa bột thuốc khô tơi màu vàng.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

Hộp 3 vỉ x 10 viên nang cứng

THUỐC DÙNG CHO BỆNH GÌ

COLLUDOLL được dùng để điều trị triệu chứng cho các bệnh nhân trên 15 tuổi bị thoái hóa khớp hông hoặc gối, với tác dụng chậm.

Bác sĩ sẽ đánh giá mức độ thoái hóa khớp của bạn tiến triển nhanh hay chậm. COLLUDOLL được khuyến cáo là không nên dùng ở những bệnh nhân bị thoái hóa khớp tiến triển nhanh do đáp ứng yếu hơn với diacerein.

KHI NÀO KHÔNG NÊN DÙNG THUỐC NÀY

Không dùng COLLUDOLL nếu bạn thuộc một trong những trường hợp sau:

- Bạn bị viêm đại tràng kích thích (viêm loét đại –trực tràng, bệnh Crohn...).
- Bạn bị đau bụng không rõ nguyên nhân.
- Bạn bị mẫn cảm với rhein và các dẫn chất.
- Bạn bị mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.
- Bạn đang mắc các bệnh về gan hoặc có tiền sử bệnh gan.

NHỮNG ĐIỀU CẦN THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC NÀY

Tiêu chảy

Sử dụng diacerein thường xuyên có thể gây ra tiêu chảy, dẫn tới mất nước và hạ kali máu. Nếu có dấu hiệu bị tiêu chảy, bạn cần ngừng dùng thuốc ngay lập tức và trao đổi với bác sĩ để xem xét biện pháp điều trị thay thế.

Nếu bạn đang dùng thuốc lợi tiểu và/hoặc các thuốc trợ tim glycosid (digoxin, digitoxin) cần theo dõi cẩn thận các dấu hiệu tiêu chảy và có các biện pháp đề phòng kịp thời trong trường hợp bị mất nước và hạ kali máu, dẫn tới rối loạn nhịp tim.

Bạn không nên sử dụng đồng thời diacerein với các thuốc nhuận tràng.

Độc tính trên gan

Diacerein là chống chỉ định cho các bệnh nhân đang bị bệnh về gan hoặc có tiền sử bệnh gan. Do diacerein có thể gây tăng men gan trong huyết thanh và tổn thương gan cấp tính. Vì vậy bạn cần thông báo cho bác sĩ nếu hiện tại bạn đang có vấn đề về gan hoặc đã từng bị các bệnh về gan và nguyên nhân chính của các bệnh đó.

Bạn sẽ được bác sĩ tư vấn về các dấu hiệu tổn thương gan vì vậy trong quá trình điều trị với COLLUDOLL bạn cần theo dõi cẩn thận và nếu thấy bất kỳ dấu hiệu nào của tổn thương gan cần dừng thuốc ngay và báo cho bác sĩ.

Bạn cần đặc biệt cẩn trọng nếu dùng diacerein đồng thời với các thuốc có khả năng gây tổn thương gan. Bạn cũng nên hạn chế uống rượu khi đang điều trị với diacerein.

Người cao tuổi

Diacerein không được khuyến cáo dùng cho người trên 65 tuổi.

Trẻ em

Diacerein không nên được dùng cho trẻ em dưới 15 tuổi do chưa có dữ liệu an toàn và hiệu quả.

Phụ nữ có thai

Không dùng COLLUDOLL nếu bạn đang mang thai.

Phụ nữ cho con bú

Không dùng COLLUDOLL nếu bạn đang nuôi con bú vì có báo cáo cho thấy những lượng nhỏ các dẫn xuất của diacerein đi vào sữa mẹ.

Người lái xe và vận hành máy móc

COLLUDOLL không ảnh hưởng tới khả năng lái xe và vận hành máy móc.

NÊN TRÁNH DÙNG NHỮNG THUỐC HOẶC THỰC PHẨM GÌ KHI ĐANG SỬ DỤNG THUỐC NÀY

Báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ nếu bạn đang uống hoặc vừa mới uống một số thuốc khác, kể cả những thuốc không có trong đơn thuốc.

Bạn cần đặc biệt chú ý nếu dùng COLLUDOLL cùng với các thuốc sau:

- *Các thuốc dạ dày – ruột tại chỗ* (muối, oxid hoặc hydroxid của nhôm, magie, calci) làm giảm hấp thu diacerein. Nên dùng các thuốc này cách xa (ít nhất 2 giờ) với COLLUDOLL.
- *Thuốc lợi tiểu và/hoặc thuốc trợ tim glycosid* : Diacerein có khả năng gây ra mất nước và hạ kali máu. Vì vậy, cần đặc biệt cẩn trọng khi dùng đồng thời diacerein với các thuốc lợi tiểu (đặc biệt là nhóm thuốc lợi tiểu tác dụng lên quai Henlé và nhóm thiazid) và/hoặc thuốc trợ tim glycosid và cần có các biện pháp phòng ngừa để tránh nguy cơ rối loạn nhịp tim.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN (ADR)

Rối loạn hệ tiêu hóa:

Rất phổ biến (ADR $\geq 1/10$): đau bụng, tiêu chảy

Phổ biến ($1/10 > \text{ADR} \geq 1/100$): đại tiện nhiều lần, đầy hơi

Các tác dụng này sẽ giảm dần hoặc tự biến mất sau một thời gian điều trị. Một số trường hợp bị tiêu chảy nặng, có thể dẫn tới mất nước và rối loạn cân bằng điện giải.

Bệnh hắc tố kết tràng hiếm khi được quan sát thấy.

Rối loạn gan – mật:

Hiếm gặp ($1/100 \geq \text{ADR} > 1.000$): tăng men gan huyết thanh

Rối loạn da và mô mềm:

Phổ biến ($1/10 > \text{ADR} \geq 1/100$): ngứa, phát ban, eczema

Khác:

Dùng COLLUDOLL đôi khi có thể làm cho nước tiểu vàng sậm hơn, điều này liên quan tới cấu trúc phân tử diacerein và không có ý nghĩa lâm sàng.

Dữ liệu theo dõi hậu mại

Các trường hợp tổn thương gan cấp tính, bao gồm cả tăng men gan huyết thanh và viêm gan có liên quan đến diacerein đã được báo cáo trong thời gian hậu mại. Phần lớn các trường hợp xảy ra trong những tháng đầu tiên khi bắt đầu điều trị. Cần theo dõi chặt chẽ các dấu hiệu và triệu chứng tổn thương gan trên bệnh nhân (xem phần *Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc*).

Khi bạn gặp bất kỳ tác dụng không mong muốn nào, bao gồm cả những tác dụng không mong muốn không có trong tờ hướng dẫn sử dụng này, hãy thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn hoặc bạn có thể báo cáo tác dụng không mong muốn của thuốc tới **Trung tâm Quốc gia về Thông tin thuốc và Theo dõi phản ứng có hại của thuốc**:

- Địa chỉ: Trường đại học Dược Hà Nội, 13-15 Lê Thánh Tông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Fax: 024.3.9335642 Điện thoại: 024.3.9335618
- Website: <http://canhgiacduoc.org.vn> Email: di.pvcenter@gmail.com

Các thông tin mà bạn cung cấp sẽ đóng góp vào việc sử dụng an toàn thuốc Diacerein.

NÊN DÙNG THUỐC NÀY NHƯ THẾ NÀO VÀ LIỀU LƯỢNG:

Việc sử dụng COLLUDOLL nên được bắt đầu bởi bác sĩ có kinh nghiệm trong điều trị thoái hóa khớp.

COLLUDOLL được sử dụng cho người từ 15 đến 65 tuổi.

Do thuốc có thể gây tiêu chảy hoặc đi ngoài phân lỏng, liều khởi đầu khuyến cáo của diacerein là 50mg (2 viên nang COLLUDOLL) một lần/ngày uống trong bữa tối trong vòng 2-4 tuần đầu tiên. Sau đó tăng lên liều 50mg (2 viên nang COLLUDOLL)/lần x 2 lần/ngày, uống thuốc vào bữa trưa và bữa tối.

Thuốc phải được nuốt nguyên viên (không được làm vỡ thuốc) với một ly nước.

Người bị suy thận

Không cần phải thay đổi liều ở bệnh nhân suy thận vừa và nhẹ.

Bệnh nhân suy thận nặng (độ thanh thải < 30 ml/phút), dùng $\frac{1}{2}$ liều bình thường.

Trẻ em

Chưa có dữ liệu an toàn và hiệu quả trên các bệnh nhân dưới 15 tuổi.

CẦN LÀM GÌ KHI MỘT LẦN QUÊN KHÔNG DÙNG THUỐC:

Nếu quên uống một liều, uống ngay khi bạn nhớ ra, nếu gần với lần uống thuốc tiếp theo thì bỏ qua liều đã quên và uống liều tiếp theo theo đúng lịch trình. Không dùng liều gấp đôi để bù cho liều đã quên.

CẦN BẢO QUẢN THUỐC NÀY NHƯ THẾ NÀO:

Bảo quản nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

NHỮNG DẤU HIỆU VÀ TRIỆU CHỨNG KHI DÙNG THUỐC QUÁ LIỀU

Nếu bạn vô tình dùng thuốc quá liều, có thể bạn sẽ bị tiêu chảy cấp, dẫn tới mất nước và rối loạn điện giải.

CẦN LÀM GÌ KHI DÙNG THUỐC QUÁ LIỀU KHUYẾN CÁO

Nếu vô tình uống quá nhiều thuốc, cần nói chuyện với bác sĩ của bạn ngay lập tức, hoặc đến cơ sở y tế gần nhất. Nhớ mang theo thuốc mình đã uống và trình bày cho bác sĩ, nếu đã uống hết thuốc mang bao bì thuốc thay thế.

KHI NÀO CẦN THAM VẤN BÁC SĨ, DƯỢC SĨ

Hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ khi bạn thuộc một trong các trường hợp sau:

- Bạn không chắc chắn về liều dùng,
- Bạn có vấn đề về gan hoặc đã từng có bệnh về gan,
- Bạn có vấn đề về thận,
- Bạn có vấn đề về đường tiêu hóa,
- Bạn nhỏ hơn 15 tuổi hoặc trên 65 tuổi,
- Bạn đang có thai hoặc đang cho con bú,
- Bạn bị đau bụng không rõ nguyên nhân,
- Bạn bị mẫn cảm với diacerein hoặc các dẫn xuất anthraquinon hoặc bất kỳ thành phần nào của thuốc,
- Bạn đang, vừa mới hoặc có kế hoạch dùng một số loại thuốc khác,
- Bạn gặp bất kỳ tác dụng không mong muốn nào, kể cả các tác dụng không mong muốn không có trong tờ hướng dẫn sử dụng này.



TS. CỤC TRƯỞNG
TRƯỜNG PHÒNG

Nguyễn Thị Hương

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất

Không dùng quá thời hạn ghi trên bao bì.

SẢN XUẤT TẠI



Saokim Pharma

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAO KIM

KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội

Điện thoại: 024.35841216

Fax: 024.35840788

Ngày xem xét sửa đổi, cập nhật lại nội dung hướng dẫn sử dụng thuốc:

Hà Nội ngày 31 tháng 08 năm 2017

