

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VCP

MẪU NHÃN ĐĂNG KÝ
THUỐC CYGANIC

1. Nhãn vi - Tỷ lệ 100%

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 27/02-2019



21/08/2018

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY


TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐS. Trần Văn Cường

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VCP

MẪU NHÃN ĐĂNG KÝ
THUỐC CYGANIC

2. Nhãn túi đựng 10 vỉ - tỷ lệ 100%



VIÊN NÉN BAO PHIM
CYGANIC

Sản xuất tại: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VCP**
Địa chỉ: Thanh Xuân - Sóc Sơn - Hà Nội - Việt Nam

Ngày SX/Mfg.date:
Số Lô SX/Batch,Nº:
HD/Exp.date :



21/08/2018

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐS. *Trần Văn Cường*

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VCP

MẪU NHÃN ĐĂNG KÝ
THUỐC CYGANIC

3. Nhãn hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim - tỉ lệ 55%



21/08/2018

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐS. Trần Văn Cường

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC CYGANIC

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Để xa tầm tay trẻ em

Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

1. THÀNH PHẦN: Mỗi viên nén bao phim có chứa:

Cao khô Actiso (*Extractum Cynarae siccum*) 80,0 mg

(tương đương với 2,0 g Actiso (*Folium Cynarae scolymi*))

Tá dược (lactose, tinh bột sắn, calci carbonat, PVP K30, sodium starch glycolat, talc, magne stearat, HPMC E15, PEG 6000, titan dioxyd, oxyd sắt đỏ)

..... vừa đủ 1 viên nén bao phim.

2. DẠNG BÀO CHẾ

Dạng bào chế: Viên nén bao phim.

Mô tả: Viên nén tròn, hai mặt lõm, màu đỏ nâu, mùi thơm dược liệu.

3. QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim + 01 tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

4. THUỐC DÙNG CHO BỆNH GÌ?

- Suy giảm chức năng gan gây: vàng da, dị ứng, tiêu hóa kém.
- Hỗ trợ điều trị cholesterol trong máu cao, xơ vữa động mạch.

5. NÊN DÙNG THUỐC NÀY NHƯ THỂ NÀO VÀ LIỀU LƯỢNG

Cách dùng: Dùng đường uống, uống với nước đun sôi để nguội, uống trước các bữa ăn.

Liều dùng:

- Người lớn: Ngày uống 2 lần, mỗi lần 2 – 3 viên.
- Trẻ em: Ngày uống 2 lần, mỗi lần 1 – 2 viên.

6. KHI NÀO KHÔNG NÊN DÙNG THUỐC NÀY

- Người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.
- Viêm tắc mật.

7. TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

Chưa có báo cáo về tác dụng không mong muốn của thuốc gây nên.

Thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc.

8. NÊN TRÁNH DÙNG THUỐC HAY THỰC PHẨM GÌ KHI ĐANG DÙNG THUỐC NÀY?

Chưa có báo cáo.

9. CẦN LÀM GÌ KHI MỘT LẦN QUÊN KHÔNG DÙNG THUỐC

Nếu quên không dùng thuốc một lần, bỏ qua và dùng thuốc lần tiếp theo đúng liều lượng chỉ dẫn. Không được gấp đôi liều dùng sau khi bỏ quên uống một lần thuốc.

10. CẦN BẢO QUẢN THUỐC NÀY NHƯ THẾ NÀO?

Bảo quản nơi khô, nhiệt độ dưới 30⁰C, tránh ánh sáng.

11. NHỮNG DẤU HIỆU VÀ TRIỆU CHỨNG KHI DÙNG THUỐC QUÁ LIỀU

Chưa có báo cáo về sử dụng thuốc quá liều.

12. CẦN PHẢI LÀM GÌ KHI DÙNG THUỐC QUÁ LIỀU KHUYẾN CÁO?

Ngừng sử dụng thuốc và thông báo với bác sĩ hoặc dược sĩ.

13. NHỮNG ĐIỀU CẦN THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC NÀY

- Thận trọng khi dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú.
- Đối với người lái xe và vận hành máy móc: Chưa có tài liệu ghi nhận ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe và vận hành máy móc của người sử dụng.

14. KHI NÀO CẦN THAM VẤN BÁC SĨ, DƯỢC SĨ

- Khi sử dụng đồng thời với các loại thuốc khác, thông báo cho bác sĩ biết các loại thuốc bạn đang sử dụng.
- Khi dùng thuốc quá liều, hãy thông báo ngay với bác sĩ.
- Gặp những tác dụng không mong muốn trong quá trình sử dụng thuốc.

NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN CỦA BÁC SĨ HOẶC DƯỢC SĨ.

15. HẠN DÙNG CỦA THUỐC: 36 tháng kể từ ngày sản xuất


16. NGÀY XEM XÉT SỬA ĐỔI, CẬP NHẬT LẠI NỘI DUNG HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

17. NHÀ SẢN XUẤT: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VCP

VCP Pharmaceutical Joint – Stock Company

Thanh Xuân - Sóc Sơn - Hà Nội – Việt Nam

Điện thoại: 04.35813669 Fax: 04.35813670



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DÀNH CHO CÁN BỘ Y TẾ

1. TÊN SẢN PHẨM:

CYGANIC

2. THÀNH PHẦN: Mỗi viên nén bao phim chứa:

Cao khô Actiso (*Extractum Cynarae siccum*) 80,0 mg

(tương đương với 2,0 g Actiso (*Folium Cynarae scolymi*))

Tá dược Tá dược (lactose, tinh bột sắn, calci carbonat, PVP K30, sodium starch glycolat, talc, magne stearat, HPMC E15, PEG 6000, titan dioxyd, oxyd sắt đỏ)

..... vừa đủ 1 viên nén bao phim.

3. DẠNG BÀO CHẾ

Dạng bào chế: Viên nén bao phim

Mô tả: Viên nén tròn, hai mặt lõm, màu đỏ nâu, mùi thơm dược liệu.

4. QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim + 01 tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

5. CHỈ ĐỊNH:

Tác dụng:

Actiso có các hoạt chất chính cynarin, các polyphenol, đường inulin, có tác dụng lợi mật, kích thích tiêu hóa, lợi tiểu, hạ cholesterol máu, hiệu quả đối với các chứng bệnh viêm gan, vàng da, cholesterol máu cao, xơ vữa động mạch.

Chỉ định:

- Suy giảm chức năng gan gây: vàng da, dị ứng, tiêu hóa kém.
- Hỗ trợ điều trị cholesterol trong máu cao, xơ vữa động mạch.

6. LIỀU DÙNG – CÁCH DÙNG:

Cách dùng: Dùng đường uống, uống với nước đun sôi để nguội, uống trước các bữa ăn.

Liều dùng:

- Người lớn: Ngày uống 2 lần, mỗi lần 2 – 3 viên.
- Trẻ em : Ngày uống 2 lần, mỗi lần 1 - 2 viên.

7. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.
- Viêm tắc mật.

8. THẬN TRỌNG:

- Thận trọng khi dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú.

- Đối với người lái xe và vận hành máy móc: Chưa có tài liệu ghi nhận ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe và vận hành máy móc của người sử dụng.

9. TƯƠNG TÁC THUỐC:

Chưa có báo cáo.

10. TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN (ADR):

Chưa có báo cáo.

11. QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:

Chưa có báo cáo về sử dụng thuốc quá liều.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VCP

VCP Pharmaceutical Joint – Stock Company

Thanh Xuân - Sóc Sơn - Hà Nội – Việt Nam

Điện thoại: 04.35813669 Fax: 04.35813670

Hà nội, ngày 22 tháng 08 năm 2018

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY



TUQ.CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Ngọc Anh



TỔNG GIÁM ĐỐC
ĐS. Trần Văn Cường

