

CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC TW 3

Địa chỉ: 115 Ngô Gia Tự - Đà Nẵng

Tel: 0511-3816688 *Fax:* 0511-3822767

HỒ SƠ MẪU NHÃN

Viên nén bao phim DACENKAN

Năm 2011

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ THUỐC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

MẪU NHÃN THUỐC

Lần đầu: 20/12/2012

1. Nhãn hộp:



2. Nhãn vỉ:



Toa hướng dẫn sử dụng thuốc:

Viên nén bao phim DACENKAN

Thành phần: Mỗi viên chứa

- Cao Ginkgo biloba.....40 mg
- Tá dược.....vd 1 viên (Tá dược: avicel, PVP, lactose, gelatin, tinh bột sắn, magnesi stearat, HPMC, bột talc, titan dioxyd, PEG 6000, aerosil, red iron oxid, erythrosin)

Được lực học: Chiết xuất của Ginkgo biloba có tác dụng điều hòa vận mạch trên toàn bộ mạch máu, chống phù mạch ở não lẫn ngoại biên, che chở hàng rào máu - não và máu - võng mạc. Mặt khác, cao chiết Ginkgo biloba có tác dụng ức chế mạnh sự tăng tính thủy phân protein của huyết thanh gây ra bởi nhiều hiện tượng bệnh lý. Thuốc có tính bảo vệ trên chuyển hoá tế bào và đặc biệt là các neuron ở não và các tế bào thần kinh giác quan.

Được động học: Thuốc được hấp thu nhanh và hoàn toàn. Đạt đỉnh cao trong máu sau khi uống 1 giờ 30 phút. Thời gian bán hủy sinh học 4 giờ 30 phút. Thải trừ sau 72 giờ ở dạng CO₂ thở ra và trong nước tiểu.

Chỉ định:

- Sử dụng trong các trường hợp thiếu năng tuần hoàn não & các biểu hiện chức năng như chóng mặt, nhức đầu, giảm trí nhớ, giảm khả năng nhận thức, rối loạn vận động, rối loạn cảm xúc & nhân cách.
- Rối loạn mạch máu ngoại biên: bệnh động mạch chi dưới, hội chứng Raynaud, tê lạnh & tím tái đầu chi. Chứng giòn mao mạch.
- Điều trị hội chứng khập khiễng giãn cách, bệnh võng mạc (thoái hóa vết chấm, bệnh võng mạc thuộc đài tháo), các hội chứng thuộc thiếu năng tai trong (nhức đầu, chóng mặt, ù tai...), lãng tai ở người cao tuổi. Di chứng sau các tai nạn huyết mạch thuộc não và chấn thương sọ.
- Phòng ngừa và làm chậm tiến triển của bệnh Alzheimer's (bệnh sa sút trí tuệ ở người có tuổi gây ra rối loạn trí nhớ, giảm khả năng trí tuệ, lú lẫn và rối loạn trong hành vi và cư xử).
- Hội chứng trước kinh nguyệt: nhức đầu...

Liều lượng và cách dùng:

- Người lớn: 2 viên/lần, 2-3 lần/ngày.
- Trẻ em trên 12 tuổi: 1 viên /lần, 2-3 lần/ngày.
- Mỗi đợt dùng 4-6 tuần, thuốc có thể dùng kéo dài.

Chống chỉ định:

- Quá mẫn với Ginkgo biloba và các thành phần của thuốc
- Không dùng cho phụ nữ có thai và trẻ em dưới 12 tuổi
- Người rối loạn đông máu, người đang có xuất huyết

Thận trọng:

- Thuốc này không phải là thuốc hạ huyết vì vậy không thể thay thế thuốc điều trị cao huyết áp.
- Thuốc không gây tác dụng ngược trên chuyển hoá đường, do vậy có thể dùng cho bệnh nhân tiểu đường bị rối loạn tuần hoàn thường xuyên.

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú: Không được dùng cho phụ nữ có thai và thời kỳ cho con bú

Tác dụng không mong muốn: Rối loạn tiêu hoá nhẹ, nhức đầu, dị ứng da hiếm gặp

Tương tác thuốc: Chưa có thông tin.

Quá liều và xử trí: Báo ngay cho bác sĩ khi bị quá liều.

Bảo quản: Nhiệt độ không quá 30°C, nơi khô mát, tránh ánh sáng trực tiếp.

Đóng gói: Vi 15 viên, hộp 2 vi. **Tiêu chuẩn áp dụng:** TCCS **Hạn dùng:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất

Để xa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến thầy thuốc.

Thông báo cho bác sĩ những dấu hiệu không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc

Thuốc được sản xuất tại Công ty TNHH MTV Dược TW 3 - 115 Ngô Gia Tự, Đà Nẵng

Tel: 0511.3817552 - 3816688 - 3822267 Fax: 0511.3822767



PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thanh

CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC TW 3



Phạm Thị Oanh