

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

GMP-WHO

Danospan

THÀNH PHẦN

Cho 60 ml dung dịch

Cao khô lá thường xuân.....0,42 g
Tương ứng với 2,73 g lá thường xuân (*Folium Hederæ*)
Tá dược (Kali sorbat, acid citric monohydrat, dung dịch sorbitol 70 %, sucralose, xanthan gum, nước tinh khiết) vừa đủ.....60 ml

Cho 100 ml dung dịch

Cao khô lá thường xuân.....0,7 g
Tương ứng với 4,55 g lá thường xuân (*Folium Hederæ*)
Tá dược (Kali sorbat, acid citric monohydrat, dung dịch sorbitol 70 %, sucralose, xanthan gum, nước tinh khiết) vừa đủ.....100 ml

DƯỢC LỰC HỌC

Saponin trong cao lá thường xuân (gồm alpha hederin và hederacoside C) có tác dụng chống co thắt và tan đờm theo cơ chế qua trung gian niêm mạc dạ dày, kết quả nhận được trong kích thích phản thân của các tuyến dịch nhầy phế quản thông qua các cơ quan của hệ thống thần kinh đối giao cảm.

DƯỢC ĐỘNG HỌC: Không có thông tin.

CHỈ ĐỊNH: Thuốc được dùng điều trị viêm đường hô hấp cấp tính có kèm ho, điều trị triệu chứng trong bệnh lý viêm phế quản mạn tính.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Người bị mẫn cảm với các thành phần của thuốc.
- Đối với những trường hợp bất dung nạp fructose, phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú, chỉ được phép dùng thuốc theo sự chỉ dẫn của Bác sĩ.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

Liều dùng: Nếu không có chỉ định riêng, sử dụng liều như sau:

- Trẻ sơ sinh - 1 tuổi: 2,5 ml x 1 - 2 lần/ngày.
- Trẻ 1 tuổi - 4 tuổi: 2,5 ml x 2 lần/ngày.
- Trẻ 4 tuổi - 12 tuổi: 5 ml x 2 lần/ngày.
- Trẻ > 12 tuổi và người lớn: 5 ml x 3 lần/ngày.

Cách dùng

Sử dụng dụng cụ đựng thuốc đi kèm trong hộp thuốc.

Lắc kỹ trước mỗi lần sử dụng.

Thời gian điều trị: Thời gian điều trị ho phụ thuộc vào loại bệnh và mức độ của bệnh trên lâm sàng, tuy nhiên, việc điều trị nên duy trì trong ít nhất một tuần đối với trường hợp viêm nhẹ đường hô hấp. Việc điều trị với thuốc nên được duy trì 2 - 3 ngày sau khi hết triệu chứng để đảm bảo hiệu quả của đợt điều trị.

Nếu tình trạng bệnh vẫn kéo dài hoặc có xuất hiện thờ nùng, sốt cũng như đờm có máu hoặc mủ thì phải tham khảo ngay ý kiến Bác sĩ.

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Mặc dù chưa có báo cáo nào về tác dụng không mong muốn đối với thai nhi và trẻ bú mẹ, chỉ nên sử dụng thuốc cho phụ nữ mang thai và cho con bú khi thật cần thiết. Cần cân nhắc giữa lợi ích mang lại và nguy cơ tác dụng không mong muốn có thể xảy ra.

TƯƠNG TÁC THUỐC

Không có phản ứng không mong muốn nào được biết đến khi sử dụng đồng thời đường uống siro ho Danospan với các loại thuốc khác. Vì vậy, sử dụng siro Danospan đồng thời với các thuốc khác được xem là an toàn, ví dụ như phối hợp với thuốc kháng sinh.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

Rất hiếm khi, siro ho Danospan có thể dẫn tới nhuận tràng do thành phần sorbitol có trong thuốc.

Thông báo cho Bác sĩ các tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

QUÁ LIỀU VÀ XỬ TRÍ

Dùng quá liều có thể gây buồn nôn, ói mửa, tiêu chảy và kích thích. Trong trường hợp này, nên tham khảo ngay ý kiến của Bác sĩ.

KHUYẾN CÁO

- Không nên dùng thuốc quá hạn (có ghi rõ trên nhãn) hay khi có sự nghi ngờ về chất lượng thuốc.

- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Muốn biết thêm thông tin, xin hãy hỏi ý kiến của Bác sĩ hoặc Dược sĩ.

Lưu ý đặc biệt: Cũng như các chế phẩm có nguồn gốc chiết xuất từ thực vật, màu của siro Danospan đôi khi có thể bị thay đổi. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị của thuốc.

TRÌNH BÀY VÀ BẢO QUẢN

- Chế phẩm đóng trong chai thủy tinh 60 ml, chai thủy tinh 100 ml, hộp 1 chai kèm theo cốc phân liều và tờ hướng dẫn sử dụng.

- Để thuốc nơi khô thoáng, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

Thuốc được sản xuất tại

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA

253 Đường Sĩ Thanh Khê, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

Tel: 0236. 3760130 Fax: 0236. 3760127

Email: Info@danapha.com

Điện thoại tư vấn: 0236.3760131