

Lần đầu: 27/12/2013

all

10 VỈ X 10 VIÊN NANG

10 VỈ X 10 VIÊN NANG

Dexamethason acetat.....0,5mg

- Kháng viêm
- Viêm khớp cấp
- Bệnh dị ứng



THÀNH PHẦN: Dexamethason acetat 0,5mg

CHỈ ĐỊNH: Điều trị dị ứng ngoài da, dị ứng đường hô hấp, kháng viêm, thấp khớp cấp, hen phế quản.

LIỀU DÙNG

Người lớn: uống mỗi lần 1 viên, ngày uống 1-3 lần.

Trẻ em: theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc

CÁCH DÙNG: Uống thuốc vào các bữa ăn.

Nếu tổng liều hàng ngày cao thì nên chia thành các liều nhỏ để sử dụng.

Không nên ngưng thuốc đột ngột mà phải giảm liều dần.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Quá mẫn với Dexamethason, nhiễm nấm toàn thân, nhiễm virus tại chỗ hoặc nhiễm khuẩn lao, lậu chưa kiểm soát được bằng thuốc kháng khuẩn và khớp bị hủy hoại nặng.

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

10 VỈ X 10 VIÊN NANG

Dexamethason acetat.....0,5mg

- **Kháng viêm**
- **Viêm khớp cấp**
- **Bệnh dị ứng**



**Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc
Để xa tầm tay của trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ < 30°C**

SDK :
 TC áp dụng: TCCS
 Số lô SX :
 Ngày SX :
 HD :


Cty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3.829.311 • Fax: (072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: km 1954, quốc lộ 1A,
phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An

10 VỈ X 10 VIÊN NANG

IR Thuốc bán theo đơn

DEXAMETHASONE

Dexamethason acetat.....0.5mg





001123
CỘNG TY
CÔ PHẦN
DƯỢC
YACOPHARM
S.Đ. K.K.D: TP. TÂN AN - T. LONG AN



Nhãn chai 50 viên nang

THÀNH PHẦN: Dexamethason acetat0,5mg
CHỈ ĐỊNH: Điều trị dị ứng ngoài da, dị ứng đường hô hấp, kháng viêm, thấp khớp cấp, hen phế quản.
LIỀU DÙNG:
Người lớn: uống mỗi lần 1 viên, ngày uống 1-3 lần.
Trẻ em: theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc
CÁCH DÙNG: Uống thuốc vào các bữa ăn.
Nếu tổng liều hàng ngày cao thì nên chia thành các liều nhỏ để sử dụng.
Không nên ngưng thuốc đột ngột mà phải giảm liều dần.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Quá mẫn với Dexamethason, nhiễm nấm toàn thân, nhiễm virus tại chỗ hoặc nhiễm khuẩn lao, lậu chưa kiểm soát được bằng thuốc kháng khuẩn và khớp bị hủy hoại nặng.

R^x Thuốc bán theo đơn 50 VIÊN NANG



Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc
Để xa tầm tay của trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ < 30°C

SDK :
TC áp dụng: T CCS
Số lô SX :
Ngày SX :
HD :
Cty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3.829.311 • Fax: (072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: km 1954, quốc lộ 1A,
phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An

Nhãn chai 100 viên nang

THÀNH PHẦN: Dexamethason acetat0,5mg
CHỈ ĐỊNH: Điều trị dị ứng ngoài da, dị ứng đường hô hấp, kháng viêm, thấp khớp cấp, hen phế quản.
LIỀU DÙNG:
Người lớn: uống mỗi lần 1 viên, ngày uống 1-3 lần.
Trẻ em: theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc
CÁCH DÙNG: Uống thuốc vào các bữa ăn.
Nếu tổng liều hàng ngày cao thì nên chia thành các liều nhỏ để sử dụng.
Không nên ngưng thuốc đột ngột mà phải giảm liều dần.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Quá mẫn với Dexamethason, nhiễm nấm toàn thân, nhiễm virus tại chỗ hoặc nhiễm khuẩn lao, lậu chưa kiểm soát được bằng thuốc kháng khuẩn và khớp bị hủy hoại nặng.

R^x Thuốc bán theo đơn 100 VIÊN NANG



Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc
Để xa tầm tay của trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ < 30°C

SDK :
TC áp dụng: T CCS
Số lô SX :
Ngày SX :
HD :
Cty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3.829.311 • Fax: (072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: km 1954, quốc lộ 1A,
phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An

Nhãn chai 200 viên nang

THÀNH PHẦN: Dexamethason acetat0,5mg
CHỈ ĐỊNH: Điều trị dị ứng ngoài da, dị ứng đường hô hấp, kháng viêm, thấp khớp cấp, hen phế quản.
LIỀU DÙNG:
Người lớn: uống mỗi lần 1 viên, ngày uống 1-3 lần.
Trẻ em: theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc
CÁCH DÙNG: Uống thuốc vào các bữa ăn.
Nếu tổng liều hàng ngày cao thì nên chia thành các liều nhỏ để sử dụng.
Không nên ngưng thuốc đột ngột mà phải giảm liều dần.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Quá mẫn với Dexamethason, nhiễm nấm toàn thân, nhiễm virus tại chỗ hoặc nhiễm khuẩn lao, lậu chưa kiểm soát được bằng thuốc kháng khuẩn và khớp bị hủy hoại nặng.

R^x Thuốc bán theo đơn 200 VIÊN NANG



Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc
Để xa tầm tay của trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ < 30°C

SDK :
TC áp dụng: T CCS
Số lô SX :
Ngày SX :
HD :
Cty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3.829.311 • Fax: (072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: km 1954, quốc lộ 1A,
phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An

Nhãn chai 500 viên nang

THÀNH PHẦN: Dexamethason acetat0,5mg
CHỈ ĐỊNH: Điều trị dị ứng ngoài da, dị ứng đường hô hấp, kháng viêm, thấp khớp cấp, hen phế quản.
LIỀU DÙNG:
Người lớn: uống mỗi lần 1 viên, ngày uống 1-3 lần.
Trẻ em: theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc
CÁCH DÙNG: Uống thuốc vào các bữa ăn.
Nếu tổng liều hàng ngày cao thì nên chia thành các liều nhỏ để sử dụng.
Không nên ngưng thuốc đột ngột mà phải giảm liều dần.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Quá mẫn với Dexamethason, nhiễm nấm toàn thân, nhiễm virus tại chỗ hoặc nhiễm khuẩn lao, lậu chưa kiểm soát được bằng thuốc kháng khuẩn và khớp bị hủy hoại nặng.

R^x Thuốc bán theo đơn 500 VIÊN NANG



Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc
Để xa tầm tay của trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ < 30°C

SDK :
TC áp dụng: T CCS
Số lô SX :
Ngày SX :
HD :
Cty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3.829.311 • Fax: (072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: km 1954, quốc lộ 1A,
phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An

Rx Thuốc bán theo đơn

VIÊN NANG DEXAMETHASON

Thành phần

Dexamethason acetat 0,5mg
Tá dược v.đ 1 viên nang

(Polyvinyl pyrrolidon, Magnesi stearat, Tinh bột sắn)

Quy cách đóng gói: viên nang được ép v.đ, mỗi v.đ 10 viên cho vào hộp 10 v.đ, v.đ 10 viên vào hộp 20 v.đ hoặc đóng chai 50, 100, 200, 500 viên kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

Dược lực học

Dexamethason là fluomethylprednisolon, glucocorticoid tổng hợp, có tác dụng bằng cách gắn kết vào thụ thể ở tế bào, chuyển vị vào nhân tế bào và ở đó đã tác động đến một số gen đã được dịch mã. Thuốc có tác dụng chính là chống viêm, chống dị ứng và ức chế miễn dịch.

Dược động học

Các corticoid được hấp thu tốt từ đường tiêu hóa, và cũng được hấp thu tốt ở ngay vị trí dùng thuốc và sau đó được phân bố vào tất cả các mô trong cơ thể. Thuốc qua nhau thai và một lượng nhỏ qua sữa.

Thuốc được hấp thu cao ở gan, thận và các tuyến thượng thận. Chuyển hóa ở gan chậm và thải trừ chủ yếu qua nước tiểu, hầu hết ở dạng steroid không liên hợp. Nửa đời sinh học của Dexamethason là 36-54 giờ, do vậy thuốc đặc biệt thích hợp với các bệnh có glucocorticoid tác dụng liên tục.

Chỉ định

Điều trị dị ứng ngoài da, dị ứng đường hô hấp, kháng viêm, thấp khớp cấp, hen phế quản.

Liều dùng

Người lớn: uống mỗi lần 1 viên, ngày uống 1-3 lần.

Trẻ em: theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc

Cách dùng

Uống thuốc vào các bữa ăn.

Nếu tổng liều hàng ngày cao thì nên chia thành các liều nhỏ để sử dụng.

Không nên ngưng thuốc đột ngột mà phải giảm liều dần.

Chống chỉ định

Quá mẫn với Dexamethason, nhiễm nấm toàn thân, nhiễm virus tại chỗ hoặc nhiễm khuẩn lao, lậu chưa kiểm soát được bằng thuốc kháng khuẩn và khớp bị hủy hoại nặng.

Thận trọng

Ở người bệnh nhiễm khuẩn hoặc nghi ngờ nhiễm khuẩn, phải đặc biệt chú ý và điều trị bằng các thuốc kháng khuẩn đặc hiệu là cần thiết trước tiên, do tác dụng ức chế miễn dịch nên Dexamethason có thể gây nên những cơn kịch phát và lan rộng nhiễm khuẩn. Tuy nhiên, người viêm màng não nhiễm khuẩn cần phải dùng Dexamethason trước khi dùng các thuốc kháng khuẩn đặc hiệu để đề phòng viêm não do phản ứng với các mảnh xác vi khuẩn đã bị thuốc kháng khuẩn diệt.

Ở người loãng xương hoặc mới phẫu thuật ruột, loạn tâm thần, loét dạ dày tá tràng, loét loét đường, tăng huyết áp, suy tim, suy thận, lao thì cần phải theo dõi chặt chẽ và điều trị tích cực các bệnh đó nếu cần phải dùng Dexamethason.

Tương tác thuốc

Các thuốc barbiturat, phenytoin, rifampicin, ephedrin, aminoglutethimid có thể làm tăng thanh thải corticosteroid nên giảm tác dụng điều trị.

Corticoid đối kháng tác dụng của các tác nhân gây hạ đường huyết, thuốc hạ huyết áp và thuốc lợi tiểu. Corticosteroid làm tăng tác dụng hạ kali huyết của acetazolamid, các thiazid lợi tiểu quai, carbenoxolon.

Khi dùng đồng thời với corticoid có thể làm tăng tác dụng của các dẫn chất cumarin chống đông máu.

Sự thanh thải salicylat tăng khi dùng đồng thời với corticoid.

Các thuốc lợi tiểu làm giảm kali huyết (ví dụ thiazid, furosemid) và amphotericin B có thể làm tăng tác dụng giảm kali huyết của glucocorticoid.

Phụ nữ có thai và cho con bú

Cần thận trọng trong 3 tháng đầu thai kỳ và theo dõi của bác sĩ. Dexamethason vào sữa mẹ và có nguy cơ đối với trẻ bú mẹ

Người lái xe và vận hành máy móc: dùng được

Tác dụng phụ

Hạ kali huyết, giữ natri và nước gây tăng huyết áp và phù nề, teo tuyến thượng thận, giảm dung nạp glucid, rối loạn kinh nguyệt, loãng xương, gãy xương bệnh lý, loét dạ dày tá tràng, loét chảy máu, viêm tụy cấp. Teo da, ban đỏ, bầm máu, rậm lông, mất ngủ, sảng khoái.

Giảm quá nhanh liều thuốc sau khi điều trị kéo dài có thể dẫn tới suy thượng thận cấp, hạ huyết áp và chết. Ngừng thuốc đôi khi giống như tái phát bệnh

Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Sử dụng quá liều

Quá liều glucocorticoid gây ngộ độc cấp hoặc gây chết rất hiếm. Không có thuốc giải độc đặc hiệu, điều trị triệu chứng.

Xử trí: Choáng phản vệ hoặc phản ứng quá mẫn có thể được điều trị bằng epinephrin, hô hấp nhân tạo và aminophyllin. Người bệnh nên được giữ ấm và yên tĩnh..

Hạn dùng, bảo quản, tiêu chuẩn áp dụng

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Bảo quản: nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ < 30°C.

TC áp dụng: TCCS.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến Bác sĩ

Công ty cổ phần Dược VACOPHARM.

59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An.

Điện thoại: (072) 3826111-3829311

Địa chỉ nhà máy: km 1954, Quốc lộ 1A,
Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An.



PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thanh

Long An, ngày 28 tháng 2 năm 2012

KT. Tổng Giám đốc Công ty

Phó Tổng Giám đốc



KS. Phan Thị Minh Thu