




THÀNH PHẦN

Diacerein 50mg

Tá được v.đ 01 viên nang

CHỈ ĐỊNH

Điều trị dài hạn các bệnh thoái hóa khớp: viêm xương khớp và các bệnh liên quan.

LIỀU DÙNG: Dùng dài hạn, uống sau bữa ăn.

Liều khởi đầu: uống 1viên vào bữa ăn tối trong 2 tuần. Sau đó tăng lên 1viên/lần, ngày 2 lần.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Người có tiền sử quá mẫn với dẫn xuất anthraquinone hoặc các thành phần khác có trong thuốc.

Trẻ dưới 15 tuổi. Phụ nữ có thai và cho con bú.

Người bệnh bị rối loạn tiêu hóa trước đó, đặc biệt là đại tràng dễ bị kích thích, người đang dùng thuốc nhuận tràng.



Để xa tầm tay của trẻ em
Bảo quản nơi khô ráo thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ < 30°C
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Cty Cổ Phần Dược VACOPHARM

59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An

ĐT: (072) 3.829.311 □ Fax: (072) 3.822.244

Địa chỉ nhà máy: km 1954, quốc lộ 1A,
phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An

TC áp dụng: TCCS


SĐK :


Số lô SX :

Ngày SX :

HD :

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG





THÀNH PHẦN

Diacerein 50mg
Tá dược v.đ 01 viên nang

CHỈ ĐỊNH

Điều trị dài hạn các bệnh thoái hóa khớp: viêm xương khớp và các bệnh liên quan.

***LIỀU DÙNG:** Dùng dài hạn, uống sau bữa ăn.

Liều khởi đầu: uống 1viên vào bữa ăn tối trong 2 tuần. Sau đó tăng lên 1viên/lần, ngày 2 lần.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Người có tiền sử quá mẫn với dẫn xuất anthraquinone hoặc các thành phần khác có trong thuốc.

Trẻ dưới 15 tuổi. Phụ nữ có thai và cho con bú.

Người bệnh bị rối loạn tiêu hóa trước đó, đặc biệt là đại tràng dễ bị kích thích, người đang dùng thuốc nhuận tràng.



Để xa tầm tay của trẻ em
Bảo quản nơi khô ráo thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ < 30°C
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Cty Cổ Phần Dược VACOPHARM

59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3.829.311 □ Fax: (072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: km 1954, quốc lộ 1A,
phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An

TC áp dụng: TCCS


SĐK :


Số lô SX :

Ngày SX :

HD :

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG





THÀNH PHẦN

Diacerein 50mg

Tá dược v.d 01 viên nang

CHỈ ĐỊNH

Điều trị dài hạn các bệnh thoái hóa khớp: viêm xương khớp và các bệnh liên quan.

LIỀU DÙNG: Dùng dài hạn, uống sau bữa ăn.

Liều khởi đầu: uống 1 viên vào bữa ăn tối trong 2 tuần. Sau đó tăng lên 1 viên/lần, ngày 2 lần.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Người có tiền sử quá mẫn với dẫn xuất anthraquinone hoặc các thành phần khác có trong thuốc.

Trẻ dưới 15 tuổi. Phụ nữ có thai và cho con bú.

Người bệnh bị rối loạn tiêu hóa trước đó, đặc biệt là đại tràng dễ bị kích thích, người đang dùng thuốc nhuận tràng.



Để xa tầm tay của trẻ em
Bảo quản nơi khô ráo thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ < 30°C
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Cty Cổ Phần Dược VACOPHARM

59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An

ĐT: (072) 3.829.311 □ Fax: (072) 3.822.244

Địa chỉ nhà máy: km 1954, quốc lộ 1A,
phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An



TC áp dụng: TCCS

SĐK :

Số lô SX :

Ngày SX :

HD :

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

2. Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất

Nhãn vỉ



Nhãn chai 100 viên nang

THÀNH PHẦN
Diacerein 50mg
Tá dược v.đ 01 viên nang

Chỉ ĐỊNH
Điều trị dài hạn các bệnh thoái hóa khớp: viêm xương khớp và các bệnh liên quan.

LIỀU DÙNG
Dùng dài hạn, uống sau bữa ăn.
Liều khởi đầu: uống 1 viên vào bữa ăn tối trong 2 tuần. Sau đó tăng lên 1 viên/lần, ngày 2 lần.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Người có tiền sử quá mẫn với dẫn xuất anthraquinone hoặc các thành phần khác có trong thuốc.
Trẻ dưới 15 tuổi. Phụ nữ có thai và cho con bú.
Người bệnh bị rối loạn tiêu hóa trước đó, đặc biệt là đại tràng dễ bị kích thích, người đang dùng thuốc nhuận tràng.

R_x Thuốc bán theo đơn

DIACEREIN

Diacerein 50mg

Vacopharm

100 viên nang

Để xa tầm tay của trẻ em
Bảo quản nơi khô ráo thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ < 30°C
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

TC áp dụng: TCCS
SDK :
Số lô SX :
Ngày SX :
HD :
Cty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3.829.311 • Fax: (072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: km 1954, quốc lộ 1A,
phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An

Nhãn chai 200 viên nang

THÀNH PHẦN
Diacerein 50mg
Tá dược v.đ 01 viên nang

Chỉ ĐỊNH
Điều trị dài hạn các bệnh thoái hóa khớp: viêm xương khớp và các bệnh liên quan.

LIỀU DÙNG
Dùng dài hạn, uống sau bữa ăn.
Liều khởi đầu: uống 1 viên vào bữa ăn tối trong 2 tuần. Sau đó tăng lên 1 viên/lần, ngày 2 lần.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Người có tiền sử quá mẫn với dẫn xuất anthraquinone hoặc các thành phần khác có trong thuốc.
Trẻ dưới 15 tuổi. Phụ nữ có thai và cho con bú.
Người bệnh bị rối loạn tiêu hóa trước đó, đặc biệt là đại tràng dễ bị kích thích, người đang dùng thuốc nhuận tràng.

R_x Thuốc bán theo đơn

DIACEREIN

Diacerein 50mg

Vacopharm

200 viên nang

Để xa tầm tay của trẻ em
Bảo quản nơi khô ráo thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ < 30°C
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

TC áp dụng: TCCS
SDK :
Số lô SX :
Ngày SX :
HD :
Cty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3.829.311 • Fax: (072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: km 1954, quốc lộ 1A,
phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An

R_x Thuốc bán theo đơn

Viên nang DIACEREIN

Thành phần

Diacerein

50mg

Tá dược v.đ

01 viên nang

(Tinh bột sắn, Polyvinyl pyrrolidon, Quinolin yellow, Magnesi stearat)

Quy cách đóng gói

STT	Mô tả tóm tắt quy cách đóng gói
1	Ép vỉ Al-PVC, vỉ 10 viên, hộp 3 vỉ
2	Ép vỉ Al-PVC, vỉ 10 viên, hộp 5 vỉ
3	Ép vỉ Al-PVC, vỉ 10 viên, hộp 10 vỉ
4	Đóng chai 100 viên
5	Đóng chai 200 viên

Dược lực học

Diacerein là dẫn chất acetylate của chất dihydro anthraquinone rhein, là thuốc chống viêm và chống thấp khớp không steroid.

Diacerein ức chế interleukine 1beta (IL- 1 β) có tác dụng chống viêm, điều trị viêm xương, thoái hóa khớp. Diacerein ức chế sự sản xuất và hoạt động của chất Cytokine IL-1 β tiền viêm và tiền dị hóa cả ở lớp nông và lớp sâu của sụn, màng hoạt dịch và các thành phần của chất căn bản ngoài tế bào như proteoglycan, aggrecan, acid hyaluronic và chất tạo keo type II.

Chỉ định

Điều trị dài hạn các bệnh thoái hóa khớp: viêm xương khớp và các bệnh liên quan.

Liều dùng: Dùng dài hạn, uống sau bữa ăn.

Liều khởi đầu: uống 1viên vào bữa ăn tối trong 2 tuần. Sau đó tăng lên 1viên/lần, ngày 2 lần.

Chống chỉ định

Người có tiền sử quá mẫn với dẫn xuất anthraquinone hoặc các thành phần khác có trong thuốc.

Trẻ dưới 15 tuổi. Phụ nữ có thai và cho con bú.

Người bệnh bị rối loạn tiêu hóa trước đó, đặc biệt là đại tràng dễ bị kích thích, người đang dùng thuốc nhuận tràng.

Thận trọng

Giảm liều ở người suy thận, người già.

Tác dụng không mong muốn

Tăng nhanh thời gian thức ăn qua ruột, đau bụng, tiêu chảy hoặc đi phân lỏng trong vài ngày đầu dùng thuốc, những triệu chứng này tự giảm đi khi tiếp tục điều trị. Nước tiểu có thể vàng sậm.

Thông báo cho Bác sĩ tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng.

Sử dụng cho phụ nữ mang thai và cho con bú: không được dùng

Tác dụng của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: thuốc không có tác dụng an thần, sử dụng được cho người lái xe và vận hành máy móc

Tương tác thuốc

Không dùng chung thuốc nhuận tràng.

Nên tránh dùng đồng thời với các thuốc chứa muối, oxide hoặc hydroxide nhôm, calci và magie vì chúng làm giảm hấp thu Diacerein. Có thể dùng những chất này sau khi uống Diacerein khoảng 2 giờ.

Do tác động khởi đầu chậm (sau 2-4 tuần điều trị), và khả năng dung nạp rất tốt qua đường tiêu hóa nên Diacerein có thể kết hợp với một thuốc kháng viêm không steroid hoặc thuốc giảm đau trong 2-4 tuần điều trị đầu tiên.

Sử dụng quá liều: Dùng liều cao Diacerein do uống nhầm hoặc cố ý có thể gây tiêu chảy. Cần điều trị triệu chứng. Nếu tiêu chảy kéo dài, xin đến gặp bác sĩ của bạn. Điều trị cấp cứu bao gồm phục hồi cân bằng nước - điện giải nếu cần thiết.

Hạn dùng, bảo quản, tiêu chuẩn áp dụng

- Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất
- Bảo quản: nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ < 30°C
- TC áp dụng: TCCS.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến Bác sĩ.

Thuốc này chỉ dùng theo đơn của Bác sĩ.

Công ty Cổ phần Dược VACOPHARM

59 Nguyễn Huệ, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

Điện thoại: (072) 3826111 – 3829311

Địa chỉ nhà máy: km 1954, Quốc lộ 1A,

Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An.

Long An, ngày tháng năm 2012

KT. Tổng Giám đốc

Phó Tổng Giám đốc



KS. Phan Thị Minh Thu