




b). Nhãn hộp 1 chai x 100 viên nén.



THÀNH PHẦN: Mỗi viên nén chứa:

- Cao tỏi 5/1 (*Allium sativum* extract) 300 mg (tương đương 1500 mg tỏi tươi)
- Cao nghệ 4/1 (*Curcuma longa* extract) 25 mg (tương đương 100 mg nghệ tươi)
- Tá dược và đủ

CHỈ ĐỊNH: Hạ cholesterol máu, điều hòa triglyceride huyết thanh, tăng tuần hoàn máu, bảo vệ thành mạch, ngừa xơ vữa động mạch.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Mẫn cảm với các thành phần của thuốc. Phụ nữ có thai, phụ nữ sau sinh không có ứ huyết không dùng.

TƯƠNG TÁC THUỐC: Dùng đồng thời với warfarin có thể làm tăng thời gian đông máu.


TÁC DỤNG PHỤ: Thuốc có thể gây viêm da, dị ứng, ợ nóng, tiêu chảy.

CÁCH DÙNG & LIỀU DÙNG: Dùng uống từ 2 - 4 viên/ngày, chia 2 lần, trước bữa ăn hoặc tùy theo sự chỉ dẫn của bác sĩ.

BẢO QUẢN: Dưới 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp.

SĐK:
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: TCCS

ĐỂ XA TÁM TAY CỦA TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG



COMPOSITION : Each tablet contains

- Garlic extract 5/1 (*Allium sativum* extract) 300 mg (equivalent to 1500 mg fresh Garlic)
- Turmeric extract 4/1 (*Curcuma longa* extract) 25 mg (equivalent to 100 mg fresh Turmeric)
- Excipients s.q.t

INDICATIONS: Regulates blood pressure, triglyceridemia, cholesterolemia. Helps as a prophylactic against atherosclerosis.

CONTRAINDICATIONS: Hypersensitivity to components the drugs. Pregnant women, women after the birth do not have congestion do not use Dogarlic.

DRUG INTERACTIONS: Concomitant use of warfarin can increase coagulation time.

SIDE EFFECTS: The drugs can cause dermatitis, allergy, heartburn, diarrhea.

DOSAGE AND ADMINISTRATION: 2 - 4 tablets daily, twice per day before a meal or conform to prescription of your doctor.

STORAGE: Below 30°C, protect from direct light.

REGISTRATION NUMBER :
MANUFACTURER'S SPECIFICATION

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
READ CAREFULLY THE INSTRUCTIONS BEFORE USE



DOGARLIC®

THÀNH PHẦN: Mỗi viên nén chứa:

- Cao Tỏi 5/1 (tương đương 700 mg Tỏi - *Bulbus Allii sativi*) 140 mg
- Cao Nghệ 4/1 (tương đương 60 mg Nghệ - *Rhizoma Curcumae longae*) 15 mg

- Tá dược: Lactose, Tinh bột mì, Povidon K90, Colloidal silicon dioxid A200, Natri benzoat, Nipagin, Nipasol, Natri starch glycolat, Talc, Magnesi stearat.

DẠNG BÀO CHẾ: Viên nén.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:

- Hộp 2 vỉ x 10 viên, hộp 10 vỉ x 10 viên, hộp 20 vỉ x 10 viên.
- Hộp 1 chai x 50 viên, hộp 1 chai x 100 viên.

CHỈ ĐỊNH:

- Điều trị tăng lipid máu (cholesterol và triglycerid) khi không điều chỉnh được bằng chế độ ăn uống.
- Phòng ngừa xơ vữa động mạch.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG: Dùng uống.

- Dùng 3 - 4 viên/ngày, chia 2 lần sau bữa ăn hoặc theo sự chỉ dẫn của bác sĩ.
- Có thể sử dụng thời gian dài trong phòng ngừa xơ vữa động mạch.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Mẫn cảm với các thành phần của thuốc.

THẬN TRỌNG KHI SỬ DỤNG:

Sử dụng nhiều Tỏi có thể làm tăng nguy cơ chảy máu sau phẫu thuật.

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

- Không nên sử dụng cho phụ nữ có thai khi không có chỉ định của bác sĩ.
- Tỏi bài tiết qua sữa mẹ và tác dụng trên trẻ sơ sinh chưa được nghiên cứu. Không nên dùng khi không có chỉ định của bác sĩ.

ẢNH HƯỞNG LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:

Thuốc không ảnh hưởng khi lái xe và vận hành máy móc.

TƯƠNG TÁC VỚI CÁC THUỐC KHÁC VÀ CÁC DẠNG TƯƠNG TÁC KHÁC:

- Dùng đồng thời với warfarin có thể làm tăng thời gian chảy máu.

- Nhằm tránh các tương tác có thể xảy ra giữa các thuốc, nên báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ các thuốc khác đang sử dụng.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

- Thuốc có thể gây viêm da tiếp xúc, gây cơn hen suyễn khi hít phải, dị ứng, kích ứng đường tiêu hóa, ợ nóng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy, có mùi Tỏi trong hơi thở và ở da.

- Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:

Chưa có báo cáo liên quan đến quá liều của thuốc. Không có phản ứng có hại, tuy nhiên cần phải sử dụng đúng liều chỉ định.

ĐẶC TÍNH DƯỢC LÝ:

Tỏi có tác dụng chống xơ vữa động mạch, hạ lipid huyết, chống sự tăng huyết áp, chống lại sự kết tập tiểu cầu, giãn mạch và là chất chống oxy hóa hiệu quả.

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30 °C, tránh ánh sáng.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

NEU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ.

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM.

NHÀ SẢN XUẤT:



DOMESCO

**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ
DOMESCO**

Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Cấn Lố, Ấp An Định,
Xã An Bình, Huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 1800.969.660.