

<https://trungtamthuoc.com/>
EXOMUC 200 mg
Acetylcysteine

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ.

THÀNH PHẦN

Acetylcysteine 200 mg
Tá dược: hương cam S289, aspartame, beta-carotene, sorbitol vừa đủ 1 gói 1 g.
Không đường.

DẠNG BÀO CHẾ – QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

Cốm pha dung dịch uống. Hộp 30 gói.

CHỈ ĐỊNH

Điều trị rối loạn chất tiết phế quản, đặc biệt trong các bệnh phế quản cấp: viêm phế quản cấp và đợt cấp của bệnh phế quản phổi mãn.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG

Đường uống.

Người lớn và trẻ em trên 7 tuổi: 1 gói/lần, 3 lần mỗi ngày.

Trẻ em từ 2 đến 7 tuổi: 1 gói/lần, 2 lần mỗi ngày.

Hòa tan cốm trong nửa ly nước trước khi uống. Uống trước hoặc sau bữa ăn.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Trẻ em dưới 2 tuổi.

Phenylketon niệu (do có chứa aspartame).

Tiền sử hen (nguy cơ phản ứng co thắt phế quản).

Quá mẫn với acetylcysteine.

THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC

Thận trọng khi dùng cho bệnh nhân bị loét dạ dày-tá tràng.

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Không có đủ dữ liệu để sử dụng an toàn ở phụ nữ có thai và cho con bú.

TÁC DỤNG CỦA THUỐC KHI LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC: không có

TƯƠNG TÁC THUỐC

Không nên dùng đồng thời thuốc ho hoặc thuốc làm giảm bài tiết phế quản trong thời gian điều trị bằng acetylcysteine.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

Đã ghi nhận những rối loạn tiêu hóa: buồn nôn, nôn. Trong trường hợp này nên giảm liều.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ: không có

BẢO QUẢN – HẠN DÙNG

Không được dùng quá ngày hết hạn dùng được ghi trên bao bì.

Đề xa tầm tay trẻ em.

Bảo quản ở nhiệt độ dưới 30°C.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

NHÀ SẢN XUẤT

SOPHARTEX

21, rue du Pressoir, 28500 Vernouillet – PHÁP

009612V38074-05

009612/V38074-05

CHỦ SỞ HỮU SẢN PHẨM
BOUCHARA-RECORDATI
68 rue Marjolin, 92300 Levallois-Perret - PHÁP