



CL21001-2014-1

Rx Thuốc kê đơn

Hướng dẫn sử dụng thuốc

Eyaren Ophthalmic Drops

- Thuốc này chỉ dùng theo đơn của bác sĩ.
- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ.
- Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.
- Để thuốc xa tầm tay trẻ em.
- Không dùng thuốc quá hạn in trên bao bì.

THÀNH PHẦN: Mỗi lọ 10mL chứa:

Hoạt chất: Potassium Iodide30 mg

Sodium Iodide30 mg

Tá dược: Methyl paraben, Propyl paraben, Hypromellose, Tocopherol acetate, Polysorbate 20, Polyoxyl 40 hygrenated castor oil, Sodium borate, Boric acid, Sodium hydroxide, Nước tinh khiết vô khuẩn.

MÔ TẢ: Dung dịch nhỏ mắt trong suốt, không màu.

DUYỆC LỰC HỌC/DUYỆC ĐỘNG HỌC:

Duyệt lực học: Iodine là chất rất dễ bị oxi hóa, do đó nó có tác dụng chống oxi hóa ở một số bệnh do hiện tượng oxi hóa gây ra. Tác dụng chống đục thủy tinh thể của iodide (iodine) được cho là do ảnh hưởng chống oxi hóa trực tiếp hoặc gián tiếp của chất này.

Duyệt động học: Khi dùng theo đường nhỏ mắt, Iodide có thể được hấp thu vào cơ thể, chất này sau đó được dự trữ ở tuyến giáp. Iodide được thải trừ chủ yếu qua nước tiểu, một lượng nhỏ qua nước bọt, mồ hôi, sữa mẹ và phân.

CHỈ ĐỊNH: Vẩn đục pha lê thể, xuất huyết pha lê thể do bất cứ nguyên nhân gì (người già, cận thị, tiểu đường, viêm quanh tĩnh mạch), đục thủy tinh thể bắt đầu và tiến triển.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

- Dùng cho người lớn
- Nhỏ mắt 1 giọt 1 lần, 1-3 lần 1 ngày

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- (1) Bệnh nhân mẫn cảm với potassium iodide và sodium iodide
- (2) Thiếu năng hoặc cường năng tuyến giáp
- (3) Phụ nữ mang thai cho con bú
- (4) Trẻ em

CÁC CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG:

Thận trọng chung:

1. Những người đeo kính áp tròng nên bỏ kính trước khi dùng thuốc, và nên đeo kính 30 phút sau khi dùng thuốc.
2. Thuốc chỉ dùng để nhỏ mắt.
3. Tránh chạm đầu lọ vào mí mắt hay các phần khác của mắt.
4. Không dùng chung 1 lọ thuốc cho nhiều người để tránh lây nhiễm.
5. Không sử dụng thuốc quá hạn, lọ thuốc đã được mở quá 1 tháng không nên dùng lại.
6. Nhằm giảm tác dụng toàn thân của thuốc, nên dùng ngón tay ấn túi bao tuyến nước mắt xuống và giữ 1 đến 2 phút sau khi nhỏ thuốc.
7. Tránh xa tầm với của trẻ nhỏ.
8. Đóng nắp lọ ngay sau khi dùng.
9. Bảo quản ở nơi khô ráo, mát và tránh ánh sáng.
10. Không nên thay đổi lọ đựng thuốc để đảm bảo chất lượng thuốc và tránh dùng nhầm thuốc.

Sử dụng cho trẻ em:

Không dùng thuốc cho trẻ em.

TƯƠNG TÁC VỚI CÁC THUỐC KHÁC: Chưa có dữ liệu.

SỬ DỤNG TRONG TRƯỜNG HỢP CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

Thời kỳ mang thai

Iodine dùng cho phụ nữ có thai có thể được hấp thu gây ra thiếu năng giáp nguyên phát (tạm thời) hoặc bướu cổ ở trẻ sơ sinh. Không dùng thuốc cho phụ nữ có thai.

Thời kỳ cho con bú

Iodine được thải trừ dưới dạng hoạt tính qua sữa mẹ do đó không nên dùng thuốc cho phụ nữ đang cho con bú.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

- (1) Tại chỗ: Bông tạm thời có thể xảy ra sau khi nhỏ thuốc. Đôi khi thuốc gây tăng tiết nước mắt.
- (2) Toàn thân: Do có chứa thành phần iodine, thuốc có thể gây cường giáp và mọc trứng cá ở những người có cơ địa nổi mụn.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ LÝ: Chưa có nghiên cứu nào về quá liều iodide.

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN: Bảo quản ở nhiệt độ phòng trong lọ kín không khí.

DẠNG BẢO CHẾ VÀ QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 1 lọ chứa 10 mL

TIÊU CHUẨN: Nhà sản xuất

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất

01 tháng kể từ khi mở nắp 1 ọ.

