

CÔNG THỨC:

Tetrahydrozolin HCl 5 mg
Tá dược vừa đủ 10 ml
(PEG 400, acid boric, natri borat, natri clorid, benzalkonium clorid, natri EDTA, borneol, nước cất).

DẠNG BÀO CHẾ: Thuốc nhỏ mắt.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 1 chai x 10 ml.

DƯỢC LỰC HỌC: Eyelight là dung dịch dùng nhỏ mắt, có chứa Tetrahydrozolin hydroclorid, là chất có tác dụng giao cảm. Eyelight có tác dụng làm co mạch nhanh, bắt đầu xuất hiện trong vòng vài phút và kéo dài, mang lại hiệu quả tốt trong việc chống sung huyết, giảm phù nề kết mạc. Eyelight giúp nhanh chóng làm hết đỏ mắt, làm mát và êm dịu mắt.

DƯỢC ĐỘNG HỌC: Chưa tìm thấy tài liệu.

CHỈ ĐỊNH: Điều trị tình trạng đỏ mắt, sung huyết kết mạc, chứng rát bỏng, ngứa mắt, mỏi mắt. Làm mát mắt. Làm giảm phù kết mạc, sung huyết thứ phát do dị ứng và có các kích thích nhẹ ở mắt, đỏ mắt do bụi, khói, gió, ánh nắng chói, phấn hoa, nước (khi bơi lội)...; do đọc sách, sử dụng vi tính, xem ti-vi nhiều hay do dùng kính sát tròng.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Bệnh nhân tăng nhãn áp.

Khi đang đeo kính sát tròng.

THẬN TRỌNG:

Nên đến bác sĩ khám bệnh trong các trường hợp sau:
Các triệu chứng kích thích hay đỏ mắt không giảm hoặc tăng thêm sau 3 ngày sử dụng Eyelight.

Kích thích mắt hay đỏ mắt do nhiễm khuẩn, vật lạ trong mắt, tổn thương mắt do hoá chất, do chấn thương.

Đau mắt trầm trọng, có đau đầu, thay đổi thị giác nhanh, nhìn đôi, đỏ mắt cấp, đau nhức mắt khi tiếp xúc ánh sáng.

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ: Thận trọng khi sử dụng cho phụ nữ có thai và phụ nữ cho con bú.

LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC: Thuốc không ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc.

TƯƠNG TÁC THUỐC: Không dùng chung với các thuốc IMAO, các thuốc ức chế thần kinh giao cảm.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN: Phản ứng bất lợi thường không phổ biến. Tuy nhiên, không nên dùng thuốc quá nhiều vì có thể làm gia tăng chứng đỏ mắt.

Eyelight
Tetrahydrozolin HCl 5 mg

Trẻ em từ 5 tuổi trở xuống nuốt phải một lượng nhỏ (khoảng 1 - 2 ml) thuốc nhỏ mắt có thể gây các tác dụng không mong muốn nghiêm trọng như: hôn mê, giảm nhịp tim, giảm hô hấp và an thần. Do đó nên để thuốc xa tầm tay của trẻ em. Trường hợp trẻ em nuốt phải thuốc nhỏ mắt, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được điều trị thích hợp.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:

Trường hợp sử dụng quá liều hoặc trẻ em nuốt phải thuốc nhỏ mắt, cần liên hệ ngay với cơ sở y tế để được điều trị thích hợp.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG:

Nhỏ từ 1 đến 2 giọt vào mỗi mắt, dùng 3 - 4 lần/ ngày.

Trẻ em dưới 6 tuổi: cần có ý kiến của bác sĩ.

Hoặc theo chỉ dẫn của Thầy thuốc.

Lưu ý:

- Không sử dụng nếu dung dịch thuốc đổi màu hoặc vẩn đục.
- Không dùng thuốc sau khi mở nắp quá 30 ngày hoặc quá hạn sử dụng.
- Để tránh nhiễm khuẩn hay làm hư thuốc, tránh sờ trên nắp và miệng chai, hoặc để mi mắt chạm vào miệng chai.
- Đậy kỹ nắp sau mỗi lần sử dụng, không dùng chung chai thuốc với người khác.
- Bảo quản chai thuốc trong hộp sau mỗi lần sử dụng.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.

Thuốc này chỉ dùng theo đơn của bác sĩ.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Điều kiện bảo quản:

Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Tiêu chuẩn: TCCS.

Sản xuất bởi: **DHG PHARMA**

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

288 Bis, Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
ĐT: (0292) 3891433 - Fax: (0292) 3895209

Mọi thắc mắc về sản phẩm,
xin vui lòng liên hệ
0292.3899000

E-mail: dhgpharma@dhgpharma.com.vn
www.dhgpharma.com.vn