

Thuốc bán theo đơn. Dịc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Thông báo cho bác sĩ tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.
Để thuốc xa tầm với trẻ em.

FLEET ENEMA FOR CHILDREN

Dung dịch thụt trực tràng cho trẻ em

THÀNH PHẦN:

- Hoạt chất: Monobasic Natri Phosphat (9,5g / 59ml) và Dibasic Natri Phosphat (3,5g / 59ml)
- Tá dược: Nước cất, Dinatri EDTA, Benzalkonium Clorid 50%.

DẠNG BẢO CHÉ:

Dung dịch thụt trực tràng.

MÔ TẢ HÌNH THÚC SẢN PHẨM:

Dung dịch gần như không màu, trong suốt có mùi đặc trưng, không có tạp chất. Dung dịch chứa trong chai nhựa LDPE, có đầu tuýp dài 2 inch (1 inch ~ 2,54 cm) cũng làm bằng nhựa LDPE, bao ngoài là hộp carton.

DÒNG GÓI:

Hộp 1 chai 66 ml.

CHỈ ĐỊNH:

Thuốc được chỉ định để:

- Làm giảm chứng táo bón không thường xuyên
- Làm sạch phân trong ruột cho bệnh nhân trẻ em trước khi phẫu thuật hoặc xét nghiệm trực tràng.
- Chuẩn bị để soi đại tràng sigma.

LIỆU DỤNG VÀ CÁCH DÙNG:

Liều dùng:

Để giảm chứng táo bón không thường xuyên:

Sử dụng mỗi ngày 1 lần:

- Trẻ em, từ 5 đến 11 tuổi: 1 chai hoặc theo chỉ định của bác sĩ.
- Trẻ em từ 2 đến dưới 5 tuổi: $\frac{1}{2}$ chai
- Trẻ em dưới 2 tuổi: không sử dụng.

Để làm sạch phân trong ruột cho bệnh nhân trẻ em trước khi phẫu thuật hoặc xét nghiệm trực tràng:

Sử dụng 1 chai trước khi phẫu thuật hoặc xét nghiệm 3-5 giờ, hoặc theo chỉ định của bác sĩ.

Chuẩn bị để soi đại tràng sigma:

Sử dụng 1 chai trước khi phẫu thuật hoặc xét nghiệm 3-5 giờ, hoặc theo chỉ định của bác sĩ.

Không sử dụng nhiều hơn trừ khi có chỉ định của bác sĩ.

Cách dùng:

Cách dùng $\frac{1}{2}$ chai:

Vặn nắp và đổ ra 2 thìa canh (1 thìa canh ~ 15 ml) dung dịch trong chai bằng thìa định lượng. Đóng nắp lại và sử dụng theo hướng dẫn ghi ở sau chai.

Cách dùng với vị trí nghiêng bên trái:

Để đứa trẻ nằm nghiêng bên trái, đầu gối quay và 2 tay để thoải mái (xem hình ở mặt sau chai thuốc).

Cách dùng với vị trí đầu gối - ngực:

Để đứa trẻ quay, đầu cúi thấp và nhôm mông lên, mặt nghiêng sang phải, tay trái cuộn lại thoải mái dưới bụng (Xem hình ở mặt sau chai thuốc)

BỎ TẨM CHẨN BẢO VỆ MÀU DA CAM Ở TRÊN DẤU NẮP CHAI THUỐC TRƯỚC KHI SỬ DỤNG.

Cách sử dụng thuốc:

- Với một lực đều, nhẹ nhàng đưa đầu ống thật vào trong trực tràng và đẩy vào từ từ, đầu ống hướng vào giữa trực tràng.
- Tuyệt đối không đẩy mạnh đầu ống vào trực tràng do có thể gây tổn thương trực tràng của trẻ.
- Việc đưa ống thuốc vào trực tràng có thể dễ dàng hơn nếu đứa trẻ được đưa thuốc ở tư thế dốc xuống do có sự di chuyển của ruột. Điều này sẽ giúp thư giãn các cơ xung quanh hậu môn.
- Bóp chai thuốc cho đến khi hầu như toàn bộ chất lỏng trong chai đã ra hết. Không cần thiết đẩy sạch hoàn toàn lượng chất lỏng trong chai do chai thuốc luôn chứa lượng thuốc nhiều hơn yêu cầu.
- Rút đầu ống thuốc ra khỏi trực tràng và giữ cho đứa trẻ ở nguyên tư thế cho đến khi có cơn buồn đại tiện (thường khoảng 2-5 phút).



CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không dùng thuốc cho bệnh nhân phi đại ruột kết bẩm sinh, bệnh nhân tắc nghẽn ruột, bệnh nhân không có hậu môn, hoặc bệnh nhân suy tim xung huyết. Sử dụng thận trọng cho bệnh suy thận, bệnh nhân rối loạn điện giải trước đó hoặc bệnh nhân có hậu môn giả, hoặc bệnh nhân đang sử dụng thuốc lợi tiểu hoặc các thuốc khác có ảnh hưởng đến nồng độ các chất điện giải do có thể xảy ra giảm can-xi huyết, tăng phosphat huyết, tăng natri huyết hoặc nhiễm acid.

THÂM TRỌNG VÀ CẢNH BÁO

- Chỉ sử dụng thực trực tràng, không dùng đường uống hoặc các đường khác.
- Không sử dụng cả tất cả lượng dung dịch 2,25 aoxo (66 ml) cho bệnh nhân trẻ em từ 2 đến 5 tuổi, chỉ sử dụng ½ chai (xem mục liều dùng). Không sử dụng cho trẻ em dưới 2 tuổi.
- Bổ sung dịch đường uống được để nghị với tất cả các liều làm sạch phân.
- Sử dụng nhiều hơn 1 chai dung dịch thật trong 24 giờ có thể gây hại. Các sản phẩm gây xổ không nên sử dụng kéo dài hơn 1 tuần trừ khi có chỉ định của bác sĩ.
- Giữ thuốc xa tầm với của trẻ em.
- Nếu nuốt phải thuốc này, cần ngay trợ giúp y tế hoặc liên lạc với trung tâm kiểm soát ngộ độc.
- Hộp carton được gắn chặt để đảm bảo an toàn. Nếu dấu có biểu tượng Fleet trên dấu hoặc dây nắp chai thuốc bị vỡ hoặc mất, không nên sử dụng chai thuốc đó nữa.

Hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thuốc này nếu bệnh nhân:

- Đang trong chế độ ăn kiêng muối nghiêm ngặt
- Có bệnh về thận

Hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng bất cứ thuốc xổ nào nếu bệnh nhân:

- Buồn nôn, nôn hoặc đau bụng.
- Thay đổi thói quen đại tiện bất thường kéo dài hơn 2 tuần.
- Đã sử dụng một thuốc xổ kéo dài hơn 1 tuần.

Ngừng thuốc và hỏi ý kiến bác sĩ nếu bệnh nhân:

- Chảy máu trực tràng
- Không có sự di chuyển khỏi phân sau khi sử dụng thuốc thật Fleet.

Các triệu chứng này có thể chỉ ra một tình trạng bệnh nghiêm trọng. Ngừng sử dụng thuốc và gặp bác sĩ ngay.

TRÍNG TÁC THUỐC:

Không nên sử dụng đồng thời thuốc này với các thuốc khác có chứa natri phosphat bao gồm cả dạng dung dịch uống hoặc dạng viên. Rối loạn điện giải và giảm thể tích máu do các thuốc xổ có thể bị nghiêm trọng hơn do uống không đủ nước, nôn, chán ăn hoặc sử dụng các thuốc lợi tiểu, các thuốc ức chế men chuyển angiotensin, các thuốc chặn thụ thể angiotensin, các thuốc chống viêm không steroid, và các thuốc chứa liti hoặc các thuốc có ảnh hưởng đến nồng độ các chất điện giải, và có thể gây nhiễm acid chuyển hóa, co giật, suy thận, kéo dài thời gian QT và, trong nhiều trường hợp, suy đa tổ chức, loạn nhịp tim/ngưng tim và tử vong.

Do tăng natri huyết liên quan đến nồng độ thấp liti, sử dụng đồng thời Fleet Enema và Liti có thể dẫn đến giảm nồng độ liti và giảm hiệu quả của thuốc.

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ NUÔI CON BÚ

Thuốc này chỉ dùng cho đối tượng trẻ em từ 2-11 tuổi. Hỏi bác sĩ nếu bạn muốn dùng thuốc này khi đang mang thai hoặc nuôi con bú.

TÁC DỤNG PHỤ

Khô đầu chai thuốc qua mạnh có thể gây thủng và/hoặc tổn thương trực tràng.
Xem thêm phần CẢNH BÁO và THẬN TRỌNG khi sử dụng.

QUÁ LIỆU

Trong trường hợp quá liều thuốc hoặc uống nhầm phải dung dịch, cần trợ giúp y tế hoặc liên hệ với trung tâm kiểm soát ngộ độc ngay lập tức.

Quá liều thuốc (dùng hơn 1 chai dung dịch thật trong vòng 24 giờ) hoặc không có tác dụng xổ (không có sự di chuyển khỏi phân sau khi sử dụng thuốc) có thể dẫn đến rối loạn điện giải nghiêm trọng, bao gồm tăng natri máu, tăng phosphat máu, giảm can-xi máu và giảm kali máu cũng như mất nước và giảm thể tích máu đi kèm với các dấu hiệu và triệu chứng của các rối loạn này (như nhiễm acid chuyển hóa, suy thận và co giật). Kéo dài thời gian QT và/hoặc các trường hợp nặng hơn, suy đa tổ chức, loạn nhịp tim/ ngưng tim và tử vong.

Bệnh nhân bị quá liều nên được theo dõi cẩn thận. Điều trị sự mất cân bằng điện giải cần áp dụng ngay lập tức với liệu pháp bù nước và điện giải thích hợp.

HẠN DÙNG

36 tháng kể từ ngày sản xuất

BẢO QUẢN

Tránh đông lạnh, để nơi mát dưới 30°C.

NHÀ SẢN XUẤT

C.B. Fleet Company Inc.
Lynchburg, VA 24502, Mỹ

