



105x78x72



Garvitcom

Hộp 6 vỉ x 10 viên nang mềm

GMP-WHO

Thành phần: Mỗi viên nang mềm chứa:

Dầu gấc..... 250mg
Natri Chondroitin sulfat..... 100mg
Cholin bitartrat..... 25mg
Vitamin B2 (Riboflavin)..... 5 mg
Vitamin E (α- tocopheryl acetat)..... 15IU
Vitamin B1 (Thiamin nitrat)..... 20 mg
Tá dược..... vđ..... 1viên

Chỉ định - chống chỉ định - liều dùng - cách dùng :

Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp.


Bảo quản: Để nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.

Tiêu chuẩn: TCCS



Sản xuất tại
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY
La Khê - Hà Đông - Hà Nội

Nhà đăng ký và phân phối bởi:
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM USAPHA
Tổ 3, TTbệnh viện nội tiết, P.Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
Tel/fax: 04.39941016 * Website: usapha@usapha.com.vn



Garvitcom

Box of 6 blisters x 10 soft capsuls

GMP-WHO



Compositions: Each softgel contains:

Momordica Oil..... 250mg
Sodium Chondroitin sulfate..... 100mg
Choline bitartrate..... 25mg
Riboflavin (Vitamin B2)..... 5 mg
α- tocopheryl acetate (Vitamin E)..... 15IU
Thiamine nitrate (Vitamin B1)..... 20 mg
Excipient q.s..... 1 softgel

Indications, Contraindications, Dosage -

Administration :

See the package insert inside.

Storage: Store in dry place, below 30°C

Specifications: Manufacturer's.

SDK/Reg.No :

Số lô SX /Lot. No :

NSX/Mfg.Date :

HD /Exp. Date :

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
CAREFULLY READ THE ACCOMPANYING
INSTRUCTIONS BEFORE USE.

Hướng dẫn sử dụng thuốc

GARVITCOM

- **Dạng thuốc:** Viên nang mềm.
- **Qui cách đóng gói:** Hộp 6 vỉ x 10 viên nang mềm.
- **Thành phần:** Mỗi viên nang mềm chứa:

Natri chondroitin sulfat	100mg	Cholin bitartrat	25mg
Vitamin B ₁ (Thiamin nitrat)	20mg	Vitamin B ₂ (Riboflavin)	5mg
Dầu gấc	250mg	Vitamin E(α-Tocopheryl acetat)	15mg
Tá dược vđ	1 viên		

(Tá dược gồm: (Lecithin, dầu đậu nành, dầu cọ, sáp ong trắng, gelatin, glycerin, dung dịch sorbitol 70%, nipagin, nipasol, ethyl vanilin, phẩm màu Chlorophyll E 140).

- **Chỉ định:** Hỗ trợ điều trị các trường hợp:
 - Nhức mắt, viêm giác mạc, đau nhức mắt.
 - Giảm thị lực trong thời kỳ cho con bú.
 - Chứng quáng gà.
 - Suy yếu thị lực (nhìn mờ, nhìn kém...).

- **Cách dùng và liều dùng:**

Liều thông thường cho người lớn: Uống 1 viên/ lần x 2 lần/ngày.

- **Chống chỉ định:** Quá mẫn với một trong các thành phần của thuốc. Không dùng chung với các thuốc có chứa vitamin A

- **Thận trọng:** Không dùng thuốc quá liều chỉ định. Không nên lạm dụng sử dụng thuốc trong quá trình điều trị.

- **Tác dụng không mong muốn của thuốc:** Thuốc có thể gây nôn, buồn nôn, ỉa chảy

* **Ghi chú:** " Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc".

- **Tương tác với thuốc khác, các dạng tương tác khác:**

Rượu có thể gây cản trở hấp thu riboflavin ở ruột. Probenecid sử dụng cùng riboflavin gây giảm hấp thu riboflavin ở dạ dày, ruột.

- **Quá liều và cách xử trí:** Chưa có báo cáo.

- **Hạn dùng:** 36 tháng tính từ ngày sản xuất. Không dùng thuốc đã quá hạn sử dụng.

* **Lưu ý:** Khi thấy nang thuốc bị ẩm mốc, dính nang, nhãn thuốc in số lô SX, HD mờ...hay có các biểu hiện nghi ngờ khác phải đem thuốc tới hỏi lại nơi bán hoặc nơi sản xuất theo địa chỉ trong đơn.

- **Bảo quản:** Để nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.

- **Tiêu chuẩn áp dụng:** TCCS.

Để xa tầm tay trẻ em
"Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ"

THUỐC SẢN XUẤT TẠI:
CÔNG TY C.P DƯỢC PHẨM HÀ TÂY
La Khê - Hà Đông- TP. Hà Nội
ĐT: 04.33522203-33516101. FAX: 04.33522203
CÔNG TY C.P DƯỢC PHẨM HÀ TÂY



PHÓ GIÁM ĐỐC

DS. Nguyễn Bá Lai



TỜ THÔNG TIN CHO BỆNH NHÂN

(PIL)

- Tên sản phẩm:** GARVITCOM
- Mô tả sản phẩm:** Viên nang mềm, hình elip, màu xanh. Viên khô cầm không dính tay, bên trong chứa hỗn hợp thuốc màu đỏ.
- Thành phần của thuốc:** Natri chondroitin sulfat, cholin bitartrat, vitamin B₁ (Thiamin nitrat), vitamin B₂ (Riboflavin), dầu gấc, vitamin E (α -Tocopheryl acetat).
- Hàm lượng của thuốc:** Mỗi viên nang mềm chứa:

Natri chondroitin sulfat	100mg	Cholin bitartrat	25mg
Vitamin B ₁ (Thiamin nitrat)	20mg	Vitamin B ₂ (Riboflavin)	5mg
Dầu gấc	250mg	Vitamin E(α -Tocopheryl acetat)	15IU
Tá dược vđ	1 viên		
- Thuốc dùng cho bệnh gì?:** Hỗ trợ điều trị các trường hợp:
 - Nhức mắt, viêm giác mạc, đau nhức mắt.
 - Giảm thị lực trong thời kỳ cho con bú.
 - Chứng quáng gà.
 - Suy yếu thị lực (nhìn mờ, nhìn kém...).
- Nên dùng thuốc này như thế nào và liều lượng?:**

Liều thông thường cho người lớn: Uống 1 viên/ lần x 2 lần/ngày.
- Khi nào không nên dùng thuốc này?** Quá mẫn với một trong các thành phần của thuốc.
. Không dùng chung với các thuốc có chứa vitamin A
- Tác dụng không mong muốn:** Thuốc có thể gây nôn, buồn nôn, ỉa chảy
- Nên tránh dùng những thuốc hoặc thực phẩm gì khi đang sử dụng thuốc này?**

Rượu có thể gây cản trở hấp thu riboflavin ở ruột. Probenecid sử dụng cùng riboflavin gây giảm hấp thu riboflavin ở dạ dày, ruột.
- Cần làm gì khi một lần quên không dùng thuốc?** Nên tiếp tục uống thuốc theo liều lượng đã hướng dẫn trong tờ thông tin cho bệnh nhân.
- Cần bảo quản thuốc này như thế nào?** Để nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.
- Những dấu hiệu và triệu chứng khi dùng thuốc quá liều?** Chưa có báo cáo.
- Cần phải làm gì khi dùng thuốc quá liều khuyến cáo?** Chưa có báo cáo.
- Tên của nhà sản xuất và chủ sở hữu giấy phép đăng ký sản phẩm:** CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY.
- Những điều cần trọng khi dùng thuốc này:** Không dùng thuốc quá liều chỉ định. Không nên lạm dụng sử dụng thuốc trong quá trình điều trị.
- Khi nào cần tham vấn bác sỹ:**
 - Khi cần thêm thông tin về thuốc.
 - Khi thấy những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.
 - Khi dùng thuốc mà thấy triệu chứng của bệnh không thuyên giảm.
- Ngày xem xét sửa đổi lại tờ thông tin cho bệnh nhân:** 20/05/2011

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY



PHÓ GIÁM ĐỐC

ĐS. Nguyễn Bá Lai