

# Mẫu tờ hướng dẫn sử dụng



Tờ hướng dẫn sử dụng

## GELACMEIGEL

Metronidazol 1%  
Gel bôi da

**CÔNG THỨC:** Mỗi tuýp thuốc 15 gam có chứa:

Metronidazol.....0,15g

Tá dược: Carbomers, Propylen glycol, Triethanolamin, Isopropyl alcohol, Methylparaben, Nước cất vừa đủ...15 g

**CHỈ ĐỊNH:**

Điều trị mụn mủ viêm, các bệnh nhiễm khuẩn ngoài da do vi khuẩn kỵ khí, giúp mau lành vết loét, vết bỏng.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH:**

Bệnh nhân mẫn cảm với dẫn chất Nitro Imidazol hoặc các thành phần của thuốc.

**LIỀU DÙNG- CÁCH DÙNG:**

Sau khi rửa sạch và làm khô vùng bị tổn thương, bôi một lớp mỏng thuốc 1- 2 lần / ngày , dùng trong 8 tuần.

**THẬN TRỌNG:**

Chỉ bôi ngoài da, tránh để thuốc dính vào mắt. Nếu có tình trạng kích ứng hay nhạy cảm, ngưng điều trị hỏi ý kiến Bác sĩ.

**TƯƠNG TÁC THUỐC:**

Metronidazol phối hợp với Spiramicin hoặc các kháng sinh khác (Neomycin; Kanamycin) đặc biệt Beta lactam để chống lại các vi khuẩn ái khí, kỵ khí.

**PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:**

Cần thận trọng, chỉ nên dùng thuốc khi có sự chỉ dẫn của bác sĩ.

**TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:**

Có thể gặp mẫn ngứa, ban đỏ, kích ứng. Nếu xảy ra bệnh nhân có thể giảm số lần bôi hoặc ngưng dùng thuốc và hỏi ý kiến của thầy thuốc.

**Thông báo cho Bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc**

**QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:**

Triệu chứng : Kích ứng tại chỗ, đỏ da, nóng rát.

Điều trị: Ngưng dùng thuốc.

**LỜI KHUYẾN CÁO:**

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sỹ.

Để xa tầm tay của trẻ em.

**ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN:**

Nơi khô thoáng, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

**QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:** Tuýp 15 gam, hộp 1 tuýp.

**HẠN DÙNG:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Không dùng thuốc quá 30 ngày kể từ khi mở nắp tuýp thuốc.



CTCP DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPHARCO-TENAMYD  
8 Nguyễn Trường Tộ - Tp Huế - Việt Nam  
ĐT: 054 3823099 - 3827215 Fax: 054 3826077

Huế, ngày 23 tháng 05 năm 2011



TỔNG GIÁM ĐỐC

TS. Phạm Thị Bình