

MẪU HỘP GIẢI CẢM LIÊN NGÂN
KT: 105 x 85 x 65 mm



Tờ hướng dẫn sử dụng
Viên nang GIẢI CẢM LIÊN NGÂN

Trình bày: Hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng + HDSD.

Công thức cho 1 viên nang cứng:

Cát cánh (Radix Platycodi)	0,27g (tương đương 190mg bột mịn)
Kim ngân hoa (Flos Loniceae)	0,45g (tương đương 270mg bột mịn)
Cam thảo (Radix Glucyrrhizae)	0,23g (tương đương 15mg cao khô)
Kinh giới (Herba Schizonepetae)	0,20g (tương đương 11mg cao khô)
Ngưu bàng tử (Fructus Arctii)	0,30g (tương đương 11mg cao khô)
Liên kiều (Fructus Forsythiae)	0,45g (tương đương 22mg cao khô)
Đạm trúc điệp (Herba Lophatheri)	0,30g (tương đương 15mg cao khô)
Tinh dầu Bạc hà (Oleum Menthae)	0,002g
Tá dược (Magnesistearat)	vừa đủ 1 viên

Chỉ định :

Điều trị các trường hợp cảm cúm, hắt hơi, sổ mũi, nhức đầu, sốt cao bất rút; Ho, miệng khô, họng sưng đau.

Liều dùng - Cách dùng:

Người lớn: Mỗi lần uống 2- 3 viên, uống 3 lần/ngày.

Trẻ em: uống 1 viên/lần, uống 2 - 3 lần /ngày .

Chống chỉ định:

Người thể hàn, tỳ vị hư hàn, tiêu chảy.

Trẻ em dưới 30 tháng tuổi , trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao.

Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú:

Sử dụng được cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú.

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc:

Người lái xe hoặc vận hành máy đều sử dụng được không gây ảnh hưởng gì.

Tác dụng không mong muốn của thuốc:

Chưa có báo cáo.

Thông báo với bác sĩ các tác dụng không muốn gặp phải của thuốc

Quá liều và xử trí:

Chưa có báo cáo.

Bảo quản: Nơi khô thoáng, nhiệt độ dưới 30⁰C, tránh ánh sáng.

Tiêu chuẩn: TCCS.

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

ĐỀ XA TÂM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Sản xuất tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEDISUN

Địa chỉ: Số 521- An Lợi- Hòa Lợi- Bến Cát- Bình Dương

Tel: 0650.3589036; Fax :0650.3589297; Email: medisun.medisun@gmail.com

Theo hợp đồng gia công với:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG DƯỢC Á CHÂU

Địa chỉ: Do Lộ - Yên Nghĩa - Hà Đông - Hà Nội.



GIÁM ĐỐC

Ds: Phạm Phan Thanh Vân

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Việt Hùng

