

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 08/12/2014

MẪU NHÃN SẢN PHẨM

1. Mẫu nhãn hộp



■ **Thành phần:** Mỗi viên nang mềm có chứa:
Cao khô lá Bạch quả (*Extractum Folium Ginkgo biloba siccus*)40mg
Tá dược vđ.....1 viên nang mềm

■ **Bảo quản:** Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

■ **Tiêu chuẩn:** TCCS

Để xa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

SĐK (Reg.No):
Số lô sx (Lot No):
Ngày sản xuất (Mfg Date):
HĐ (Exp Date):

2. Mẫu màng vỉ



MẪU NHÃN SẢN PHẨM

1. Mẫu nhãn hộp



GINKGO Biloba
Cao khô lá Bạch quả.....40mg
(*Extractum Follum Ginkgo biloba siccus*)

Hộp 10 vỉ x 10 viên nang mềm



GINKGO Biloba
Viên nang mềm
GINKGO Biloba
Cao khô lá Bạch quả.....40mg
(*Extractum Follum Ginkgo biloba siccus*)

Thành phần:
Mỗi viên nang mềm có chứa:
Cao khô lá Bạch quả
(*Extractum Follum Ginkgo biloba siccus*)
Tá được vđ..... 1 viên nang mềm

Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C;
tránh ánh sáng

Tiêu chuẩn: TQCS

SPK (Reg No):
Số lô sx (Lot No):
Ngày sx (Mfg Date):
HD (Exp Date):

Sản xuất tại:
CÔNG TY CP DƯỢC VYT Hải Dương
102 Chi Lăng - P. Nguyễn Trãi - TP Hải Dương -
Tỉnh Hải Dương, DT/Fax: 0320.3853.848



2. Mẫu màng vỉ



GINKGO Biloba
SoftCap
GINKGO Biloba
Cao khô lá Bạch quả.....40mg
(*Extractum Follum Ginkgo biloba siccus*)

Box of 10 Blisters of 10 SoftCaps



GINKGO Biloba
Viên nang mềm
GINKGO Biloba
Cao khô lá Bạch quả.....40mg
(*Extractum Follum Ginkgo biloba siccus*)

Chỉ định

- Thiếu năng tuần hoàn não: Suy giảm trí nhớ, rối loạn tập trung, tâm trạng trầm cảm, chóng mặt, ù tai, nhức đầu.
- Rối loạn tuần hoàn ngoại biên: Hội chứng Raynaud, chứng đi chân vịt, chứng xanh tím đầu chi, hội chứng sau viêm tĩnh mạch.
- Rối loạn hệ thống thần kinh ốc tai.
- Chóng chĩ định.
- Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.
- Phụ nữ có thai và cho con bú. Trẻ em dưới 12 tuổi.
- Bệnh nhân đang xuất huyết hoặc đang bị một máu pha cấp.

Liều dùng - cách dùng

- Người lớn: Uống mỗi lần 2 viên, ngày 2 lần.
- Trẻ em trên 12 tuổi: Uống mỗi lần 1 viên, ngày 2 lần.

Dùng sau ăn, nuốt cả viên không nhai.

Thời gian sử dụng từ 4 - 12 tuần. Riêng với bệnh nhân chân đi khớp kiêng cách hỏi, là làm đầu chi thời gian sử dụng có thể kéo dài tới 24 tuần. Hoặc dùng theo chỉ dẫn của thầy thuốc.

Để xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GINKGOBILOBA

Dạng bào chế: Viên nang mềm

Thành phần: Mỗi viên nang mềm chứa:

Cao khô lá Bạch quả (*Extractum Folium Ginkgo biloba siccus*) 40 mg

Tá dược: (Dầu nành, dầu cọ, sáp ong, lecithin, Gelatin, Glycerin, Nipagin, Nipasol, Dung dịch Sorbitol 70%, Ethyl vanilin, màu green S.....vd 1 viên.).

Chỉ định

- Thiếu năng tuần hoàn não: Suy giảm trí nhớ, rối loạn tập trung, tâm trạng trầm cảm, chóng mặt, ù tai, nhức đầu.
- Rối loạn tuần hoàn ngoại biên: Hội chứng Raynaud, chứng đi cách hồi, chứng xanh tím đầu chi, hội chứng sau viêm tĩnh mạch.
- Rối loạn hệ thống tiền đình ốc tai.

Chống chỉ định:

- Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.
- Phụ nữ có thai và cho con bú. Trẻ em dưới 12 tuổi.
- Bệnh nhân đang xuất huyết hoặc đang bị nhồi máu pha cấp

Thận trọng

- Thận trọng khi sử dụng cho bệnh nhân rối loạn đông máu hoặc đang dùng thuốc chống đông máu.
- Không dùng thay thế thuốc điều trị tăng huyết áp, không dùng đồng thời với các vị thuốc có tác dụng chi huyết.

Liều dùng - cách dùng

- Người lớn : Uống mỗi lần 2 viên, ngày 2 lần.
- Trẻ em trên 12 tuổi: Uống mỗi lần 1 viên, ngày 2 lần

Dùng sau ăn, nuốt cả viên không nhai.

Thời gian sử dụng từ 4-12 tuần. Riêng với bệnh nhân chân đi khắp khiêng cách hồi, tê lạnh đầu chi thời gian sử dụng có thể kéo dài tới 24 tuần. Hoặc dùng theo chỉ dẫn của thầy thuốc

Tác dụng không mong muốn

Thường nhẹ và hiếm gặp như: Rối loạn tiêu hóa, nhức đầu, dị ứng da, có thể kéo dài thời gian đông máu. Các hiện tượng này sẽ mất đi khi dùng uống thuốc.



[Handwritten signature]

"Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc".

Tương tác thuốc:

Không dùng cùng thuốc cầm máu, thuốc chống đông, thuốc kháng tiểu cầu.

Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú:

Không dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú..

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc

Thuốc dùng được cho người lái xe hoặc đang vận hành máy móc.

Quá liều và xử trí:

Chưa có báo cáo sử dụng thuốc quá liều.

Không dùng quá liều chỉ định .

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Bảo quản: Để nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30⁰C, tránh ánh sáng.

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS

Trình bày: Vi 10 viên; Hộp 3 vi, 10 vi kèm hướng dẫn sử dụng.

Chú ý: - Không dùng quá liều chỉ định.

- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

- Để xa tầm tay trẻ em. Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến Bác sỹ.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VITYT HẢI DƯƠNG

102 Chi Lăng, Phường Nguyễn Trãi- TP Hải Dương-Tỉnh Hải Dương

ĐT/Fax : 0320.3853.848



PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Việt Hùng



[Handwritten signature]