

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC- XIN ĐỌC KỸ TRƯỚC KHI DÙNG

DUNG DỊCH TIÊM
Rx **GLUCOSE 30%**
(THUỐC BÁN THEO ĐƠN)

Thành phần : Cho ống 5 ml

- Glucose khan.....	1,5 g
- Nước cất pha tiêm vừa đủ.....	5 ml

Được lực học:

- Glucose là đường đơn 6 carbon, dùng theo đường tiêm tĩnh mạch để điều trị thiếu hụt đường và dịch.
- Glucose được dùng để cung cấp năng lượng theo đường tiêm cho người bệnh và dùng cùng với các dung dịch điện giải để phòng và điều trị mất nước do ra chảy cấp. Glucose còn được sử dụng để điều trị chứng hạ đường huyết. Các dung dịch glucose còn được sử dụng làm chất vận chuyển các thuốc khác.
- Nuôi dưỡng đường tĩnh mạch có thể thực hiện qua tĩnh mạch ngoại vi hoặc tĩnh mạch trung tâm lớn hơn. Chỉ định dùng qua đường tĩnh mạch ngoại vi khi chỉ cần nuôi dưỡng người bệnh trong một thời gian ngắn hoặc khi bổ trợ thêm cho nuôi dưỡng theo đường tiêu hóa hoặc khi người bệnh có nhiều nguy cơ tai biến nếu truyền qua đường tĩnh mạch trung tâm. Phải truyền các dung dịch glucose ưu trương cho người bệnh suy dinh dưỡng hoặc có tăng chuyển hóa, theo đường tĩnh mạch trung tâm, vì ở đó dung dịch glucose được pha loãng nhanh hơn.

Được động học:

- Glucose chuyển hóa thành carbon dioxide và nước đồng thời giải phóng ra năng lượng.

Chỉ định : Dùng trong các trường hợp :

- Thiếu hụt carbohydrate.
- Hạ đường huyết do suy dinh dưỡng, do ngộ độc rượu, do tăng chuyển hóa khi bị stress hay chấn thương.

Liều lượng - Cách dùng :

- Tiêm tĩnh mạch theo sự chỉ dẫn của thầy thuốc với tốc độ trung bình 3 - 5ml/phút.
- Liều glucose tối đa khuyến dùng là 500 - 800 mg cho 1 kg thể trọng trong 1 giờ.
- Liều dùng thay đổi tùy theo nhu cầu của từng người bệnh.
- Phải theo dõi chặt chẽ đường huyết của người bệnh.

Chống chỉ định :

- Người bệnh không dung nạp được glucose.
- Mất nước nặng trong nếu chưa bù đủ các chất điện giải.
- ứ nước.
- Kali huyết hạ.
- Hôn mê tăng thẩm thấu.
- Mê sảng rượu kèm mất nước, ngộ độc rượu cấp.
- Người bệnh vô niệu, người bị chảy máu trong sọ hoặc tủy sống.
- Không được tiêm bắp thịt hay tiêm dưới da.
- Không được dùng glucose cho người bệnh sau cơn tai biến mạch não.



Thận trọng :

- Phải theo dõi đều đặn đường huyết, cân bằng nước và các chất điện giải. Cần bổ sung các chất điện giải nếu cần.
- Không truyền dung dịch glucose cùng với máu qua một bộ dây truyền vì có thể gây tan huyết và tắc nghẽn.
- Truyền glucose vào tĩnh mạch có thể dẫn đến rối loạn dịch và điện giải như hạ kali huyết, hạ magiesi huyết, hạ phospho huyết.
- Truyền lâu hoặc truyền nhanh một lượng lớn dung dịch glucose đẳng trương có thể gây phù hoặc ngộ độc nước.
- Truyền kéo dài hoặc nhanh một lượng lớn dung dịch glucose ưu trương có thể gây mất nước tế bào do tăng đường huyết.

Thời kỳ mang thai và cho con bú: Dùng được cho người mang thai và cho con bú.

Tác dụng không mong muốn của thuốc :

- * Thường gặp : ADR > 1/100
- Đau tại chỗ tiêm.
- Kích ứng tĩnh mạch, viêm tắc tĩnh mạch.
- * Ít gặp : 1/1000 < ADR < 1/100
- Rối loạn nước và điện giải (hạ kali huyết, hạ magiesi huyết, hạ phospho huyết).
- * Hiếm gặp: ADR < 1/1000
- Phù hoặc ngộ độc nước (do truyền kéo dài hoặc truyền nhanh một lượng lớn dung dịch đẳng trương)
- Mất nước do hậu quả của đường huyết cao (khi truyền kéo dài hoặc quá nhanh các dung dịch ưu trương)

Thông báo cho Bác sĩ các tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Tương kỵ:
 Trước khi pha thêm bất kỳ một thuốc gì vào dung dịch glucose để truyền phải kiểm tra xem có phù hợp hay không.
 Dung dịch chứa glucose và có pH < 6 có thể gây kết tủa indomethacin.

Khuyến cáo :

- Không được dùng thuốc quá hạn có ghi trên bao bì, hoặc thuốc có nghi ngờ về chất lượng như tủa, vệt lạ, cặn bẩn xơ bông...
- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần biết thêm thông tin, xin hãy hỏi ý kiến của Bác sĩ hoặc Dược sĩ.

Trình bày và bảo quản :

- Thuốc đóng trong ống thủy tinh 5ml. Hộp 50 ống có kèm tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.
- Để thuốc nơi khô, thoáng, nhiệt độ không quá 25°C, tránh ánh sáng. **ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM.**
- Hạn dùng : 36 tháng kể từ ngày sản xuất

Tiêu chuẩn áp dụng : ĐOVN IV

Thuốc được sản xuất tại:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
 253 - Đường Sĩ Thanh Khê - TP Đà Nẵng
 Tel: 0511.3760130 Fax: 0511.3760127 Email: info@danapha.com
 Điện thoại tư vấn : 0511.3760131
 Và phân phối trên toàn quốc

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 7 năm 2011

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA

ĐS. Nguyễn Quang Trí, MBA