

Nhãn hộp

BỘ Y TẾ  
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC  
ĐÃ PHÊ DUYỆT  
Lần đầu: 5 / 9 / 2016

*Handwritten signature*



Box of 10 blisters x 10 capsules

# Glusamin 250

Each capsule contains  
Glucosamine ..... 250mg



# Glusamin 250

Số lô SX / Lot : ABMMYY  
Ngày SX / Mfg. : Ngày / Tháng / Năm  
HD / Exp. : Ngày / Tháng / Năm

# Glusamin 250



8 936014 583944

COMPOSITION - Each capsule contains  
Glucosamine sulfate sodium chloride e.q. to  
Glucosamine 250mg

INDICATIONS, CONTRAINDICATIONS,  
DOSAGE, ADMINISTRATION AND  
OTHER INFORMATION - Read the leaflet inside.

STORAGE - In a dry, cool place (below 30°C).  
Protect from light.

SPECIFICATION - In-house.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN  
READ THE LEAFLET CAREFULLY  
BEFORE USING



# Glusamin 250

SDK / VISA: XX - XXXX - XX



Hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng

# Glusamin 250

Mỗi viên nang cứng chứa  
Glucosamin ..... 250mg



# Glusamin 250

CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO  
166-170 Nguyễn Huệ, Tuy Hòa,  
Phù Yên, Việt Nam

THÀNH PHẦN - Mỗi viên nang cứng chứa  
Glucosamin sulfat natri clorid tương đương  
Glucosamin 250mg

CHỈ ĐỊNH, CHỐNG CHỈ ĐỊNH, LIỀU DÙNG,  
CÁCH DÙNG VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC  
Xem tờ hướng dẫn sử dụng.

BẢO QUẢN - Nơi khô, mát (dưới 30°C).  
Tránh ánh sáng.

TIÊU CHUẨN - TCCS.

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM  
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG



HUYỀN TẤN NAM  
TỔNG GIÁM ĐỐC

Nhãn vỉ

*Handwritten signature*

|                                                              |                                                              |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Glusamin 250</b><br>Glucosamin 250mg<br>CTY CP PYMEPHARCO | <b>Glusamin 250</b><br>Glucosamin 250mg<br>CTY CP PYMEPHARCO |
| <b>Glusamin 250</b><br>Glucosamin 250mg<br>CTY CP PYMEPHARCO | <b>Glusamin 250</b><br>Glucosamin 250mg<br>CTY CP PYMEPHARCO |
| <b>Glusamin 250</b><br>Glucosamin 250mg<br>CTY CP PYMEPHARCO | <b>Glusamin 250</b><br>Glucosamin 250mg<br>CTY CP PYMEPHARCO |
| <b>Glusamin 250</b><br>Glucosamin 250mg<br>CTY CP PYMEPHARCO | <b>Glusamin 250</b><br>Glucosamin 250mg<br>CTY CP PYMEPHARCO |
| <b>Glusamin 250</b><br>Glucosamin 250mg<br>CTY CP PYMEPHARCO | <b>Glusamin 250</b><br>Glucosamin 250mg<br>CTY CP PYMEPHARCO |

Số lô SX: ABMMYY    HD: Ngày / Tháng / Năm



HUYỀN TẤN NAM  
TỔNG GIÁM ĐỐC

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Để xa tầm tay của trẻ em.  
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ

GLUSAMIN 250  
(Glucosamin 250mg)

**THÀNH PHẦN:** Mỗi viên nang cứng chứa  
Glucosamin sulfat natri clorid 400 mg  
tương đương Glucosamin 250 mg  
Tá dược: Magnesi stearat.

**DƯỢC LỰC HỌC**

Glucosamin có vai trò kích thích và duy trì bền vững cấu trúc và chức năng của sụn trong các khớp của cơ thể, làm giảm đau xương khớp, cải thiện chức năng sụn. Glucosamin cũng có tác dụng kháng viêm.  
Chức năng chính của glucosamin là tham gia vào quá trình tổng hợp thành phần sụn khớp. Kích thích tế bào ở sụn tổng hợp các proteoglycan, là thành phần cơ bản cấu tạo nên các sụn ở đầu xương tại khớp. Glucosamin ức chế một số enzym gây phá hủy sụn khớp, giảm các gốc tự do gây tác hại đến tế bào sinh sụn. Ngoài ra glucosamin còn kích thích sinh mô liên kết của xương, giảm triệu chứng mất calci ở xương, làm tăng sản sinh chất nhầy ở dịch khớp.

**DƯỢC ĐỘNG HỌC**

Các thông số dược động học của glucosamin được xác định chủ yếu ở các nghiên cứu trên động vật. Khoảng 90% liều uống glucosamin được hấp thu qua hệ tiêu hóa, từ đó thuốc được vận chuyển vào hệ tuần hoàn và đến gan. Sinh khả dụng của thuốc thấp do chuyển hóa mạnh qua gan lần đầu. Không thấy dạng glucosamin tự do trong huyết thanh sau khi uống.  
Glucosamin liên kết khá chặt chẽ với protein huyết tương chủ yếu là globulin. Thể tích phân phối: 2,5L. Khoảng 11% liều uống được thải trừ qua phân. Thời gian bán thải khoảng 68 giờ.

**CHỈ ĐỊNH**

Giảm triệu chứng của thoái hóa khớp gối nhẹ và trung bình.

**LIỀU DÙNG VÀ CÁCH SỬ DỤNG**

Dùng cho người trên 18 tuổi: Uống 6 viên/ngày (các dạng muối của glucosamin được quy đổi tương ứng với glucosamin), chia 3 lần.  
Có thể dùng đơn độc glucosamin sulfat hoặc phối hợp với thuốc khác như chondroitin 1200mg/ngày.  
Thời gian dùng thuốc tùy theo cá nhân, ít nhất dùng liên tục trong 2 – 3 tháng để đảm bảo hiệu quả điều trị.

**THẬN TRỌNG**

Thận trọng sử dụng thuốc ở bệnh nhân bị tiểu đường, cần kiểm tra thường xuyên đường huyết ở những bệnh nhân này khi sử dụng glucosamin.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH**

Phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú, trẻ em, trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi do chưa có số liệu về độ an toàn và hiệu quả điều trị.

**TƯƠNG TÁC THUỐC**

Thận trọng khi dùng đồng thời glucosamin với thuốc trị tiểu đường, do có thể làm giảm tác dụng của thuốc trị tiểu đường.

**PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ**

Chống chỉ định.

**TÁC ĐỘNG CỦA THUỐC LÊN LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC**

Không ảnh hưởng.

**TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN**

Rất hiếm khi bị rối loạn đường tiêu hóa như ợ nóng, khó chịu vùng thượng vị.  
Thông báo cho thấy thuốc tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

**QUÁ LIỀU VÀ XỬ TRÍ**

Chưa có các nghiên cứu đầy đủ.

**HẠN DÙNG** 36 tháng kể từ ngày sản xuất  
**BẢO QUẢN** Bảo quản nơi khô mát, tránh ánh sáng.  
**TIÊU CHUẨN** TCCS  
**TRÌNH BÀY** Hộp 10 vỉ x 10 viên.

CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO  
166-170 Nguyễn Huệ, Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam

HUỲNH TẤN NAM  
TỔNG GIÁM ĐỐC