



PHÚC HƯNG

P/H

■ THÀNH PHẦN (cho 1 viên):

Bột Bán hạ chế 39 mg
Bột Xuyên bối mẫu 25 mg
Bột Trần bì 20 mg
Bột Ngủ vị tử 20 mg
Cao đặc được liệu tương ứng với: 91 mg
Tỳ bà diệp 160 mg
Ma hoàng 100 mg
Hạnh nhân đắng 100 mg
Cam thảo 80 mg
Can khương 30 mg
Tế tân 11 mg
Tá được vớ 1 viên

■ BẢO QUẢN:
Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.

■ Tiêu chuẩn: TCCS.

SPK:

Số lô SX:
Ngày SX:
HD :

THUỐC HEN P/H

Hộp 1 lọ x 480 viên hoàn cứng

THUỐC HEN P/H

■ CHỈ ĐỊNH
Điều trị các thể hen phế quản có biểu hiện ho, khó thở, tức ngực, đờm nhiều, Phòng chống cơn hen tái phát.

■ CÁCH DÙNG & LIỀU DÙNG - CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp.

SDK:
Số lô SX:
Ngày SX:
HD :

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Để xa tầm tay trẻ em.

CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC HƯNG

LỘ 480 VIÊN HOÀN CỨNG

■ CHỈ ĐỊNH:
Điều trị các thể hen phế quản có biểu hiện ho, khó thở, tức ngực, đờm nhiều. Phòng chống cơn hen tái phát.

■ CÁCH DÙNG & LIỀU DÙNG:
Liều dùng: Ngày uống 3 lần sau bữa ăn:
Trẻ dưới 6 tuổi, mỗi lần 5-10 viên.
Trẻ từ 6-14 tuổi, mỗi lần 15-20 viên.
Trẻ từ 14 tuổi trở lên và người lớn, mỗi lần 20-25 viên.
Đợt điều trị 8-10 tuần.

■ CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Để xa tầm tay trẻ em.

CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC HƯNG
Trụ sở: số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
Nhà máy: Cụm công nghiệp Thanh Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội
ĐT: 04.33826222 * Fax: 04.33978024

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 15/12/2015

THUỐC HEN P/H

Hộp 1 lọ x 480 viên hoàn cứng

382/ATSS

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

THUỐC HEN P/H

Thành phần: (cho 1 viên)

Bột Bán hạ chế (<i>Pulveres rhizomae typhonii trilobati</i>)	: 39mg
Bột Xuyên bối mẫu (<i>Pulveres bulbi fritillariae</i>)	: 25mg
Bột Trần bì (<i>Pulveres pericarpii citri reticulatae</i>)	: 20mg
Bột Ngũ vị tử (<i>Pulveres fructi schisandrae</i>)	: 20mg
Cao đặc dược liệu (<i>Extractum</i>)	: 91mg
Tương đương với:	
Tỳ bà diệp (<i>Folium eriobotryae</i>)	: 160mg
Ma hoàng (<i>Herba ephedrae</i>)	: 100mg
Hạnh nhân đắng (<i>Semen armeniacae amarum</i>)	: 100mg
Cam thảo (<i>Radix glycyrrhizae</i>)	: 80mg
Cần khương (<i>Rhizoma zingiberis</i>)	: 30mg
Tế tân (<i>Rhizoma Asari</i>)	: 11mg
Tá dược (croscarmellose sodium, than hoạt tính, sáp ong trắng, mật ong)	vừa đủ 1 viên



Dạng bào chế: Viên hoàn cứng.

Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 480 viên.

Chỉ định: Điều trị các thể hen phế quản có biểu hiện ho, khó thở, tức ngực, đờm nhiều. Phòng chống cơn hen tái phát.

Cách dùng & liều dùng:

- Liều dùng: Ngày uống 3 lần sau bữa ăn.
Trẻ dưới 6 tuổi, mỗi lần 5 - 10 viên.
Trẻ từ 6 - 14 tuổi, mỗi lần 15 - 20 viên.
Trẻ từ 14 tuổi trở lên và người lớn, mỗi lần 20 - 25 viên.
Đợt điều trị 8 - 10 tuần.
- Sau khi kết thúc đợt điều trị, cơn hen nhẹ, thưa dần. Bệnh nhân cần điều trị thêm 3 - 4 đợt nữa, mỗi đợt cách nhau 1 tuần để phòng tránh cơn hen tái phát.
- Khi lên cơn hen, ngoài việc dùng Thuốc hen P/H, có thể phối hợp với các phương pháp chữa của y học hiện đại để làm hết cơn.

Tác dụng phụ:

Cho đến nay, vẫn chưa có tài liệu nào báo cáo về tác dụng không mong muốn của thuốc. Nếu thấy có bất kỳ tác dụng phụ nào trong quá trình dùng thuốc, cần thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ về những tác dụng không mong muốn này.

Chống chỉ định: Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao. Người bệnh tăng huyết áp, tự hãm.

Thận trọng: Thận trọng khi dùng thuốc cho người bệnh suy tim, đau thắt ngực, phụ nữ có thai và cho con bú.

Dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Thuốc chống chỉ định cho trẻ em dưới 30 tháng tuổi nên cẩn thận trọng khi dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú để đảm bảo an toàn cho thai nhi và cho trẻ bú mẹ.

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Hiện vẫn chưa có bằng chứng về tác động của thuốc lên khả năng lái xe và vận hành máy móc.

Tương tác với các thuốc khác và các loại tương tác khác: Trong thời gian dùng thuốc, không nên uống rượu, bia hay ăn các đồ ăn cay, nóng như ớt, hạt tiêu, các thực phẩm dễ gây dị ứng như tôm, cua

Quá liều và cách xử trí: Cho đến nay, vẫn chưa có tài liệu nào báo cáo về trường hợp dùng thuốc quá liều. Khi dùng thuốc quá liều, nếu thấy có dấu hiệu bất thường, cần đưa ngay bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để có biện pháp xử trí kịp thời.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.

Tiêu chuẩn: TCCS.

Thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến của bác sĩ.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Để xa tầm tay trẻ em.

Sản phẩm này được sản xuất và phân phối bởi:

Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng

Trụ sở: Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Nhà máy: Cụm Công nghiệp Thanh Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội

Website: www.dongduocphuchung.com.vn

Điện thoại: 04. 33824177 - 33826222

Fax: 04. 33978024

TUQ.CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG

Đỗ Minh Hùng