

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC**Eugica®
Sirô**

CÔNG THỨC	10 ml sirô	60 ml sirô	100 ml sirô
Sirô húng chanh (<i>Syr. Coleus aromaticus</i>)	4,25 g	25,5 g	42,5 g
Eucalyptol	0,02 g	0,12 g	0,2 g
Cồn bọ mắm (<i>Tinct. Pouzolzia zeylanica</i>)	0,2 g	1,2 g	2 g
Cao lỏng núc nác (<i>Ext. Oroxyllum indicum</i>)	0,2 g	1,2 g	2 g
Sirô viễn chí (<i>Syr. Polygala tenuifolia</i>)	1 g	6 g	10 g
Sirô vỏ quýt (<i>Syr. Citrus delisiosa</i>)	3 g	18 g	30 g
Sirô an túc hương (<i>Syr. Styrax tonkinense</i>)	2 g	12 g	20 g
Natri benzoat	0,3 g	1,8 g	3 g
Tá dược	vừa đủ 10 ml	vừa đủ 60 ml	vừa đủ 100 ml

(Tá dược: Acid citric monohydrat, cremophor RH40, tinh dầu lựu, đường sunett, nước tinh khiết).

DẠNG BẢO CHẾ: Sirô thuốc.

TÍNH CHẤT: Eugica® Sirô là sản phẩm có thành phần hoạt chất thiên nhiên là các vị thuốc chữa ho rất phổ biến trong nhân dân ta từ lâu đời nay:

- Húng chanh hay tần dày lá - một dược liệu đã được phòng đông y - Viện vi trùng nghiên cứu (năm 1961) cho thấy có tác dụng kháng sinh mạnh. Trong dân gian ngoài việc dùng làm gia vị, húng chanh còn là vị thuốc rất phổ biến dùng chữa cảm cúm, ho hen, viêm họng rất hữu hiệu.
- Eucalyptol có tính sát trùng, được dùng chữa ho, kích thích tiêu hoá. Eucalyptol được đào thải chủ yếu qua đường hô hấp sau khi phân tán trong huyết tương.
- Bọ mắm tức cây thuốc đời: chữa bệnh viêm họng, ho lâu năm, ho lao.
- Núc nác hay mộc hồ điệp: chữa ho lâu ngày, viêm khí - phế quản, đau dạ dày.
- Viễn chí được dùng trong tây y làm thuốc chữa ho nhiều đờm. Theo tài liệu cổ: viễn chí có vị đắng tính ôn vào 2 kinh tâm và thận. Có tác dụng an thần, ích trí, tán uất, hoá đờm, tiêu ung thũng. Dùng chữa hồi hộp, hay quên, hay sợ hãi, ho nhiều đờm, ung thư sưng thũng.
- Vỏ quả quýt cũng gọi trần bì, là vị thuốc ngoài tác dụng chữa ăn uống không tiêu, nôn mửa còn là vị thuốc chữa ho mất tiếng, trừ đờm.
- An túc hương còn gọi cánh kiến trắng, cây bồ đề: chữa viêm phế quản kinh niên.
- Natri benzoat có tính sát trùng, thường dùng trong các chế phẩm chữa ho.

CHỈ ĐỊNH: Dùng điều trị các trường hợp: ho có đờm, ho mất tiếng, ho kinh niên, viêm đau họng, viêm khí quản, phế quản, sổ mũi. Làm loãng dịch nhầy đường hô hấp, long đờm.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG:

Trẻ em từ 30 tháng tuổi đến 6 tuổi: uống 5 - 10 ml (1 - 2 muỗng cà phê hoặc 1/2 - 1 ống) x 3 lần/ngày.

Trẻ em trên 6 tuổi: uống 15 ml (1 muỗng canh hoặc 1 1/2 ống) x 3 lần/ngày.

Hoặc theo sự chỉ dẫn của bác sĩ.

CHÔNG CHỈ ĐỊNH:

Quá mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.

Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao.

THẬN TRỌNG: Chưa có báo cáo.

TƯƠNG TÁC THUỐC: Chưa tìm thấy tài liệu.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN: Chưa có báo cáo về các tác dụng không mong muốn.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC: Không ảnh hưởng trên khả năng lái xe và vận hành máy móc.

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ: Chưa có báo cáo về ảnh hưởng của thuốc trên phụ nữ có thai và cho con bú.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ: Chưa tìm thấy tài liệu.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 10 ống x 10 ml; Hộp 1 chai 60 ml; Hộp 1 chai 100 ml.

HẠN DÙNG: 24 tháng kể từ ngày sản xuất. Không dùng quá 1 tháng kể từ ngày mở nắp chai.

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.

Sở hữu sản phẩm bởi: **CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRƯƠNG TÍN**
Địa chỉ: Lô IV-13, Đường số 2, Khu công nghiệp Tân Bình, Phường Tây Thạnh,
Quận Tân Phú, TP. HCM, Việt Nam.

Tel: (028) 3815 9870

Fax: (028) 3815 9871

Email: eugica@megawecare.com

Website: www.eugica.vn

Sản xuất bởi: **DHG PHARMA**

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

Địa chỉ: 288 Bis, Nguyễn Văn Cừ, P. An
Hòa, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, Việt Nam.

TỜ THÔNG TIN CHO BỆNH NHÂN

Eugica® Sirô

1. Tên sản phẩm: EUGICA® SIRÔ

2. Mô tả sản phẩm: Sirô màu mật ong, mùi thơm, vị ngọt. Chế phẩm phải trong hoặc hơi lờ lờ, không có cặn, bụi, vật lạ không tan.

3. Thành phần của thuốc:

Mỗi ml EUGICA® Sirô chứa:

Sirô húng chanh, Eucalyptol, Côn bọ mấm, Cao lỏng núc nác, Sirô viễn chí, Sirô vỏ quýt, Sirô an túc hương, Natri benzoat, Tá dược vừa đủ.

4. Hàm lượng của thuốc:

STT	Thành phần	Hàm lượng		
		Ống 10ml	Chai 60ml	Chai 100ml
1	Sirô húng chanh	4,25 g	25,5 g	42,5 g
2	Eucalyptol	0,02 g	0,12 g	0,2 g
3	Côn bọ mấm	0,2 g	1,2 g	2 g
4	Cao lỏng núc nác	0,2 g	1,2 g	2 g
5	Sirô viễn chí	1 g	6 g	10 g
6	Sirô vỏ quýt	3 g	18 g	30 g
7	Sirô an túc hương	2 g	12 g	20 g
8	Natri benzoat	0,3 g	1,8 g	3 g
9	Tá dược	vừa đủ 10 ml	vừa đủ 60 ml	vừa đủ 100 ml

5. Thuốc dùng cho bệnh gì?

EUGICA® Sirô dùng điều trị các trường hợp: ho có đờm, ho mất tiếng, ho kinh niên, viêm đau họng, viêm khí quản, phế quản, sổ mũi. Làm loãng dịch nhầy đường hô hấp, long đờm.

6. Nên dùng thuốc này như thế nào và liều lượng?

Đường dùng: Đường uống

Liều lượng:

Trẻ em từ 30 tháng tuổi đến 6 tuổi: uống 5 – 10 ml (1 – 2 muỗng cà phê hoặc 1/5 - 1 ống) x 3 lần/ngày.

Trẻ em trên 6 tuổi: uống 15 ml (1 muỗng canh hoặc 1/3 ống) x 3 lần/ngày.

Hoặc theo sự chỉ dẫn của bác sĩ.

7. Khi nào không nên dùng thuốc này?

Quá mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.

Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao.

8. Tác dụng không mong muốn

Chưa có báo cáo về các tác dụng không mong muốn.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

9. Nên tránh dùng những thuốc hoặc thực phẩm gì khi đang sử dụng thuốc này?

Chưa tìm thấy tài liệu.

10. Cần làm gì khi một lần quên không dùng thuốc?

Chưa tìm thấy tài liệu.

11. Cần bảo quản thuốc này như thế nào?

Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C.

12. Những dấu hiệu và triệu chứng khi dùng thuốc quá liều

Chưa tìm thấy tài liệu.

13. Cần phải làm gì khi dùng thuốc quá liều khuyến cáo

Chưa tìm thấy tài liệu.

14. Nhà sản xuất và chủ sở hữu giấy phép đăng ký sản phẩm:

Sở hữu sản phẩm bởi: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRƯỜNG TÍN

Địa chỉ: Lô IV-13, Đường số 2, Khu Công nghiệp Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM, Việt Nam.

Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.

288 Bis, Nguyễn Văn Cừ, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

15. Những điều cần thận trọng khi dùng thuốc này

Chưa tìm thấy tài liệu.

16. Khi nào cần tham vấn bác sỹ:

Nếu bạn cảm thấy bất thường khi dùng thuốc, nên liên lạc với bác sĩ của bạn.

17. Ngày xem xét sửa đổi lại tờ thông tin cho bệnh nhân: 01/10/2017