


MẪU NHÃN

1. NHÃN TRÊN LỌ



2. NHÃN TRÊN HỘP :



Đà Nẵng ngày 31 tháng 10 năm 2011
TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐS. Mai Đăng Dấu

3. Hướng dẫn sử dụng thuốc :

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC. Xin đọc kỹ trước khi dùng - Nếu cần thêm thông tin xin hãy hỏi ý kiến Bác sĩ hoặc Dược sĩ.	
VIÊN NÉN BAO PHIM HỘ TÂM ĐƠN	
THÀNH PHẦN : Cho 1 viên	
- Đan sâm (Radix Salviae miltiorrhizae)..... (tương ứng với 270 mg cao khô)	: 720 mg
- Tam Thất (Radix Panaxis notoginseng).....	: 141 mg
- Camphor.....	: 8 mg
- Tá dược (Lactose, Eragel, PVP K30, DST, Flocel 102, Aerosil, Magnesi stearat, HPMC, Talc, Titan dioxyd, HPMC, màu đen oxid sắt , màu đỏ oxid sắt, PEG6000, acid stearic) vừa đủ.....	: 1 viên

DƯỢC LỰC : Hoạt huyết, khử ứ huyết, thông khí và giảm đau.

- Thuốc có tác dụng ức chế và ngăn ngừa tác dụng của các chất oxy hóa, đào thải các gốc tự do, làm giãn các động mạch vành, tăng lưu lượng máu tới động mạch vành và giảm đòi hỏi oxygen ở cơ tim, bảo vệ cơ tim chống lại tình trạng rối loạn do thiếu máu. Thuốc có tác dụng chẹn Calci vào tế bào cơ tim, do đó làm tăng K^+ trong cơ tim và một chức năng quan trọng là ức chế sự kết vón tiểu cầu, ngăn ngừa tạo cục máu đông (*Am J Chin Med 1986; 14 (1 - 2): 26 - 32; Am J Chin Med 1986; 14 (3 - 4): 145 - 52; Planta Med 1989 Feb; 55 (1) : 51 - 4*).

- Trong chứng co thắt mạch vành, tác dụng của Hộ Tâm Đơn xuất hiện muộn nhưng kéo dài và không gây nhức đầu như các thuốc thuộc nhóm nitrat.

CHỈ ĐỊNH :

➤ Dự phòng và điều trị : Chứng đau thắt ngực, các bệnh mạch vành, xơ cứng động mạch. Cholesterol máu cao, ngừa huyết khối, rối loạn nhịp tim.

LIỀU LƯỢNG - CÁCH DÙNG : Dùng theo liều chỉ định của Bác Sĩ hoặc liều thường dùng :

- Người lớn : Ngày 3 lần, mỗi lần 3 viên.

- Trẻ em : Mỗi lần 1 - 2 viên, ngày 2 - 3 lần.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH :

- Người bị mẫn cảm với các thành phần của thuốc.

- Không dùng cho phụ nữ có thai.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN: Chưa ghi nhận được trường hợp nào xảy ra tác dụng không mong muốn trong khi dùng thuốc.

Thông báo ngay cho bác sĩ các tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc



THẬN TRỌNG :

- Nên uống thuốc vào lúc no, không được để bụng đói.
- Thận trọng khi phối hợp với các thuốc tim mạch khác như captopril, timol... uống thuốc trước hoặc sau khi uống các thuốc trên 30 phút đến 1 giờ.
- Thận trọng khi sử dụng thuốc cho người đang có xuất huyết, rối loạn đông máu.

TƯƠNG TÁC THUỐC :

- Tác dụng hạ huyết áp của Hệ Tâm Đơn đối kháng với tác dụng của Atropin và Propanolol.

KHUYẾN CÁO :

- Người có tiền sử suy mạch vành nên sử dụng thuốc như biện pháp dự phòng.
- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng thuốc trước khi dùng. *Nếu cần biết thêm thông tin về thuốc, hãy hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ.*

TRÌNH BÀY VÀ BẢO QUẢN :

- Thuốc đóng trong lọ nhựa 45 viên, hộp 1 lọ có kèm tờ hướng dẫn sử dụng.
- Để thuốc nơi khô, thoáng, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C. **ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM.**

- Hạn dùng : 36 tháng kể từ ngày sản xuất

Tiêu chuẩn áp dụng : TCCS

SĐK :

Thuốc được sản xuất tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA

Khu Công nghiệp Hòa Khánh – Quận Liên Chiểu - TP Đà Nẵng

Tel: 0511.3760130 Fax: 0511.3760127 Email: Info@danapha.com

Điện thoại tư vấn : 0511.3760131

Và phân phối trên toàn quốc



Đà Nẵng, ngày 11 tháng 01 năm 2012

TỔNG GIÁM ĐỐC



DS. Mai Đăng Dấu

