

HOẠT HUYẾT DƯỠNG NÃO

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 1 vỉ, 2 vỉ, 5 vỉ x 20 viên.

DẠNG BÀO CHẾ: Viên nén bao phim.

Mô tả: Viên nén bao phim màu đen hoặc nâu đen, hình tròn dẹt.

THÀNH PHẦN: Mỗi viên chứa:

Thành phần hoạt chất:

Cao đặc rễ Đinh lăng 5:1 (*Extractum Radix Polysciacis spissum*).....150 mg

Cao khô lá Bạch quả (*Extractum Folii Ginkgo siccus*)5 mg

(Hàm lượng Flavonoid toàn phần $\geq 24\%$)

Thành phần tá dược: Microcrystalline cellulose, Colloidal silicon dioxid, Sodium starch glycolate, Magnesi stearat, Talc, HPMC, PEG 6000, Titan dioxid, Oxyd sắt đỏ, Than hoạt...v.v

TÁC DỤNG: Bổ khí huyết, hoạt huyết dưỡng não.

➤ **HOẠT HUYẾT DƯỠNG NÃO** làm tăng chức năng hệ thần kinh trung ương, tăng hoạt hóa vỏ não, làm tăng trí nhớ và khôi phục trí nhớ, giảm các biểu hiện của suy tuần hoàn não như: đau đầu, chóng mặt, rối loạn tiền đình, giảm trí nhớ và độ minh mẫn.

➤ **HOẠT HUYẾT DƯỠNG NÃO** cải thiện các chỉ số về lưu huyết não, làm tăng lưu lượng tuần hoàn não, giảm trương lực mạch máu não, làm tăng cung cấp máu cho não, phục hồi lại các chức năng hoạt động của não bộ.

➤ **HOẠT HUYẾT DƯỠNG NÃO** có tác dụng kháng M.A.O làm hồi vượng dopamin não làm giảm triệu chứng run của bệnh Parkinson.

➤ **HOẠT HUYẾT DƯỠNG NÃO** làm tăng lực bóp tay, sức kéo và khả năng phối hợp động tác chính xác của bệnh nhân Parkinson.

➤ **HOẠT HUYẾT DƯỠNG NÃO** thích hợp với người hoạt động trí óc căng thẳng bị suy giảm trí nhớ, kém tập trung, mệt mỏi.

CHỈ ĐỊNH:

- Phòng và điều trị các bệnh sau:

+ Suy giảm trí nhớ, căng thẳng thần kinh, kém tập trung.

+ Thiếu năng tuần hoàn não, hội chứng tiền đình với các biểu hiện: đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, mất thăng bằng.

+ Giảm chức năng não bộ: giảm trí nhớ, suy nhược thần kinh, di chứng não.

- Hỗ trợ điều trị chứng run giật của bệnh nhân Parkinson.

LIỀU DÙNG, CÁCH DÙNG:

- **Người lớn:** uống 2 - 3 viên/lần x 2 - 3 lần/ngày.

- **Trẻ em:** uống 1 viên/lần x 2 - 3 lần/ngày.

Thời gian sử dụng: 2 - 3 tháng hoặc lâu hơn tùy theo tình trạng bệnh.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

- Không dùng cho phụ nữ có thai.

- Người có rối loạn về máu, rong kinh, người đang xuất huyết.

- Nhồi máu não cấp, nhồi máu cơ tim cấp, người tâm thần phân liệt, người thiếu năng trí tuệ bẩm sinh.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC: Không có.

SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

- Không dùng cho phụ nữ có thai.

- Dùng được cho phụ nữ cho con bú.

ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:

Không ảnh hưởng

TƯƠNG TÁC THUỐC: Không dùng cùng với thuốc chỉ huyết.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

Chưa ghi nhận được báo cáo về phản ứng có hại của thuốc.

Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:

Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc.

Trường hợp sử dụng thuốc quá liều, cần tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời.

BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30 °C, tránh ánh sáng.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG: TCCS