

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

HYĐAN 500

Thành phần:

Cho 1 viên hoàn cứng bao phim:

Cao đặc Hy thiêm (độ ẩm 20%)	
Tương ứng với 500 mg Hy thiêm (<i>Herba Siegesbeckiae</i>)	
Ngũ gia bì chân chim (<i>Cortex Schefflerae heptaphyllae</i>)	170 mg
Gồm:	
Cao đặc ngũ gia bì (Độ ẩm 20%)	10 mg
Tương ứng với 100 mg Ngũ gia bì chân chim	
Bột mịn Ngũ gia bì chân chim	70 mg
Bột mã tiền chế (<i>Pulveres Strychnin praeparata</i>)	50 mg
Tá dược	Vừa đủ 1 viên
(Tá dược gồm: Đường trắng, Tinh bột sắn, Methyl paraben, Hydroxy propyl methyl cellulose, Macrogol 6000, Bột Talc, Titan dioxyd, Phẩm màu Ponceau 4R lake, Phẩm màu Carmoisine lake, Ethanol 96%)	

Trình bày: Hộp 15 túi x 12 hoàn.

Tác dụng: Trên lâm sàng Hyđan thể hiện rõ tác dụng chống viêm, giảm đau. Sau 1 thời gian uống Hyđan 500 người bệnh cảm thấy đỡ đau nhức, cử động dễ dàng.

Chỉ định: Đau do viêm đa khớp dạng thấp, đau nhức xương khớp, đau dây thần kinh liên sườn, đau lưng, đau vai gáy.

Chống chỉ định: Trẻ em dưới 4 tuổi.

Thận trọng: Khi dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú.

Tương tác thuốc: Chưa có thông tin.

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú: Không nên dùng Hyđan trong thời kỳ có thai và cho con bú.

Sử dụng khi lái xe và vận hành máy móc: Dùng được.

Những lưu ý đặc biệt và cảnh báo trước khi sử dụng:

- Không dùng quá liều chỉ định.
- Thuốc không kích ứng dạ dày nên dùng được cho cả bệnh nhân loét dạ dày, tá tràng.
- Trong quá trình điều trị, nếu có biểu hiện bất thường, nên hỏi ý kiến bác sỹ.
- Trường hợp bị táo bón khi dùng thuốc, cần uống thêm thuốc nhuận tràng hoặc thức ăn có tác dụng nhuận tràng.
- Không dùng thuốc đã bị biến màu, mốc, bờ.
- Thuốc đã quá 36 tháng kể từ ngày sản xuất không được dùng.

Tác dụng không mong muốn:

- Đau nhức có thể tăng dội lên trong 3 - 5 ngày đầu uống HYĐAN 500. Nhưng cảm giác này sẽ giảm đi và mất hẳn vài ngày sau đó. Không nên ngừng thuốc, vẫn tiếp tục uống đủ liều.

Liều dùng và cách dùng: Một đợt dùng thuốc 10 - 30 ngày.

- Người lớn: Ngày uống 2 - 3 lần, mỗi lần 12 hoàn. Liều tối đa: 18 hoàn/1 lần, 48 hoàn/24 giờ.

- Trẻ em từ 4 tuổi trở lên: Ngày uống 1 hoàn cho mỗi tuổi chia làm 2 lần.

Quá liều và cách xử trí: Trong thành phần thuốc có Mã tiền là dược liệu độc, mặc dù đã được chế biến giảm độc nhưng vẫn phải dùng theo liều hướng dẫn. Nếu sử dụng quá liều có thể gây rối loạn tiêu hoá, rối loạn co bóp dạ dày... Cần thông báo cho bác sỹ và đến cơ sở y tế để điều trị khi có biểu hiện quá liều.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Tiêu chuẩn: TCCS

Để xa tầm tay của trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sỹ

Sản xuất và phân phối:

Nhà máy sản xuất thuốc Đông dược

CÔNG TY CP DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ THANH HOÁ

Địa chỉ: Lô 4-5-6, KCN Tây Bắc Ga - TP. Thanh Hóa

Điện thoại: (037) 3852691 - Fax: (037) 3724853

Ngày 30 tháng 6 năm 2015

TỔNG GIÁM ĐỐC



CHỖ TỔNG GIÁM ĐỐC

DS. Lê Văn Ninh



**TUQ.CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG**
Đỗ Minh Hùng