

KETOCONAZOL

Kem bôi da

CÔNG THỨC:

Mỗi gam kem chứa:

Ketoconazol.....20 mg

Tã được: Cetomacrogol emulsifying wax, Cetostearyl Alcohol, Vaselin, Isopropyl myristate, Polyoxylethylene castor oil, Glycerin, Propylene glycol, Methylparaben, Propylparaben, Natri Sulfit, Nước cất vừa đủ.....1g.

CHỈ ĐỊNH:

Kem Ketoconazol được dùng bôi tại chỗ để điều trị các bệnh nấm ở da và niêm mạc (*Candida*, *Trichophyton rubrum*, *T. mentagrophytes*, *Epidermophyton floccosum*, *Malassezia furfur*...).

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Quá mẫn với thành phần của thuốc

LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG:

Thuốc được dùng bôi tại chỗ, nơi bị nấm và xung quanh.

- Nấm *Candida* ở da, lang ben, nấm da thân hoặc nấm da đầu: bôi 1 lần/ngày trong 2 tuần.

- Viêm da bã nhờn: bôi 2 lần/ngày trong 4 tuần hoặc cho đến khi khỏi bệnh.

- Nấm da chân: bôi 1 lần/ngày trong 2 tuần.

- Cần sử dụng tiếp ít nhất là một vài ngày sau khi các triệu chứng biến mất.

THẬN TRỌNG:

Ketoconazol có thể gây độc cho gan vì thế không nên dùng cho những người đã bị bệnh gan. Biến chứng ở gan thường gặp nhiều hơn ở người cao tuổi, phụ nữ, người nghiện rượu hoặc bị suy chức năng gan do những nguyên nhân khác.

Vì ketoconazol cũng có khả năng ức chế quá trình tổng hợp các steroid và chuyển hóa vitamin D, do đó khi điều trị kéo dài ở trẻ em nên hết sức thận trọng.

Dùng ketoconazol kéo dài nhằm dự phòng các bệnh nấm cho những người suy giảm miễn dịch có thể gây ra những thay đổi hormon nghiêm trọng.

THỜI KỲ MANG THAI:

Ketoconazol gây quái thai ở chuột (dinh ngón và thiếu ngón) ở liều 80 mg/kg/ngày (gấp 10 lần liều uống tối đa khuyến dùng cho người).

Ketoconazol qua được nhau thai, nhưng còn chưa có những nghiên cứu đầy đủ ở người. Thuốc chỉ dùng cho người mang thai khi lợi ích điều trị xác đáng hơn các nguy cơ có thể gây ra cho thai nhi.

THỜI KỲ CHO CON BÚ:

Thuốc có thể tiết vào sữa, do đó người mẹ đang điều trị với ketoconazol không nên cho con bú.

TÁC ĐỘNG CỦA THUỐC KHI LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:

Do thuốc dạng dùng tại chỗ, Ketoconazol ít được hấp thu. Các tác dụng không mong muốn chủ yếu xảy ra ở nơi bôi thuốc nên thuốc không ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc.

TƯƠNG TÁC THUỐC:

Chưa có thông tin về tương tác thuốc của Ketoconazol dùng dưới dạng kem bôi da với các thuốc khác.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

Ketoconazol khi bôi tại chỗ có thể xảy ra kích ứng da như: ngứa, ngoại ban, phát ban, viêm da, ban xuất huyết và mày đay, kích ứng, cảm giác rất bỏng ở nơi bôi thuốc.

Hầu hết các trường hợp độc với gan đã được ghi nhận là ở các người bệnh dùng thuốc trị nấm móng và ở nhiều người khác dùng thuốc trị các bệnh nấm da mạn tính dai dẳng.

Mặc dù tác dụng độc do ketoconazol gây ra với gan thường có thể hồi phục sau khi ngừng thuốc vài tháng nhưng cũng đã xảy ra một số hiếm trường hợp xấu (như hoại tử gan cấp, biến đổi mô ở gan hoặc tử vong).

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

SỬ DỤNG QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:

Vì thuốc dùng để bôi ngoài da nên không thấy xảy ra hiện tượng quá liều.

LỜI KHUYẾN CÁO:

Đề xa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ.

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN: Nơi khô thoáng, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Tuýp 5 gam, Tuýp 10 gam, hộp 1 tuýp, kèm tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Không dùng quá 30 ngày kể từ ngày mở nắp tuýp thuốc.

Nhà sản xuất: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIPHARCO**

08 Nguyễn Trường Tộ - Phường Phước Vĩnh - Thành phố Huế - Tỉnh Thừa Thiên Huế

Tel: 0234.3823099 - 3822704 *Fax: 0234.3826077