

Lần đầu: 01/11/2018

Dot 162BSZ

Số lô SX:

Lạc nhung	500 mg
Nhân sâm	500 mg
Hoàng kỳ	500 mg
Đương quy	500 mg
Liên nhục	400 mg
Trần bì	300 mg
Mẫu lệ	350 mg
Nhục thung dung	500 mg
Cao đặc 2,5 g hỗn hợp (W=20%)	352 mg

Tương ứng 2,5 g hỗn hợp được hiệu:

Ngũ vị tử	300 mg
Hoài sơn	350 mg
Bạch truật	400 mg
Sơn thù	300 mg
Hoàng bá	300 mg
Bao kích	400 mg
Tã dược vũ du	5 g

Các thành phần khác nên đặt hướng dẫn sử dụng.

ĐỂ XA TAY CỦA TRẺ EM.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

**ĐỂ XA TÀM TAY CỦA TRẺ EM,
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI**



ĐI SỞ SẢN XUẤT THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN THẾ THẠCH
 69 Trần Phú-P.Lam Sơn-TP.Thành Hồ
 M.S.C.S: 26 800 942

MSC: 26A800942

LIỀU DÙNG, CÁCH DÙNG:

3 - Người lớn mỗi lần uống 1 túi 6,0g, ngày uống 3 lần (sáng, trưa, tối), uống vào lúc đói với nước ấm.
Trẻ em 15 - 17 tuổi mỗi lần uống 1/2 túi (3g - 6,0g)

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
- Trẻ có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao.
Không dùng cho trẻ em dưới 15 tuổi.

- Phụ nữ có thai.

- Người bị tiểu đường

BẢO QUẢN:
Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Tiêu chuẩn: TCCS

MSK:

CA 101 CV.

0105
NISCY.

Ngày 12 tháng 10 năm 2017.

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THUỐC GIẢI ĐỘC
 69 Trần Phú - P. Lâm Sơn - TP. Thanh Hóa
 MÃ SỐ: 26A00942

CHƯƠNG TRÌNH

KHỎI DƯỜNG HOÀN

KHỞI DƯỜNG HOÀN

MẪU NHÃN XIN ĐĂNG KÝ THUỐC

KHỎI DƯỠNG HOÀN

Hộp 15 túi x 6 g

Hộp (120 x 72 x 90)mm
Túi (78 x 68)mm

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

A. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC CHO NGƯỜI BỆNH

1. Tên sản phẩm:

KHÔI DƯƠNG HOÀN

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Để xa tầm tay trẻ em

Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sỹ hoặc dược sỹ

CÔNG SẢN XUẤT THUỐC Y HỌC
SN 69 Trần Phú-P.Lam Sơn
MSCS: 2 6 A 8 4

2. Thành phần: Cho 1 túi x 6 gam

Hoạt chất	Hàm lượng
Lộc nhung (<i>Cornu cervi pantotrichum</i>)	500 mg
Nhân sâm (<i>Radix ginseng</i>)	500 mg
Hoàng kỳ (<i>Radix Astragali membranacei</i>)	500 mg
Đương quy (<i>Radix Angelicae sinensis</i>)	500 mg
Liên nhục (<i>Semen Nelumbinis Ruciferae</i>)	400 mg
Trần bì (<i>Pericarpium Citri Reticulatae Perenne</i>)	300 mg
Mẫu lệ (<i>Concha Ostreae</i>)	350 mg
Nhục thung dung (<i>Herba Cistanches</i>)	500 mg
Cao đặc dược liệu (W=20%) tương ứng 2,25 g hỗn hợp dược liệu:	352 mg
Ngũ vị tử (<i>Fructus Schisandrae</i>)	300 mg
Hoài sơn (<i>Tuber Dioscorea Persimilis</i>)	350 mg
Bạch truật (<i>Rhizoma Atractylodis Macrocephalae</i>)	400 mg
Son thù (<i>Fructus Corni officinalis</i>)	500 mg
Hoàng bá (<i>Cortex Phellodendri</i>)	300 mg
Ba kích (<i>Radix Morindae officinalis</i>)	400 mg
Tá dược vừa đủ	1 túi
<i>Tá dược gồm: Tinh bột sắn, Đường trắng, Bột talc, Than hoạt, Parafin rắn, Sáp ong trắng, Parafin lỏng</i>	

3. Mô tả sản phẩm: Viên hoàn cứng hình cầu, màu đen, nhẵn bóng, mùi thơm dược liệu. Vị hơi đắng.

4. Quy cách đóng gói: Hộp 15 túi x 6 gam

5. Thuốc dùng cho bệnh gì:

Cơ thể suy nhược, thận hư, đau lưng mỏi gối, di tinh, mộng tinh, liệt dương, người mệt mỏi ăn uống kém.

6. Nên dùng thuốc này như thế nào và liều lượng?

- Người lớn mỗi lần uống 1 túi 6,0g, ngày uống 3 lần (sáng, trưa, tối), uống vào lúc đói với nước ấm.
- Trẻ em 15 – 17 tuổi mỗi lần uống 1/2 đến 1 túi (3g – 6,0g)

7. Khi nào không nên dùng thuốc này:

- Trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao
- Không dùng cho trẻ em dưới 15 tuổi.
- Phụ nữ có thai.
- Người bị tiểu đường

8. Tác dụng không mong muốn:

Chưa có báo cáo về tác dụng phụ.

9. Nên tránh dùng những thuốc hoặc thực phẩm gì khi đang sử dụng thuốc này:

- Chưa có thông tin.

10. Cần làm gì khi một lần quên không dùng thuốc:

- Nếu một lần quên không dùng thuốc, người bệnh uống lần tiếp theo đúng như liều hướng dẫn, không nên uống liều gấp đôi.

11. Cần bảo quản thuốc này như thế nào:

- Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

12. Những dấu hiệu và triệu chứng khi dùng thuốc quá liều:

Chưa có tài liệu báo cáo về các biểu hiện bất thường khi sử dụng quá liều.

13. Cần phải làm gì khi dùng thuốc quá liều khuyến cáo:

- Nếu có xảy ra biểu hiện bất thường do dùng quá liều khuyến cáo, phải đến ngay cơ sở y tế để bác sĩ theo dõi và xử trí.

14. Những điều cần thận trọng khi dùng thuốc này:

a/ Các tình trạng cần thận trọng khi dùng thuốc: Chưa có thông tin.

b/ Các khuyến cáo dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

- Không dùng cho phụ nữ có thai.
- Phụ nữ cho con bú dùng được.

c/ Ảnh hưởng của thuốc đối với công việc:

- Chưa ghi nhận được báo cáo phản ứng bất lợi về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng vận hành máy móc, lái tàu xe, người làm việc trên cao và các trường hợp khác.

15. Khi nào cần tham vấn bác sĩ:

- Khi gặp bất kì tác dụng không mong muốn hoặc quá liều cần đến gặp ngay bác sĩ để tham vấn.
- Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ.

16. Hạn dùng của thuốc: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

17. Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất:

NHÀ MÁY SẢN XUẤT THUỐC ĐÔNG DƯỢC
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VITYT THANH HÓA

Địa chỉ: Lô 4-5-6, KCN Tây Bắc Ga, Phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa

18. Ngày xem xét sửa đổi lại tờ thông tin cho bệnh nhân:

B. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC CHO CÁN BỘ Y TẾ

1. Chỉ định:

Cơ thể suy nhược, thận hư, đau lưng mỏi gối, di tinh, mộng tinh, liệt dương, người mệt mỏi ăn uống kém.

2. Liều dùng - Cách dùng:

- Người lớn mỗi lần uống 1 túi 6,0g, ngày uống 3 lần (sáng, trưa, tối), uống vào lúc đói với nước ấm.

- Trẻ em 15 – 17 tuổi mỗi lần uống 1/2 đến 1 túi (3g – 6,0g)

3. Chống chỉ định:

- Trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao
- Không dùng cho trẻ em dưới 15 tuổi.
- Phụ nữ có thai.
- Người bị tiểu đường

4. Các trường hợp thận trọng khi dùng thuốc:

a/ Các tình trạng cần thận trọng khi dùng thuốc: Chưa có thông tin.

b/ Các khuyến cáo dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

- Không dùng cho phụ nữ có thai.
- Phụ nữ cho con bú dùng được.

c/ Ảnh hưởng của thuốc đối với công việc:

- Chưa ghi nhận được báo cáo phản ứng bất lợi về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng vận hành máy móc, lái tàu xe, người làm việc trên cao và các trường hợp khác.

5. Tương tác của thuốc với các thuốc khác và các loại tương tác khác:

- Chưa có thông tin.

6. Tác dụng không mong muốn:


Chưa có báo cáo về tác dụng phụ.

7. Quá liều và cách xử trí:

Chưa có tài liệu báo cáo về các biểu hiện bất thường khi sử dụng quá liều.



Ngày 12 tháng 10 năm 2017



HOÀNG VĂN HÙNG

TUQ.CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Ngọc Anh

THỂ THAO
Thanh Hóa
42

3

[Signature]