

**MẪU NHÃN TRỰC TIẾP TRÊN ĐƠN VỊ
ĐÓNG GÓI NHỎ NHẤT**

Loại nhũn : 30g hoặc cứng

LỤC VỊ

Chỉ định : Can thận âm hư gây chóng mặt , vãng đầu , đau mỏi thất lưng đầu gối ,
cốt chùng triền nhiệt , đạo hãn về đêm , di tinh , tiêu khát.

Liều dùng : Từ 5 tuổi đến dưới 10 tuổi : mỗi lần uống 2,5g (khoảng 8 viên)
Từ 10 tuổi đến dưới 15 tuổi : mỗi lần uống 3g (khoảng 10 viên)
Từ 15 tuổi đến 18 tuổi : mỗi lần uống 4g (khoảng 15 viên)
Từ 18 tuổi trở lên : mỗi lần uống 5g (khoảng 20 viên)

1 ngày uống 3 lần : Sáng - trưa - tối . Uống với nước đun sôi để nguội .

Chống chỉ định : - không dùng cho trẻ em dưới 5 tuổi và phụ nữ có thai .
- Những người mẫn cảm với 1 trong những thành phần của thuốc .
- Những người ăn không tiêu , đại tiện lỏng do hư hàn
- Thận trọng : Phụ nữ có thai

Tác dụng không mong muốn : chưa thấy có báo cáo .

Đường dùng : thuốc uống dạng viên hoàn cứng
Công thức bào chế (cho 1 đơn vị đóng gói nhỏ nhất 30g)

Thành phần	Hàm lượng	Thành Phần	Hàm Lượng
Thục địa (<i>Rehmannia glutinosa</i>)	6,5g	Hoài sơn (<i>Asteris chinensis</i>)	4g
Mẫu đơn tử (<i>Clatris Paeoniae moutanensis</i>)	2,5g	Trạch tả (<i>Alisma Alismatis</i>)	3,5g
Sơn thù (<i>Paeonia moutanensis</i>)	3,5g	Phục linh (<i>Poria</i>)	3,5g
Tinh bột (<i>Amorphum</i>)	1,5g	Hạt thạch (<i>Takum</i>) vừa đủ	30g

**CƠ SỞ SẢN XUẤT THUỐC YHCT
PHƯỚC SANH**

**Địa chỉ : 272c khu 3 - thị trấn Đức Hòa
Huyện Đức Hòa - Tỉnh Long An - VN**

SDK : Lô sx : HD:
Số lô thể hiện ngày sản xuất .
Thuốc sx theo : TCCS.
Bảo quản nơi khô mát .
Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng .
Để xa tầm tay trẻ em .

**Chủ cơ sở sản xuất thuốc YHCT
PHƯỚC SANH**

**CƠ SỞ SẢN XUẤT THUỐC YHCT
PHƯỚC SANH**
272C Khu 3 Thị Trấn Đức Hòa
Đức Hòa - Tỉnh Long An

Trương vũ Khánh .

MẪU NHÃN BAO BÌ ĐÓNG GỐI



CƠ SỞ SẢN XUẤT THUỐC YHCT
PHƯỚC SANH
272C Khu 3 Thị Trấn Đức Hòa
Đức Hòa - Tỉnh Long An

LỤC VỊ

Viên hoàn cứng 30g



Chỉ trị:
Can thận âm hư gây chóng mặt,
váng đầu, đau mỏi thắt lưng đầu gối,
cốt chưng triểu nhiệt, đạo hãn về đêm,
di tinh, tiểu khát.

福生藥房出品

Liều dùng:
Từ 5 tuổi đến dưới 10 tuổi: mỗi lần uống 2,5g (khoảng 8 viên)
Từ 10 tuổi đến dưới 15 tuổi: mỗi lần uống 3g (khoảng 10 viên)
Từ 15 tuổi đến 18 tuổi: mỗi lần uống 4g (khoảng 15 viên)
Từ 18 tuổi trở lên: mỗi lần uống 5g (khoảng 20 viên)

Cách dùng:
Mỗi ngày uống 3 lần:
Sáng - trưa - tối.
Uống với nước đun sôi để nguội.

Chống chỉ định:
- Không dùng cho trẻ em dưới 5 tuổi và phụ nữ có thai.
- Những người mẫn cảm với 1 trong những thành phần của thuốc.
- Những người ăn không tiêu, đại tiện lỏng do hư hàn.
- Thận trọng: phụ nữ có thai.
- Thuốc uống dạng viên hoàn cứng.

Tác dụng không mong muốn: chưa thấy có báo cáo.

LỤC VỊ

Viên hoàn cứng 30g



Chỉ trị:
Can thận âm hư gây chóng mặt,
váng đầu, đau mỏi thắt lưng đầu gối,
cốt chưng triểu nhiệt, đạo hãn về đêm,
di tinh, tiểu khát.

CƠ SỞ SẢN XUẤT THUỐC YHCT PHƯỚC SANH
ĐC: 272C / KHU 3 THỊ TRẤN ĐỨC HÒA
HUYỆN ĐỨC HÒA - TỈNH LONG AN, VN.

Công thức cho 30g thành phẩm

Thạch địa (Cactaceae <i>ginseng purpurea</i>)	6,5g
Hoài sơn (Tuber <i>Hemerocallis perfoliata</i>)	4g
Mẫu đơn bì (Cortex <i>Paeonia officinalis</i>)	2,5g
Trạch tả (Rhizoma <i>Alisma</i>)	3,5g
Sâm thù (Radix <i>Eleutherococcus</i>)	3,5g
Phục linh (Perla)	3,5g
Tinh bột (Ampho)	1,5g
Hoạt thạch (Talcum) vừa đủ	30g

SDK: _____
LÔ SX: _____
HD: _____
Số lô thể hiện ngày sản xuất
Thuốc xx theo: TCCS.
Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng.
Để xa tầm tay trẻ em.
Bảo quản nơi khô mát.

Chủ cơ sở sản xuất thuốc YHCT
PHƯỚC SANH

CƠ SỞ SẢN XUẤT THUỐC YHCT
PHƯỚC SANH
272C Khu 3 Thị Trấn Đức Hòa
Đức Hòa - Tỉnh Long An

Trưởng vũ Khánh.

TOA HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

LỤC VỊ

Công thức bào chế (cho 1 đơn vị đóng gói nhỏ nhất 30g)

Thành phần	Hàm lượng	Thành Phần	Hàm Lượng
Thục địa (radix rehmanniae glutinosae praeparata)	6,5g	Hoài sơn (Tuber Dioscoreae persimilis)	4g
Mẫu đơn bì (Cortex Paeoniae suffruticosae)	2,5g	Trạch tả (Rhizoma Alismatis)	3,5g
Sơn thù (Fructus corni officinalis)	3,5g	Phục linh (Poria)	3,5g
Tinh bột (Amylum)	1,5g	Hoạt thạch (Talcum) vừa đủ	30g

Qui cách đóng gói : Lọ nhựa hoàn cứng 30g có hộp giấy bên ngoài .

Dạng bào chế : Thuốc uống dạng viên hoàn cứng .

Chỉ định: Can thận âm hư gây chóng mặt ,váng đầu , đau mỏi thắt lưng đầu gối ,
cốt chưng triều nhiệt , đạo hãn về đêm , di tinh , tiêu khát .

Cách dùng : Trẻ em từ 5 tuổi đến 10 tuổi : mỗi lần uống 2,5g (khoảng 8 viên)

Từ 10 tuổi đến 15 tuổi : mỗi lần uống 3g (khoảng 10 viên)

Từ 15 tuổi đến 18 tuổi : mỗi lần uống 4g (khoảng 15 viên)

Từ 18 tuổi trở lên : mỗi lần uống 5g (khoảng 20 viên) .

1 Ngày uống 3 lần (sáng - trưa - tối) : uống với nước đun sôi để nguội .
uống sau bữa ăn .

Đường dùng : Thuốc uống dạng viên hoàn cứng .

Chống chỉ định : - Không dùng cho trẻ em dưới 5 tuổi và phụ nữ có thai .

- Những người mẫn cảm với 1 trong những thành phần của thuốc .

- Những người ăn không tiêu , đại tiện lỏng do hư hàn .

- Thận trọng : phụ nữ có thai

Tác dụng không mong muốn : chưa thấy có báo cáo .

Lời khuyến cáo : Đọc kỹ toa hướng dẫn sử dụng trước khi dùng ,
nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến lương y .

Thông báo cho bác sĩ tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

SDK :

Lô SX :

HD :

Bảo quản : Nơi khô mát

Số lô thể hiện ngày SX.

Thuốc sản xuất theo tiêu chuẩn : TCCS

CƠ SỞ SX THUỐC YHCT PHƯỚC SANH

ĐC : 272C - Khu 3 - Thị Trấn Đức Hòa - Huyện Đức Hòa - Tỉnh Long An -VN

Chủ cơ sở sản xuất

CƠ SỞ SẢN XUẤT THUỐC YHCT

PHƯỚC SANH

272C Khu 3 Thị Trấn Đức Hòa

Đức Hòa - Tỉnh

Trương vũ Khánh