

Hộp 1 vỉ x 1 viên nén bao phim


BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 23/3/2016

1 vỉ x 1 viên nén bao phim

Mebendazol 500

Mebendazol 500mg



THÀNH PHẦN

Mebendazol 500mg
Tá dược 1 viên nén bao phim

Để xa tầm tay của trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

Mebendazol 500

Mebendazol 500mg

CHỈ ĐỊNH

Điều trị nhiễm một hoặc nhiều loại giun đường ruột như: giun đũa, giun tóc, giun móc.

Nhiễm giun ngoài ruột như giun chỉ (*Onchocerca volvulus*).

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: Có thể nhai và nuốt viên thuốc hoặc nghiền và trộn với thức ăn. Liều dùng như nhau cho trẻ em trên 2 tuổi và người lớn.

Giun móc, giun đũa, giun tóc và nhiễm nhiều giun: liều duy nhất 500mg, có thể lặp lại sau 2-3 tuần.

Giun chỉ *Onchocerca volvulus*: người lớn dùng 1g/lần, 2 lần/ngày, trong 28 ngày.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Bệnh nhân mắc bệnh gan. Người quá mẫn với Mebendazol.

Phụ nữ mang thai ở 3 tháng đầu và trẻ em dưới 2 tuổi.

Viêm ruột Crohn, viêm loét đại trực tràng (có thể làm tăng hấp thu và tăng độc tính của thuốc, đặc biệt khi dùng liều cao).

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



Công ty Cổ phần Dược VACOPHARM

59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An,
Tỉnh Long An

ĐT: (072) 3.829.311 • Fax: (072) 3.822.244

Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường

Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

www.vacopharm.com

Tiêu chuẩn áp dụng: DBVN 4

SĐK :

Số lô SX:

Ngày SX:

HD :

Mebendazol 500

Mebendazol 500mg



Hộp 1 vỉ x 4 viên nén bao phim


Mebendazol 500

Mebendazol 500mg

1 vỉ x 4 viên nén bao phim

Mebendazol 500

Mebendazol 500mg



THÀNH PHẦN

Mebendazol 500mg

Tá dược 1 viên nén bao phim

Để xa tầm tay của trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,

tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

Mebendazol 500

Mebendazol 500mg

CHỈ ĐỊNH

Điều trị nhiễm một hoặc nhiều loại giun đường ruột như: giun đũa, giun tóc, giun móc.

Nhiễm giun ngoài ruột như giun chỉ (*Onchocerca volvulus*).

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: Có thể nhai và nuốt viên thuốc hoặc nghiền và trộn với thức ăn. Liều dùng như nhau cho trẻ em trên 2 tuổi và người lớn.

Giun móc, giun đũa, giun tóc và nhiễm nhiều giun: liều duy nhất 500mg, có thể lặp lại sau 2-3 tuần.

Giun chỉ *Onchocerca volvulus*: người lớn dùng 1g/lần, 2 lần/ngày, trong 28 ngày.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Bệnh nhân mắc bệnh gan. Người quá mẫn với Mebendazol.

Phụ nữ mang thai ở 3 tháng đầu và trẻ em dưới 2 tuổi.

Viêm ruột Crohn, viêm loét đại trực tràng (có thể làm tăng hấp thu và tăng độc tính của thuốc, đặc biệt khi dùng liều cao).

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

GMP

WHO

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM

59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An,

Tỉnh Long An

ĐT:(072) 3.829.311 • Fax:(072) 3.822.244

Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường

Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

www.vacopharm.com

Tiêu chuẩn áp dụng: ĐBVN 4

SBK :

Số lô SX:

Ngày SX:

HD :

Mebendazol 500

Mebendazol 500mg

M.S.D.N: 1100112319 - C.T.C.P

CÔNG TY

CỔ PHẦN DƯỢC

VACOPHARM

TP. TÂN AN - T. LONG AN

M.S.D.N: 1100112319 - C.T.C.P

CÔNG TY


CỔ PHẦN DƯỢC


VACOPHARM

TP. TÂN AN - T. LONG AN

Hộp 5 vỉ x 4 viên nén bao phim

Mebendazol 500
Mebendazol 500mg

5 vỉ x 4 viên nén bao phim
Mebendazol 500
Mebendazol 500mg




THÀNH PHẦN

Mebendazol 500mg
Tá dược 1 viên nén bao phim

Để xa tầm tay của trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

le

Mebendazol 500

Mebendazol 500mg

CHỈ ĐỊNH

Điều trị nhiễm một hoặc nhiều loại giun đường ruột như: giun đũa, giun tóc, giun móc.

Nhiễm giun ngoài ruột như giun chỉ (*Onchocerca volvulus*).

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: Có thể nhai và nuốt viên thuốc hoặc nghiền và trộn với thức ăn. Liều dùng như nhau cho trẻ em trên 2 tuổi và người lớn.

Giun móc, giun đũa, giun tóc và nhiễm nhiều giun: liều duy nhất 500mg, có thể lặp lại sau 2-3 tuần.

Giun chỉ *Onchocerca volvulus*: người lớn dùng 1g/lần, 2 lần/ngày, trong 28 ngày.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Bệnh nhân mắc bệnh gan. Người quá mẫn với Mebendazol.

Phụ nữ mang thai ở 3 tháng đầu và trẻ em dưới 2 tuổi.

Viêm ruột Crohn, viêm loét đại trực tràng (có thể làm tăng hấp thu và tăng độc tính của thuốc, đặc biệt khi dùng liều cao).

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



Công ty Cổ phần Dược VACOPHARM

59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An,
Tỉnh Long An

ĐT: (072) 3.829.311 • Fax: (072) 3.822.244

Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường
Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

www.vacopharm.com

Tiêu chuẩn áp dụng: DBVN 4

SĐK :

Số lô SX:

Ngày SX:

HD :

Mebendazol 500

Mebendazol 500mg



Hộp 25 vỉ x 4 viên nén bao phim

Mebendazol 500
Mebendazol 500mg

25 vỉ x 4 viên nén bao phim
Mebendazol 500
Mebendazol 500mg




THÀNH PHẦN

Mebendazol 500mg
Tá dược 1 viên nén bao phim

Để xa tầm tay của trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

llh

Mebendazol 500
Mebendazol 500mg

CHỈ ĐỊNH
Điều trị nhiễm một hoặc nhiều loại giun đường ruột như: giun đũa, giun tóc, giun móc.
Nhiễm giun ngoài ruột như giun chỉ (*Onchocerca volvulus*).

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: Có thể nhai và nuốt viên thuốc hoặc nghiền và trộn với thức ăn. Liều dùng như nhau cho trẻ em trên 2 tuổi và người lớn.
Giun móc, giun đũa, giun tóc và nhiễm nhiều giun: liều duy nhất 500mg, có thể lặp lại sau 2-3 tuần.
Giun chỉ *Onchocerca volvulus*: người lớn dùng 1g/lần, 2 lần/ngày, trong 28 ngày.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Bệnh nhân mắc bệnh gan. Người quá mẫn với Mebendazol.
Phụ nữ mang thai ở 3 tháng đầu và trẻ em dưới 2 tuổi.
Viêm ruột Crohn, viêm loét đại trực tràng (có thể làm tăng hấp thu và tăng độc tính của thuốc, đặc biệt khi dùng liều cao).



MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An,
Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3.829.311 • Fax: (072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường
Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
www.vacopharm.com

Tiêu chuẩn áp dụng: DBVN 4
SDK :
Số lô SX:
Ngày SX:
HD :



Mebendazol 500
Mebendazol 500mg

Hộp 50 vỉ x 4 viên nén bao phim

Mebendazol 500

Mebendazol 500mg

50 vỉ x 4 viên nén bao phim

Mebendazol 500

Mebendazol 500mg





THÀNH PHẦN

Mebendazol 500mg
Tá dược 1 viên nén bao phim

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN

Để xa tầm tay của trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

Mebendazol 500

Mebendazol 500mg

CHỈ ĐỊNH

Điều trị nhiễm một hoặc nhiều loại giun đường ruột như: giun đũa, giun tóc, giun móc.

Nhiễm giun ngoài ruột như giun chỉ (*Onchocerca volvulus*).

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: Có thể nhai và nuốt viên thuốc hoặc nghiền và trộn với thức ăn. Liều dùng như nhau cho trẻ em trên 2 tuổi và người lớn.

Giun móc, giun đũa, giun tóc và nhiễm nhiều giun: liều duy nhất 500mg, có thể lặp lại sau 2-3 tuần.

Giun chỉ *Onchocerca volvulus*: người lớn dùng 1g/lần, 2 lần/ngày, trong 28 ngày.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Bệnh nhân mắc bệnh gan. Người quá mẫn với Mebendazol.

Phụ nữ mang thai ở 3 tháng đầu và trẻ em dưới 2 tuổi.

Viêm ruột Crohn, viêm loét đại trực tràng (có thể làm tăng hấp thu và tăng độc tính của thuốc, đặc biệt khi dùng liều cao).

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM

59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An,
Tỉnh Long An

ĐT: (072) 3.829.311 • Fax: (072) 3.822.244

Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường
Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

www.vacopharm.com

Tiêu chuẩn áp dụng: DBVN 4

SĐK :

Số lô SX:

Ngày SX:

HD :

Mebendazol 500

Mebendazol 500mg




Hộp 100 vỉ x 4 viên nén bao phim

Mebendazol 500
Mebendazol 500mg

100 vỉ x 4 viên nén bao phim

Mebendazol 500
Mebendazol 500mg





THÀNH PHẦN

Mebendazol 500mg
Tá dược 1 viên nén bao phim

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN

Để xa tầm tay của trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

edh

Mebendazol 500

Mebendazol 500mg

CHỈ ĐỊNH

Điều trị nhiễm một hoặc nhiều loại giun đường ruột như: giun đũa, giun tóc, giun móc.

Nhiễm giun ngoài ruột như giun chỉ (*Onchocerca volvulus*).

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: Có thể nhai và nuốt viên thuốc hoặc nghiền và trộn với thức ăn. Liều dùng như nhau cho trẻ em trên 2 tuổi và người lớn.

Giun móc, giun đũa, giun tóc và nhiễm nhiều giun: liều duy nhất 500mg, có thể lặp lại sau 2-3 tuần.

Giun chỉ *Onchocerca volvulus*: người lớn dùng 1g/lần, 2 lần/ngày, trong 28 ngày.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Bệnh nhân mắc bệnh gan. Người quá mẫn với Mebendazol.

Phụ nữ mang thai ở 3 tháng đầu và trẻ em dưới 2 tuổi.

Viêm ruột Crohn, viêm loét đại trực tràng (có thể làm tăng hấp thu và tăng độc tính của thuốc, đặc biệt khi dùng liều cao).

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM

59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An,
Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3.829.311 • Fax: (072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường
Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
www.vacopharm.com

Tiêu chuẩn áp dụng: DBVN 4

SĐK :

Số lô SX:

Ngày SX:

HD :

Mebendazol 500

Mebendazol 500mg



Hộp 1 vỉ x 6 viên nén bao phim

Mebendazol 500


Mebendazol 500mg

1 vỉ x 6 viên nén bao phim

Mebendazol 500

Mebendazol 500mg





THÀNH PHẦN

Mebendazol 500mg

Tá dược 1 viên nén bao phim

Để xa tầm tay của trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,

tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

Mebendazol 500

Mebendazol 500mg

CHỈ ĐỊNH

Điều trị nhiễm một hoặc nhiều loại giun đường ruột như: giun đũa, giun tóc, giun móc.

Nhiễm giun ngoài ruột như giun chỉ (*Onchocerca volvulus*).

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: Có thể nhai và nuốt viên thuốc hoặc nghiền và trộn với thức ăn. Liều dùng như nhau cho trẻ em trên 2 tuổi và người lớn.

Giun móc, giun đũa, giun tóc và nhiễm nhiều giun: liều duy nhất 500mg, có thể lặp lại sau 2-3 tuần.

Giun chỉ *Onchocerca volvulus*: người lớn dùng 1g/lần, 2 lần/ngày, trong 28 ngày.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Bệnh nhân mắc bệnh gan. Người quá mẫn với Mebendazol.

Phụ nữ mang thai ở 3 tháng đầu và trẻ em dưới 2 tuổi.

Viêm ruột Crohn, viêm loét đại trực tràng (có thể làm tăng hấp thu và tăng độc tính của thuốc, đặc biệt khi dùng liều cao).

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM

59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An,

Tỉnh Long An

ĐT: (072) 3.829.311 • Fax: (072) 3.822.244

Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường

Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

www.vacopharm.com

Tiêu chuẩn áp dụng: DBVN 4

SĐK :

Số lô SX:

Ngày SX:

HD :

Mebendazol 500

Mebendazol 500mg

M.S.D.N: 1100112319 - C.T.C.P

CÔNG TY

CỔ PHẦN DƯỢC

VACOPHARM

TP. TÂN AN - T. LONG AN

M.S.D.N: 1100112319 - C.T.C.P

CÔNG TY

CỔ PHẦN DƯỢC

VACOPHARM

TP. TÂN AN - T. LONG AN


Hộp 5 vỉ x 6 viên nén bao phim

Mebendazol 500
Mebendazol 500mg

5 vỉ x 6 viên nén bao phim

Mebendazol 500

Mebendazol 500mg





THÀNH PHẦN

Mebendazol 500mg
Tá dược 1 viên nén bao phim

Để xa tầm tay của trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

lek

Mebendazol 500

Mebendazol 500mg

CHỈ ĐỊNH
Điều trị nhiễm một hoặc nhiều loại giun đường ruột như: giun đũa, giun tóc, giun móc.
Nhiễm giun ngoài ruột như giun chỉ (*Onchocerca volvulus*).
LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: Có thể nhai và nuốt viên thuốc hoặc nghiền và trộn với thức ăn. Liều dùng như nhau cho trẻ em trên 2 tuổi và người lớn.
Giun móc, giun đũa, giun tóc và nhiễm nhiều giun: liều duy nhất 500mg, có thể lặp lại sau 2-3 tuần.
Giun chỉ *Onchocerca volvulus*: người lớn dùng 1g/lần, 2 lần/ngày, trong 28 ngày.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Bệnh nhân mắc bệnh gan. Người quá mẫn với Mebendazol.
Phụ nữ mang thai ở 3 tháng đầu và trẻ em dưới 2 tuổi.
Viêm ruột Crohn, viêm loét đại trực tràng (có thể làm tăng hấp thu và tăng độc tính của thuốc, đặc biệt khi dùng liều cao).

Mọi thông tin chi tiết xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng



Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An,
Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3.829.311 • Fax: (072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường
Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
www.vacopharm.com


Tiêu chuẩn áp dụng: ĐBVN 4
SBK :
Số lô SX:
Ngày SX:
HD :



Mebendazol 500
Mebendazol 500mg

Hộp 50 vỉ x 6 viên nén bao phim

Mebendazol 500
Mebendazol 500mg

50 vỉ x 6 viên nén bao phim
Mebendazol 500
Mebendazol 500mg




THÀNH PHẦN

Mebendazol 500mg
Tá dược 1 viên nén bao phim

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN

Để xa tầm tay của trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

Handwritten signature

Mebendazol 500
Mebendazol 500mg

CHỈ ĐỊNH
Điều trị nhiễm một hoặc nhiều loại giun đường ruột như: giun đũa, giun tóc, giun móc.
Nhiễm giun ngoài ruột như giun chỉ (*Onchocerca volvulus*).
LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: Có thể nhai và nuốt viên thuốc hoặc nghiền và trộn với thức ăn. Liều dùng như nhau cho trẻ em trên 2 tuổi và người lớn.
Giun móc, giun đũa, giun tóc và nhiễm nhiều giun: liều duy nhất 500mg, có thể lặp lại sau 2-3 tuần.
Giun chỉ *Onchocerca volvulus*: người lớn dùng 1g/lần, 2 lần/ngày, trong 28 ngày.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Bệnh nhân mắc bệnh gan. Người quá mẫn với Mebendazol.
Phụ nữ mang thai ở 3 tháng đầu và trẻ em dưới 2 tuổi.
Viêm ruột Crohn, viêm loét đại trực tràng (có thể làm tăng hấp thu và tăng độc tính của thuốc, đặc biệt khi dùng liều cao).

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



Mebendazol 500
Mebendazol 500mg

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An,
Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3.829.311 • Fax: (072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường
Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
www.vacopharm.com

Tiêu chuẩn áp dụng: ĐBVN 4
SĐK :
Số lô SX:
Ngày SX:
HD :



Hộp 100 vỉ x 6 viên nén bao phim

Mebendazol 500


Mebendazol 500mg

100 vỉ x 6 viên nén bao phim

Mebendazol 500

Mebendazol 500mg







THÀNH PHẦN

Mebendazol 500mg
Tá dược 1 viên nén bao phim

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN

Để xa tầm tay của trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

lcl

Mebendazol 500

Mebendazol 500mg

CHỈ ĐỊNH

Điều trị nhiễm một hoặc nhiều loại giun đường ruột như: giun dũa, giun tóc, giun móc.

Nhiễm giun ngoài ruột như giun chỉ (*Onchocerca volvulus*).

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: Có thể nhai và nuốt viên thuốc hoặc nghiền và trộn với thức ăn. Liều dùng như nhau cho trẻ em trên 2 tuổi và người lớn.

Giun móc, giun dũa, giun tóc và nhiễm nhiều giun: liều duy nhất 500mg, có thể lặp lại sau 2-3 tuần.

Giun chỉ *Onchocerca volvulus*: người lớn dùng 1g/lần, 2 lần/ngày, trong 28 ngày.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Bệnh nhân mắc bệnh gan. Người quá mẫn với Mebendazol.

Phụ nữ mang thai ở 3 tháng đầu và trẻ em dưới 2 tuổi.

Viêm ruột Crohn, viêm loét đại trực tràng (có thể làm tăng hấp thu và tăng độc tính của thuốc, đặc biệt khi dùng liều cao).

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM

59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An,
Tỉnh Long An

ĐT: (072) 3.829.311 • Fax: (072) 3.822.244

Địa chỉ nhà máy: Km 1954, Quốc lộ 1A, Phường
Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
www.vacopharm.com

Tiêu chuẩn áp dụng: DBVN 4

SĐK :

Số lô SX:

Ngày SX:

HD :

Mebendazol 500

Mebendazol 500mg



2. Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất

Nhãn vỉ 1 viên

Mebendazol 500
Mebendazol 500mg

HD:  GMP - WHO
Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM

Số lô SX: **Mebendazol 500**
Mebendazol 500 mg



Nhãn vỉ 4 viên

Mebendazol 500
Mebendazol 500mg

HD:  GMP - WHO
Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM

Số lô SX: **Mebendazol 500**
Mebendazol 500 mg



Nhãn vỉ 6 viên

Mebendazol 500
Mebendazol 500mg

HD:  GMP - WHO
Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM

Số lô SX: **Mebendazol 500**
Mebendazol 500 mg



MEBENDAZOL 500

Thành phần

Mebendazol 500mg

Tá dược 1 viên nén bao phim

(Tinh bột sắn, Polyvinyl pyrrolidon K30, Acid stearic, Natri starch glycolat, Natri lauryl sulfat, Talc, Hydroxypropyl methylcellulose 615, Titan dioxyd, Polyethylen glycol 6000, Ponceau 4R, Caramel)

Quy cách đóng gói: kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

STT	Tóm tắt quy cách đóng gói
1	Ép vỉ, vỉ 1 viên, hộp 1 vỉ
2	Ép vỉ, vỉ 4 viên, hộp 1 vỉ
3	Ép vỉ, vỉ 4 viên, hộp 5 vỉ
4	Ép vỉ, vỉ 4 viên, hộp 25 vỉ
5	Ép vỉ, vỉ 4 viên, hộp 50 vỉ

STT	Tóm tắt quy cách đóng gói
6	Ép vỉ, vỉ 4 viên, hộp 100 vỉ
7	Ép vỉ, vỉ 6 viên, hộp 1 vỉ
8	Ép vỉ, vỉ 6 viên, hộp 5 vỉ
9	Ép vỉ, vỉ 6 viên, hộp 50 vỉ
10	Ép vỉ, vỉ 6 viên, hộp 100 vỉ

Dược lực học

Mebendazol là dẫn chất benzimidazol carbamat có phổ chống giun sán rộng. Thuốc có ích khi bị nhiễm nhiều loại giun, có hiệu quả cao trên giun đũa (*Ascaris lumbricoides*), giun móc (*Ancylostoma duodenale*, *Necator americanus*), giun tóc (*Trichuris trichiura*), giun kim (*Enterobius vermicularis*) và một số loại giun khác như giun xoắn (*Trichinella spiralis*), giun chỉ (*Mansonella perstans*, *Onchocerca volvulus*), ấu trùng giun di chuyển trong nội tạng (gây ra bởi *Toxocara canis* và *T. cati*), *Trichostrongylus*, *Dracunculus medinensis* và *Capillaria philippinensis*.

Tuy cơ chế tác dụng của mebendazol đối với giun sán chưa được biết đầy đủ, thuốc tỏ ra ức chế chọn lọc và không hồi phục hấp thu glucose và chất dinh dưỡng phân tử lượng thấp ở giun nhạy cảm với thuốc, dẫn đến cạn kiệt glycogen, làm tan rã các vi quản trong bào chất của các tế bào ruột và hấp thu của giun sán, cuối cùng làm giun sán chết. Mebendazol không ảnh hưởng đến nồng độ glucose trong máu người.

Dược động học

Mebendazol hấp thu kém qua đường tiêu hóa. Sinh khả dụng của thuốc khi uống là dưới 20%. Tuy nhiên, sự hấp thu có thể tăng lên nhiều lần, nếu uống thuốc cùng với thức ăn có chất béo. Nồng độ đỉnh trong huyết tương đạt được trong vòng 4 giờ, nhưng có sự khác nhau lớn giữa các cá thể và trong cùng một cá thể. Thể tích phân bố khoảng 1,2 lít/kg. Khoảng 90 – 95% thuốc liên kết với protein huyết tương. Không biết thuốc có vào sữa mẹ hay không nhưng qua được nhau thai.

Thuốc chuyển hóa chủ yếu ở gan tạo thành các chất chuyển hóa hydroxy và amino hóa mất hoạt tính và có tốc độ thanh thải thấp hơn thuốc mẹ.

Nửa đời thải trừ trong huyết tương của mebendazol khoảng 2,5 - 5,5 giờ (ở người có chức năng gan bình thường), hoặc có thể kéo dài tới 35 giờ trên người bị suy gan. Thuốc và các chất chuyển hóa sẽ thải qua mật vào phân (khoảng 95 %). Chỉ một lượng nhỏ (2 – 5 %) thải qua nước tiểu.

Chỉ định

Điều trị nhiễm một hoặc nhiều loại giun đường ruột như: giun đũa, giun tóc, giun móc.

Nhiễm giun ngoài ruột như giun chỉ (*Onchocerca volvulus*).

Liều dùng và cách dùng

Có thể nhai và nuốt viên thuốc hoặc nghiền và trộn với thức ăn. Liều dùng như nhau cho trẻ em trên 2 tuổi và người lớn.

Giun móc, giun đũa, giun tóc và nhiễm nhiều giun: liều duy nhất 500mg, có thể lặp lại sau 2-3 tuần.

Giun chỉ *Onchocerca volvulus*: người lớn dùng 1g/lần, 2 lần/ngày, trong 28 ngày.

Chống chỉ định

Bệnh nhân mắc bệnh gan. Người quá mẫn với Mebendazol.

Phụ nữ mang thai ở 3 tháng đầu và trẻ em dưới 2 tuổi.

Viêm ruột Crohn, viêm loét đại trực tràng (có thể làm tăng hấp thu và tăng độc tính của thuốc, đặc biệt khi dùng liều cao).

Thận trọng

Dùng liều cao mebendazol cần phải được theo dõi chặt chẽ công thức máu và chức năng gan. Nhìn chung, liều cao như vậy không được khuyến cáo cho những bệnh nhân có suy chức năng gan. Đã có thông báo về giảm bạch cầu trung tính, bạch cầu lympho và mất bạch cầu hạt khi dùng mebendazol liều cao.

Cần thông báo cho người bệnh giữ vệ sinh để phòng ngừa tái nhiễm và lây lan bệnh.

Phụ nữ có thai và cho con bú: không được dùng.

Người lái xe và vận hành máy móc: thận trọng vì thuốc có thể gây chóng mặt.

Tác dụng không mong muốn

Đau bụng thoáng qua, nôn, buồn nôn, tiêu chảy. Đau đầu, chóng mặt, ù tai, tê cẳng. Liều cao để điều trị nang sán: có thể gặp dị ứng (sốt, ban đỏ, mày đay, phù mạch, ngứa), tăng enzym gan, rụng tóc, suy tủy, giảm bạch cầu trung tính.

Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Tương tác thuốc

Cimetidin ức chế chuyển hóa mebendazol và có thể làm tăng nồng độ mebendazol trong huyết tương.

Dùng đồng thời với phenytoin hoặc carbamazepin sẽ làm giảm nồng độ của mebendazol trong huyết tương.

Quá liều và xử trí

Khi bị quá liều, có thể xảy ra rối loạn đường tiêu hóa kéo dài vài giờ.

Nên gây nôn và tẩy, có thể dùng than hoạt.

Hạn dùng, bảo quản, tiêu chuẩn áp dụng

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Bảo quản: nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

Tiêu chuẩn áp dụng: ĐĐVN 4.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ

Công ty Cổ phần Dược VACOPHARM

59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

Điện thoại: (072) 3826111 - 3829311

**Địa chỉ nhà máy: km 1954, Quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh,
Thành phố Tân An, Tỉnh Long An**

Long An, ngày 15 tháng 10 năm 2015

KT. Tổng Giám đốc Công ty

Phó Tổng Giám đốc



KS. Phan Thị Minh Thu

TRƯỞNG PHÒNG
Lỗ Minh Hùng

