

Lần đầu: 04 / 3 / 2014



HOYNH TẤN NAI
TỔNG GIÁM ĐỐC

Nhãn lọ



LA SX: AAMMY

HD : DDMMYY

Bảo quản nơi khô, mát
(dưới 30°C). Tránh ánh sáng.
Store in a dry, cool place
(below 30°C). Protect from light.
CTY CP PYMEPHARCO

*Pymepharco*

Moquin drop
0,5% Moxifloxacin

**5 ml**
Thuốc nhỏ mắt
Eye - drops

Mỗi ml chứa 5 mg Moxifloxacin
Each ml contains 5 mg of Moxifloxacin



HUYỀN TẤN NAM
TỔNG GIÁM ĐỐC

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

Rx

Thuốc bán theo đơn. Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sỹ.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Để xa tầm tay trẻ em.

Thuốc nhỏ mắt MOQUIN DROP 0,5% (Moxifloxacin 25 mg)

THÀNH PHẦN: Mỗi lọ 5 ml dung dịch chứa Moxifloxacin hydrochlorid tương đương Moxifloxacin 25 mg.

Tá dược: benzalkonium clorid, acid boric, natri clorid, natri hydroxid, acid hydrochlorid, nước cất pha tiêm.

DƯỢC LỰC HỌC

Moxifloxacin là một kháng sinh nhóm fluoroquinolon, có tác dụng kháng khuẩn do ức chế men topoisomerase II (DNA gyrase) và topoisomerase IV. DNA gyrase là enzym cần thiết cho quá trình tái tạo, sao chép và chỉnh sửa DNA vi khuẩn. Topoisomerase IV có vai trò quan trọng trong sự phân chia của chromosomal DNA trong tế bào vi khuẩn.

Moxifloxacin có tác dụng với *Streptococcus pneumoniae*, *Streptococcus pyogenes*, *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus viridans*, *Chlamydia pneumoniae*, *Mycoplasma pneumoniae*, *Legionella spp.*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, *Haemophilus influenzae*, *Moraxella catarrhalis*, *Enterobacter cloacae*, *E. coli*, *Klebsiella oxytoca*, *Legionella pneumophila*, *Proteus mirabilis*, *Fusobacterium spp.*

DƯỢC ĐỘNG HỌC

Khi dùng liều nhỏ 3 lần/ngày, nồng độ Cmax trung bình ở tình trạng bão hòa (2,7 ng/ml) và giá trị của diện tích dưới đường cong AUC hàng ngày (45 ng - giờ/ml) là 1600 và 1000 lần thấp hơn Cmax và diện tích dưới đường cong AUC được báo cáo sau khi điều trị bằng liều trình uống Moxifloxacin 400 mg. Thời gian bán hủy trong huyết tương của Moxifloxacin khoảng 13 giờ.

CHỈ ĐỊNH

Viêm kết mạc gây ra do các chủng vi khuẩn nhạy cảm với Moxifloxacin.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG

Liều thông thường: nhỏ 1 giọt mỗi mắt x 3 lần/ngày, dùng thuốc trong 7 ngày.

Liều dùng có thể thay đổi tùy theo triệu chứng của bệnh.

THẬN TRỌNG

Không dùng thuốc để tiêm vào mắt.

Không gắn kính sát trùng trong thời gian dùng thuốc.

Dùng thuốc trong thời gian dài có nguy cơ gây nhiễm trùng thứ phát, khi đó nên ngưng thuốc và tiến hành điều trị hỗ trợ.

Chỉ dùng thuốc ở phụ nữ có thai và cho con bú trừ khi thật cần thiết.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Bệnh nhân mẫn cảm với các thành phần của thuốc hay kháng sinh nhóm quinolon.

Trẻ em dưới 1 tuổi.

TƯƠNG TÁC THUỐC

Chưa thấy hiện tượng tương tác thuốc đặc biệt nào xảy ra với dung dịch thuốc nhỏ mắt MOQUIN DROP 0,5%.

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Chỉ sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú nếu lợi ích điều trị dự tính hơn hẳn rủi ro có thể xảy ra do dùng thuốc.



Handwritten signature

TÁC DỤNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC

Chưa có nghiên cứu về tác dụng của thuốc đối với khả năng lái xe và vận hành máy móc. Khi lái xe và vận hành máy móc cần tính đến khả năng đôi khi có thể nhòa mắt ngay sau khi nhỏ thuốc vào mắt.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

Những dấu hiệu và triệu chứng như: nóng hoặc khó chịu mắt, chảy nước mắt đôi khi có thể xảy ra.

Thông báo cho thầy thuốc tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

QUÁ LIỀU VÀ XỬ TRÍ

Viêm giác mạc, ban đỏ và tăng tiết nước mắt có thể xảy ra. Vì thuốc chỉ dùng ngoài nên không có nguy cơ gây ngộ độc toàn thân khi sử dụng.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất

BẢO QUẢN: Nơi khô, mát (dưới 30°C). Tránh ánh sáng.

TIÊU CHUẨN: Tiêu chuẩn cơ sở (TCCS).

TRÌNH BÀY: Hộp 01 lọ 5 ml.

CTY CP PYMEPHARCO

166 - 170 Nguyễn Huệ, Tuy Hoà, Phú Yên

GMP - WHO



PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thanh



HUỲNH TẤN NAM
TỔNG GIÁM ĐỐC