

MUSTRET 250
25 x 25mm
Box: 100 x 70 x 17 mm
Blister: 98 x 65 mm

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT
Lần đầu: 01/08/2013

Rx. PRESCRIPTION ONLY

MUSTRET250

MEPHENESIN 250 mg

Muscle relaxant



Oral route

Box of 2 blisters x 25 film coated tablets

THÀNH PHẦN: Mephenesin 250 mg và các tá dược vừa đủ 1 viên nén bao phim.
CHỈ ĐỊNH, CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:
Được chỉ định dùng để giảm đau.

ĐƯỢC QUẢN LÝ: Nơi nhiệt độ không quá 30°C.
ĐỂ XA TẦM TRẺ EM.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

WHO-GMP

Nhà sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN BV PHARMA
Số 2, Xã Tân Thành Tây, Huyện Củ Chi, TP. HCM.

Rx. THUỐC BÀN THEO ĐƠN

MUSTRET250

MEPHENESIN 250 mg

Thuốc dân cơ



Thuốc uống

Hộp 2 vỉ x 25 viên bao phim

WHO-GMP

COMPOSITION: Mephenesin 250 mg and excipients so, for 1 film coated tablet.
INDICATIONS, CONTRAINDICATIONS AND FURTHER INFORMATION:
Refer to package insert.
STORAGE: Temperature not over 30°C.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
READ PACKAGE INSERT CAREFULLY BEFORE USE.

Manufacture:
BV PHARMA JOINT STOCK COMPANY
Number 2 Tân Thành Tây Village, Củ Chi District, HCMC.



6/8/18/13

1/2

MUSTRET 250
10b x 25fcc
Box: 100 x 70 x 70 mm
Blister: 96 X 65 mm

Rx. PRESCRIPTION ONLY

MUSTRET 250

MEPHENESIN 250 mg

Muscle relaxant

Box of 10 blisters x 25 film coated tablets



THÀNH PHẦN:

Mephenesin 250 mg và các tá dược vừa đủ 1 viên nén bao phim.

CHỈ ĐỊNH: Mephenesin là một thuốc giãn cơ được dùng để hỗ trợ điều trị các cơn co cứng cơ kèm đau trong:

- Các bệnh lý thoái hóa đốt sống, các rối loạn tư thế cột sống, đau thắt lưng, đau lưng, căng cơ.

- Các tình trạng co thắt thực.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

Người lớn và trẻ em từ 15 tuổi uống 2 - 4 viên, 3 lần mỗi ngày (tức 1 - 2 viên mỗi ngày).

CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC TRƯỜNG THƯỜNG GẶP:

Được chỉ định dùng dẫn sử dụng thuốc.

BẢO QUẢN: Nhiệt độ không quá 30°C.

ĐỂ XA TÀI LIỆU NÀY.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC KHI DÙNG.

WHO-GMP

Nhà sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN BY PHARMA
Số 2, Xã Tân Thành Tây, Huyện Cửu Chi, TP. HCM

Rx. THUỐC BÀN THEO ĐƠN

MUSTRET 250

MEPHENESIN 250 mg



Thuốc giãn cơ

Thuốc uống
Hộp 10 vỉ x 25 viên bao phim

COMPOSITION:

Mephenesin 250 mg and excipients, in 1 film coated tablet.

INDICATIONS: Mephenesin is a muscle relaxant used for supportive treatment of painful muscle contractions associated with:

- Degenerative vertebral disorder and sacral vertebral disorder, lumbago, back pain and stiff neck.

- Other spastic states.

DOSEAGE AND ADMINISTRATION:

Adults and children from 15 years old: 2 - 4 tablets, taken 3 times daily (total is 6 - 12 tablets daily).

CONTRAINDICATIONS AND FURTHER INFORMATION:

Refer to package insert.

STORAGE: Temperature not exceeding 30°C.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

READ PACKAGE INSERT CAREFULLY BEFORE USE.

WHO-GMP

Manufacture:
BY PHARMA JOINT STOCK COMPANY
Humble 2, Tân Thành Tây Village, Cửu Chi District, HCMC

C.N: 411032000046-1.DMNG

CÔNG TY CỔ PHẦN

BY PHARMA

CHỈ MINH



MUSTRET 250
MEPHENESIN 250 mg

MUSTRET 250
(100vien)

Box: 55 X 75 X 55 mm

Label: 32 X 165 mm

Rx. THUỐC BÀN THEO ĐƠN

Rx. PRESCRIPTION ONLY

WHO-GMP

THÀNH PHẦN: Mephenesin 250 mg và các tá dược vừa đủ 1 viên nén bao phim.

CHỈ ĐỊNH: Mephenesin là một thuốc giãn cơ được dùng để hỗ trợ điều trị các cơn co cứng cơ kèm đau trong:

- Các bệnh lý thoái hóa đốt sống, các rối loạn tư thế cột sống, đau thắt lưng, đau lưng, cứng cổ.

- Các tình trạng cơ thắt khác

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

Người lớn và trẻ em từ 15 tuổi: Uống 2 - 4 viên, 3 lần mỗi ngày (tức 6 - 12 viên mỗi ngày).

CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC: Đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

BẢO QUẢN: Nơi nhiệt độ không quá 30°C

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC KHI DÙNG.

Nhà sản xuất: **CÔNG TY CỔ PHẦN BV PHARMA**
Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi, TP. HCM.



MUSTRET 250
MEPHENESIN 250 mg

Thuốc giãn cơ

Thuốc uống

Hộp 1 chai 100 viên bao phim

MUSTRET 250
MEPHENESIN 250 mg

WHO-GMP

COMPOSITION: Mephenesin 250 mg and excipients sq. for 1 film coated tablet.

INDICATIONS: Mephenesin is a muscle relaxant used for supportive treatment of painful muscle contractures associated with:

- Degenerative vertebral disorders and static vertebral disorders, lumbago, back pain and stiff neck.
- Other spastic states

DOSAGE AND ADMINISTRATION:

Adults and children from 15 years old: 2 - 4 tablets, taken 3 times daily (that is 6 - 12 tablets daily).

CONTRAINDICATIONS AND FURTHER INFORMATION:

Refer to package insert.

STORAGE: Temperature not exceeding 30°C

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

READ PACKAGE INSERT CAREFULLY BEFORE USE.

Manufacturer: **BV PHARMA JOINT STOCK COMPANY**
Hamlet 2, Tân Thạnh Tây Village, Củ Chi District, HCMC.



MUSTRET 250
MEPHENESIN 250 mg

Muscle relaxant

Oral route

Box of 1 bottle of 100 film coated tablets

SDK/Vsa:

Số lô SX/Lot No:

NSX/Mfd:

HD/Exp:



Rx. THUỐC BÀN THEO ĐƠN



MUSTRET 250
MEPHENESIN 250 mg

Thuốc giãn cơ

Thuốc uống

Chai 100 viên bao phim

THÀNH PHẦN: Mephenesin 250 mg và các tá dược vừa đủ 1 viên nén bao phim.

CHỈ ĐỊNH, CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC: Đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

BẢO QUẢN: Nơi nhiệt độ không quá 30°C

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC KHI DÙNG.

WHO-GMP

Nhà sản xuất: **CÔNG TY CỔ PHẦN BV PHARMA**
Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi, TP. HCM.

COMPOSITION: Mephenesin 250 mg and excipients sq. for 1 film coated tablet.

INDICATIONS, ADMINISTRATION, CONTRAINDICATIONS AND FURTHER INFORMATION: Refer to package insert.

STORAGE: Temperature not exceeding 30°C

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

READ PACKAGE INSERT CAREFULLY BEFORE USE.

Số lô SX/Lot No:

HD/Exp:

Manufacturer: **BV PHARMA JOINT STOCK COMPANY**
Hamlet 2, Tân Thạnh Tây Village, Củ Chi District, HCMC.

MUSTRET 250

(Chai 500 viên nén bao phim)
Label: 230 x 80 mm



Rx. THUỐC BÁN THEO ĐƠN



MUSTRET 250

MEPHENESIN 250 mg

Thuốc dẫn cơ

Thuốc uống

Chai 500 viên nén bao phim

(Thuốc dùng cho bệnh viện)

THÀNH PHẦN:

Mephenesin 250 mg và các tá dược vừa đủ 1 viên nén bao phim.

CHỈ ĐỊNH:

Mephenesin là một thuốc dẫn cơ được dùng để hỗ trợ điều trị các cơn co cứng cơ kèm đau trong:

- Các bệnh lý thoái hóa đốt sống, các rối loạn tư thế cột sống, đau thắt lưng, đau lưng, cứng cổ.
- Các tình trạng cơ thắt khác

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

Người lớn và trẻ em từ 15 tuổi: Uống 2 - 4 viên, 3 lần mỗi ngày (tức 6 - 12 viên một ngày).

CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:

Đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

BẢO QUẢN: Nơi nhiệt độ không quá 30°C.

ĐỂ XA TAY TRẺ EM.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

Số lô SX/Lot No.:

NSC/Mô:

Họ/Đáp:

Nhà sản xuất:

CÔNG TY CỔ PHẦN BV PHARMA

Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi, TP.HCM.

COMPOSITION:

Mephenesin 250 mg and excipients sq. for 1 film coated tablet.

INDICATIONS:

Mephenesin is a muscle relaxant used for supportive treatment of painful muscle contractures associated with:

- Degenerative vertebral disorder and static vertebral disorder, lumbago, back pain and stiff neck.
- Other spastic states

DOSAGE AND ADMINISTRATION:

Adults and children from 15 years old: 2 - 4 tablets, taken 3 times daily (that is 6 - 12 tablets daily).

CONTRAINDICATIONS AND FURTHER INFORMATION:

Refer to package insert.

STORAGE: Temperature not exceeding 30°C.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

READ PACKAGE INSERT CAREFULLY BEFORE USE.

SĐK/Visa:

WHO-GMP

Manufacturer:

BV PHARMA JOINT STOCK COMPANY

Hamlet 2, Tân Thạnh Tây Village, Củ Chi District, HCMC.



MUSTRET 250

(Chai 1000 viên nén bao phim)
Label: 200 x 80 mm

CÔNG TY
CỔ PHẦN
BV PHARMA

THÀNH PHẦN:

Mephenesin 250 mg và các tá dược vừa đủ 1 viên nén bao phim.

CHỈ ĐỊNH: Mephenesin là một thuốc giãn cơ được dùng để hỗ trợ điều trị các cơn co cứng cơ kèm đau trong:

- Các bệnh lý thoái hóa đốt sống, các rối loạn tư thế cột sống, đau thắt lưng, đau lưng, cứng cổ.

- Các tình trạng co thắt khác

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

Người lớn và trẻ em từ 15 tuổi: Uống 2-4 viên, 3 lần mỗi ngày (tức 6-12 viên một ngày).

CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:

Đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

BẢO QUẢN: Nơi nhiệt độ không quá 30°C

ĐỂ XA TẦM TAY CỦA TRẺ EM.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

Số 10 SV/Lot No:

NSX/Mô:

HO/Exp:

Nhà sản xuất:

CÔNG TY CỔ PHẦN PHARMA

Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi, TP.HCM.

Rx. THUỐC BÁN THEO ĐƠN



MUSTRET 250

MEPHENESIN 250 mg

Thuốc giãn cơ

Thuốc uống

Chai 1000 viên nén bao phim

(Thuốc dùng cho bệnh viện)

COMPOSITION:

Mephenesin 250 mg and excipients sq. for 1 film coated tablet.

INDICATIONS: Mephenesin is a muscle relaxant used for supportive treatment of painful muscle contractures associated with:

- Degenerative vertebral disorders and static vertebral disorders, lumbago, back pain and stiff neck.

- Other spastic states

DOSAGE AND ADMINISTRATION:

Adults and children from 15 years old: 2-4 tablets, taken 3 times daily (that is 6-12 tablets daily).

CONTRAINDICATIONS AND FURTHER INFORMATION:

Refer to package insert.

STORAGE: Temperature not exceeding 30°C

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

READ PACKAGE INSERT CAREFULLY BEFORE USE.

SDK/Visa:

WHO-GMP

Manufacturer:

BV PHARMA JOINT STOCK COMPANY

Hamlet 2, Tân Thạnh Tây Village, Củ Chi District, HCMC.

MUSTRET 250

Mephenesin 250 mg

CÔNG TY
CÓ PHẦN
BV PHARMA

THÀNH PHẦN: Mephenesin 250 mg và các tá dược gồm Tinh bột hồ hoá, Silic dioxyd dạng keo khan, Magnesi stearat, Tale, Opadry cam, Opadry trong suốt và Nước tinh khiết vừa đủ 1 viên nén bao phim.

DẠNG BAO CHẾ: Viên nén bao phim.

QUI CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 2 vỉ x 25 viên, hộp 10 vỉ x 25 viên, hộp 1 chai 100 viên. Chai 500 viên và chai 1000 viên (dùng cho bệnh viện)

DƯỢC LỰC: Mephenesin là một chất dẫn cơ, an thần nhẹ, tác dụng ở trung ương.

DƯỢC ĐỘNG HỌC: Mephenesin được hấp thu từ từ qua đường tiêu hóa, phân phối rộng đến các mô cơ thể, nồng độ đỉnh trong huyết tương đạt được sau 1 giờ, thời gian bán thải là 45 phút, chuyển hóa ở gan, bài tiết chủ yếu qua nước tiểu ở dạng chất chuyển hóa và một lượng nhỏ ở dạng không đổi.

CHỈ ĐỊNH ĐIỀU TRỊ:

Mephenesin là một thuốc dẫn cơ được dùng để hỗ trợ điều trị các cơn co cứng cơ kèm đau trong:

- Các bệnh lý thoái hóa đốt sống, các rối loạn tư thế cột sống, đau thắt lưng, đau lưng, cứng cổ.
- Các tình trạng co thắt khác

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG :

Người lớn và trẻ em từ 15 tuổi: Uống 2 - 4 viên, 3 lần mỗi ngày(tức 6 - 12 viên một ngày).

CHỐNG CHỈ ĐỊNH :

- Quá mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.
- Các bệnh nhân bị rối loạn chuyển hóa Porphyrine.
- Trẻ em dưới 15 tuổi, phụ nữ có thai và cho con bú.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI SỬ DỤNG:

- Không uống rượu trong thời gian dùng thuốc.

TƯƠNG TÁC VỚI CÁC THUỐC KHÁC VÀ CÁC DẠNG TƯƠNG TÁC KHÁC.

- Dùng cùng lúc với các thuốc ức chế thần kinh trung ương khác có thể làm tăng tác dụng không mong muốn của thuốc.
- Rượu cũng làm tăng tác dụng phụ của Mephenesin.

TRƯỜNG HỢP CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ :

Không dùng thuốc cho phụ nữ có thai và phụ nữ trong thời kỳ cho con bú.

TÁC DỤNG ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC :

Cần thận khi sử dụng cho người lái xe và vận hành máy móc do thuốc có thể gây buồn ngủ.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:

Khi quá liều làm giảm trương lực cơ, hạ huyết áp, rối loạn thị giác, liệt hô hấp, không phối hợp được động tác. Cần phải được nhập viện để cấp cứu và điều trị theo triệu chứng.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

- Đôi khi bị buồn ngủ, mệt mỏi, kém ăn, buồn nôn, ợi mửa, dị ứng da.
- Một vài trường hợp gây sốc phản vệ được ghi nhận.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

BẢO QUẢN: Nhiệt độ không quá 30°C.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

THUỐC NÀY CHỈ DÙNG THEO ĐƠN CỦA THÁY THUỐC.

ĐỂ XA TÀM TAY TRẺ EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN CỦA BÁC SĨ

NHÀ SẢN XUẤT: CÔNG TY CỔ PHẦN BV PHARMA

Địa chỉ: Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi, TP. HCM.

Điện thoại: 08 - 37950.611 / 957 / 994

Fax: 08 - 37950.614 **Email:** info@bvpharma.com.vn


PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thanh