

Rx: Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc



NOVEAR

Docusate natri 5 mg/ml

Để xa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Thành phần:

Mỗi ml chứa:

Thành phần hoạt chất:

Docusate natri..... 5 mg

Thành phần tá dược:

Glycerin, methyl paraben, propyl paraben, nước tinh khiết vừa đủ

Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ tai

Mô tả: Dung dịch đồng nhất, không chứa tiểu phân lạ

pH: 4,0- 8,0

Chỉ định

Hỗ trợ loại bỏ ráy tai ở người lớn, người già và trẻ em

Liều dùng và cách dùng

- Người lớn, người già: Nhỏ thuốc lấp đầy lỗ tai cần điều trị 1 lần/ ngày, nhỏ vào 2 buổi tối liên tiếp trước khi ngủ nếu cần thiết. Nếu tình trạng không cải thiện nên hỏi ý kiến bác sĩ.

- Trẻ em: Giống như liều người lớn

- Cách dùng:

Thời gian tốt nhất để sử dụng là buổi tối trước khi đi ngủ, nghiêng đầu và nhỏ đầy thuốc vào ống tai, sau đó đặt nút bông gòn vào trong tai. Loại bỏ nút bông gòn vào buổi sáng và lặp lại việc điều trị vào đêm tiếp theo. Nếu quên dùng liều tiếp theo, sử dụng thuốc ngay khi nhớ ra.

Chống chỉ định

Không dùng trong trường hợp thủng màng nhĩ, tai bị đau, viêm hoặc mẫn cảm với các thành phần của thuốc

Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc

Nếu thấy đau hoặc viêm tai thì ngừng sử dụng thuốc và báo cho bác sĩ điều trị

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú

Thuốc sử dụng được cho phụ nữ có thai và cho con bú

Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc

Không ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc

Tương tác, tương kỵ của thuốc

Chưa có nghiên cứu về sự tương kỵ với các thuốc khác

Tác dụng không mong muốn của thuốc

- Hệ thống miễn dịch: gây quá mẫn hoặc các phản ứng dị ứng

- Da: viêm da tiếp xúc và các phản ứng dị ứng da

- Rối loạn chung: phản ứng tại chỗ hiếm khi xảy ra bao gồm cảm giác châm chích thoáng qua, kích ứng. Ống tai bị chấn thương hoặc viêm có thể dẫn tới triệu chứng đau

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc



Quá liều và cách xử trí

Thừa dung dịch nhỏ tai có thể rò rỉ dịch từ tai, điều trị bất kỳ tác dụng không mong muốn xuất hiện, ví dụ như kích ứng da khi có triệu chứng.

Đặc tính dược lực học

Mã ATC: A06AA02

Nhóm tác dụng dược lý: các thuốc khác dùng cho tai

Ráy tai thường gây tắc nghẽn phần ống ngoài tai, là một hỗn hợp chứa gần 50% chất béo do các tuyến bã nhờn ceruminous (chuyên sản xuất chất sáp) sản xuất ra.

Thành phần chính của ráy tai bao gồm tế bào da chết, chất bẩn từ bên ngoài và lông. Những thành phần không chứa chất béo này tạo thành một lớp giữ các hạt chất béo và tạo thành khối ráy tai.

Việc tiết các loại dầu hoặc dung môi làm các khối ráy tai trở nên rắn chắc hơn. Nếu thêm dung dịch vào khối này có thể làm mềm khối ráy tai.

Thuốc nhỏ tai Novear có sức căng bề mặt nhỏ và khả năng trộn lẫn tốt sẽ nhanh chóng xâm nhập vào khối ráy tai khô giúp giảm độ rắn chắc của khối ráy tai và tạo thành các khối nhỏ mềm hơn. Việc này sẽ giúp việc lấy ráy tai được dễ dàng trong trường hợp ít nghiêm trọng hoặc mạn tính, ráy tai có thể được đẩy ra nhờ quá trình sinh lý bình thường.

Đặc tính dược động học

Chưa có dữ liệu về việc hấp thu của thuốc vào cơ thể sau khi nhỏ vào tai. Tuy nhiên, sự hấp thu vẫn có thể xảy ra nhưng với mức độ rất thấp.

Qui cách đóng gói

Lọ 10 ml, Hộp 1 lọ

Lọ 15 ml, Hộp 1 lọ

Bảo quản: Trong bao bì kín, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. 28 ngày kể từ ngày mở nắp lần đầu tiên.

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS



Nhà sản xuất



Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín,
thành phố Hà Nội, Việt Nam

