

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 01/11/2018

CSSX: CT CÓ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

10ml KHÔNG ĐƯỢC TIÊM



Overgra

BỔ GAN - TIÊU ĐỘC

Thuốc cao lỏng

Rx Thuốc kê đơn

Overgra

BỔ GAN - TIÊU ĐỘC



Hộp 20 ống x 10ml

DPT
HATAPHAR

Overgra

BỔ GAN - TIÊU ĐỘC

Thành phần:
Mỗi 10ml cao lỏng chứa:
Dược liệu đắp hạ châu
(*Herba Phyllanthi lunarioides*) 10g
Tá được vđ..... 10ml

Chỉ định:
Viêm gan cấp và mạn tính, viêm gan B. Suy giảm chức năng gan với các biểu hiện: Mệt mỏi, chán ăn, ăn uống khó tiêu, đi ỉn, ỉở ngứa, vàng da, bí đại tiểu tiện, táo bón. Bảo vệ và phục hồi chức năng gan cho những người uống nhiều rượu, bia hoặc sử dụng thuốc chống lao dài ngày. Phòng và hỗ trợ điều trị xơ gan.

Cách dùng: Uống sau các bữa ăn, mỗi đợt dùng kéo dài 30 ngày.

Liều dùng:

- **Người lớn:** Uống 20-40 ml/ngày, chia làm nhiều lần.
- **Trẻ em:** Uống 5-10 ml/ngày, chia làm nhiều lần.

Overgra

BỔ GAN - TIÊU ĐỘC

Chống chỉ định:
Mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Người bị viêm tắc mật. Phụ nữ có thai.

Bảo quản:
Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

Để xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Cơ sở sản xuất:
CÔNG TY C.P DƯỢC PHẨM HÀ TÂY
Tổ dân phố số 4, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội.

SDK :
Số lô SX :
NSX :
HD :

KHÔNG ĐƯỢC TIÊM

Thuốc cao lỏng

Rx Thuốc kê đơn

Overgra

BỔ GAN - TIÊU ĐỘC



Hộp 20 ống x 10ml

DPT
HATAPHAR

MV-304128
ĐB2852

Thuốc cao lỏng

Overgra

Thuốc cao lỏng

Hộp 1 lọ x 100ml

RX Thuốc kê đơn

Overgra

BỔ GAN - TIÊU ĐỘC





Thuốc cao lỏng

RX Thuốc kê đơn

Overgra

BỔ GAN - TIÊU ĐỘC



Lọ 100ml



Thành phần:
Mỗi 10ml cao lỏng chứa:
Dược liệu điệp hạ châu
(Herba Phyllanthi urinariae).....10g
Tá dược vđ.....10ml

Chỉ định: Viêm gan cấp và mạn tính, viêm gan B. Suy giảm chức năng gan với các biểu hiện: Mệt mỏi, chán ăn, ăn uống khó tiêu, dị ứng, lở ngứa, vàng da, bí đại tiểu tiện, táo bón. Bảo vệ và phục hồi chức năng gan cho những người uống nhiều rượu, bia hoặc sử dụng thuốc chống lao dài ngày. Phòng và hỗ trợ điều trị xơ gan.

Cách dùng: Uống sau các bữa ăn, mỗi đợt dùng kéo dài 30 ngày.

Liều dùng:
Người lớn: Uống 20-40 ml/ngày, chia làm nhiều lần.
Trẻ em: Uống 5-10 ml/ngày, chia làm nhiều lần.

Chống chỉ định:
Mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Người bị viêm tắc mật. Phụ nữ có thai.

Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

Để xa tầm tay của trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Cơ sở sản xuất:
CÔNG TY C.P DƯỢC PHẨM HÀ TÂY
Tổ dân phố số 4, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội

Số lô SX :
NSX :
HD :

Thuốc cao lỏng

Hộp 1 lọ x 100ml

RX Thuốc kê đơn

Overgra

BỔ GAN - TIÊU ĐỘC

Chống chỉ định:
Mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Người bị viêm tắc mật. Phụ nữ có thai.


Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

Để xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Cơ sở sản xuất:
CÔNG TY C.P DƯỢC PHẨM HÀ TÂY
Tổ dân phố số 4, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội

SĐK :
Số lô SX :
NSX :
HD :



Thuốc cao lỏng

Hộp 1 lọ x 100ml

RX Thuốc kê đơn

Overgra

BỔ GAN - TIÊU ĐỘC





Thuốc cao lỏng

Hộp 1 lọ x 100ml

RX Thuốc kê đơn

Overgra


BỔ GAN - TIÊU ĐỘC

Thành phần:
Mỗi 10ml cao lỏng chứa:
Dược liệu điệp hạ châu
(Herba Phyllanthi urinariae).....10g
Tá dược vđ.....10ml

Chỉ định:
Viêm gan cấp và mạn tính, viêm gan B. Suy giảm chức năng gan với các biểu hiện: Mệt mỏi, chán ăn, ăn uống khó tiêu, dị ứng, lở ngứa, vàng da, bí đại tiểu tiện, táo bón. Bảo vệ và phục hồi chức năng gan cho những người uống nhiều rượu, bia hoặc sử dụng thuốc chống lao dài ngày. Phòng và hỗ trợ điều trị xơ gan.

Cách dùng: Uống sau các bữa ăn, mỗi đợt dùng kéo dài 30 ngày.

Liều dùng:
Người lớn: Uống 20-40 ml/ngày, chia làm nhiều lần.
Trẻ em: Uống 5-10 ml/ngày, chia làm nhiều lần.



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

1. Tên thuốc: **Rx OVERGRA**

2. Các dấu hiệu lưu ý và khuyến cáo khi dùng thuốc:

“Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc”

“Đề xa tầm tay trẻ em”

“Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng”

3. Thành phần công thức thuốc: Mỗi 10 ml cao lỏng chứa:

Thành phần dược chất: Dược liệu diệp hạ châu (*Herba Phyllanthi urinariae*) 10g

Thành phần tá dược: Acid benzoic, aspartam, acid citric, natri citrat, ethanol 96%, nước tinh khiết.

4. Dạng bào chế: Cao lỏng

Chất lỏng sánh, màu nâu đen, mùi thơm, vị ngọt, hơi đắng.

5. Chỉ định:

Viêm gan cấp và mạn tính, viêm gan B.

Suy giảm chức năng gan với các biểu hiện: Mệt mỏi, chán ăn, ăn uống khó tiêu, dị ứng, lở ngứa, vàng da, bí đại tiểu tiện, táo bón.

Bảo vệ và phục hồi chức năng gan cho những người uống nhiều rượu, bia hoặc sử dụng thuốc chống lao dài ngày.

Phòng và hỗ trợ điều trị xơ gan.

6. Cách dùng, liều dùng:

- **Cách dùng:** Uống sau các bữa ăn, mỗi đợt dùng kéo dài 30 ngày.

- **Liều lượng:**

Người lớn: Uống 20-40 ml/ngày, chia làm nhiều lần.

Trẻ em: Uống 5-10 ml/ngày, chia làm nhiều lần.

7. Chống chỉ định:

Mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

Người bị viêm tắc mật.

Phụ nữ có thai.

8. Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc:

Thuốc có chứa aspartam: Aspartam chứa một lượng phenylalanin, có thể gây hại trên những người bị phenylketon niệu nên thận trọng khi dùng.

9. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

- **Thời kỳ mang thai:** Không dùng cho phụ nữ có thai.

- **Thời kỳ cho con bú:** Tính an toàn của thuốc chưa được chứng minh, không nên sử dụng thuốc trong thời kỳ cho con bú.

10. Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc:

Thuốc dùng được cho người lái xe và vận hành máy móc.

11. Tương tác, tương kỵ của thuốc:

Tương tác thuốc: Chưa có báo cáo.

Tương kỵ thuốc: Do không có các nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này và thuốc khác.

12. Tác dụng không mong muốn của thuốc:

Chưa ghi nhận được báo cáo về phản ứng có hại của thuốc.

Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc.

Ngưng sử dụng thuốc và hỏi ý kiến bác sĩ nếu có bất kỳ dấu hiệu mới bất thường nào xảy ra.



13. Quá liều và cách xử trí:

Quá liều: Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc.

Xử trí: Tích cực theo dõi để có biện pháp xử lý kịp thời.

14. Quy cách đóng gói:

Hộp 20 ống x 10ml, hộp 1 lọ x 100ml. Kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

15. Điều kiện bảo quản và hạn dùng, tiêu chuẩn chất lượng của thuốc:

- **Bảo quản:** Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.

- **Hạn dùng:** 24 tháng kể từ ngày sản xuất. **Không được dùng thuốc đã quá hạn dùng.**

- **Tiêu chuẩn chất lượng:** TCCS.

16. Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất:

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Địa chỉ: Tổ dân phố số 4, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội

ĐT: 024.33522203 FAX: 024.33522203

ĐT: 024.33824685 FAX: 024.33829054

Hotline: 024.33522525

