


MẪU NHÃN HỘP

Sản phẩm : Viên nang **PHILBIBIF DAY 20 viên**
Kích thước hộp : 110 x 78 x 25 mm
Tỷ lệ : 70%
Nội dung : như mẫu



MẪU NHÃN VĨ


Sản phẩm : Viên nang **PHILBIBIF DAY**
Kích thước vỉ : 100 x 74 mm
Tỷ lệ : 100%
Nội dung : như mẫu



Số lô SX, HD sẽ được dập nổi trên vỉ



MẪU NHÃN TOA THUỐC



Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ.
Tránh xa tầm tay trẻ em.

PHILBIBIF DAY viên nang mềm

SDK:...

THÀNH PHẦN

Mỗi viên nang mềm chứa:

Hoạt chất:

Acetaminophen.....	325 mg
Dextromethorphan HBr.....	10 mg
Phenylephrine HCl.....	5 mg

Tá dược:

Polyethylen glycol 400, Polyethylen glycol 600, Propylen glycol, Povidon, Gelatin, Glycerin đậm đặc, D-sorbitol, Màu xanh số 1, Màu đỏ số 40, Ethyl vanillin, Nước tinh khiết.

CHỈ ĐỊNH

Làm giảm các triệu chứng cảm cúm như nhức đầu, đau họng, đau cơ, xương khớp, sốt kèm ho, nghẹt mũi, chảy nước mũi, viêm xoang.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG

Người lớn và trẻ em > 12 tuổi: mỗi lần uống 2 viên, cách 4 giờ uống lại. Không quá 06 viên mỗi 24 giờ.

Người già > 65 tuổi: theo sự chỉ dẫn của thầy thuốc.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Bệnh nhân mẫn cảm với thuốc này.

Trẻ em dưới 12 tuổi.

Suy hô hấp, cao huyết áp, bệnh mạch vành tim nặng.

Bệnh gan nặng hay suy chức năng gan.

Đang dùng hoặc đã dùng chất ức chế monoaminoxidase trong vòng 14 ngày.

THẬN TRỌNG

Không nên dùng quá liều khuyến cáo hay dùng kéo dài mà không có sự chỉ dẫn của bác sĩ.

Người lớn tuổi, phụ nữ có thai và cho con bú: theo sự chỉ dẫn của thầy thuốc.

Thận trọng về gan: vì trong thành phần có chứa acetaminophen, sự tổn thương tế bào gan nặng có thể xảy ra khi dùng thuốc quá 06 viên/24 giờ, hay dùng chung với thuốc khác có chứa acetaminophen, hoặc uống rượu trong thời gian dùng thuốc.

Nếu tình trạng viêm họng nặng, kéo dài hơn 2 ngày, có kèm theo sốt, nhức đầu, phát ban, buồn nôn, nôn, nên ngừng thuốc và đi khám bác sĩ.

Nếu triệu chứng không được cải thiện tốt trong vòng 7 ngày hay trở nên tồi tệ hơn, hãy thông báo với bác sĩ.

Thận trọng khi dùng thuốc ở những người có bệnh về gan, bệnh tim mạch, tăng huyết áp, rối loạn tiêu hóa, bệnh về tuyến giáp, tiểu đường, hen suyễn, rối loạn đường hô hấp dưới.

TUƯƠNG TÁC THUỐC

Với thuốc chống đông máu, acetaminophen làm tăng nhẹ thời gian prothrombin.

Với Phenobarbital, làm tăng độc tính trên gan của acetaminophen.

Với thuốc ức chế thần kinh trung ương, có thể làm tăng cường tác dụng ức chế thần kinh khi dùng cùng với dextromethorphan.

Các chất ức chế monoaminoxidase và chất chặn beta giao cảm làm tăng tác dụng giống giao cảm của phenylephrine.

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Chỉ nên dùng thuốc ở phụ nữ có thai và cho con bú, trừ khi thật cần thiết.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

Tác dụng phụ có thể gặp như buồn nôn, lo âu, ban da (ban đỏ hoặc mẩn ngứa).

Ít gặp: buồn nôn, chóng mặt, tăng huyết áp kèm phù phổi, loạn nhịp tim, nhịp tim chậm, cơ mạch ngoại vi và nội tạng, suy hô hấp, ảo giác hoang tưởng, mờ giác mạc.

Hiếm gặp: rối loạn tiêu hóa, hành vi kỳ quặc do ngộ độc, ức chế hệ thần kinh trung ương, loạn tạo máu. Trường hợp uống lặp lại liều lớn Acetaminophen hoặc do uống thuốc dài ngày có nguy cơ viêm gan hoại tử tế bào gan.

Thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

QUẢ LIỀU

Chưa có báo cáo về các trường hợp quá liều.

ĐÓNG GÓI: 10 viên nang mềm/ vi. 02 vi/ hộp.

BẢO QUẢN: Bao bì kín, nơi khô mát, tránh ánh sáng, dưới 30°C.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

* Không dùng thuốc quá hạn sử dụng.

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: Tiêu chuẩn cơ sở.

Sản xuất tại

Công ty TNHH PHIL INTER PHARMA

Số 25, Đường số 8, VSIP, Thuận An, Bình Dương.

Read dosage and administration carefully before using.
For any more information, please consult your doctor or pharmacist.
Keep out of reach of children.

PHILBIBIF DAY soft cap.

Visa No:...

COMPOSITION

Each soft capsule contains:

Active ingredient:

Acetaminophen.....	325 mg
Dextromethorphan HBr.....	10 mg
Phenylephrine HCl.....	5 mg

Inactive ingredients:

Polyethylene glycol 400, Polyethylene glycol 600, Propylene glycol, Povidon, Gelatin, Concentrated glycerin, D- sorbitol, blue No. 1, red No. 40, Ethyl vanillin, purified water.

INDICATIONS

Relief the cold/flu symptoms: headache, sore throat, myalgia, arthritis, fever including cough, stuffiness, rheumatism and sinusitis.

DOSE & ADMINISTRATION

Adults, children > 12 years: 2 caps/time, repeated every 4 hours. Do not take more than 06 caps in 24 hours.

Elderly > 65 years: prescribed as the doctor.

CONTRAINDICATIONS

Hypersensitive with this drug.

Children < 12 years.

Respiration deficiency, hypertension, severe heart blood vessel disease.

Severe hepatic or impaired liver function.

During or within 14 days of MAOIs.

PRECAUTIONS

Do not take more than the recommended dose or use for longer than prescribed without checking with your doctor.

Elderly, pregnancy and lactation: prescribed as the doctor.

Liver warning: This product contains acetaminophen. Severe liver damage may occur if you take more than 06 caps in 24 hours, or with other drugs containing acetaminophen or more alcoholic drinks every day while using this product.

If sore throat is severe, persists for more than 2 days, is accompanied or followed by fever, headache, rash, nausea, or vomiting, consult a doctor promptly.

If your symptoms do not get better within 7 days or if they get worse, check with your doctor.

Should be used with caution in patients with hepatic dysfunction, cardiovascular disease, hypertension, GI obstruction, thyroid disease, diabetes, asthma, lower respiratory disorders.

INTERACTIONS

Concurrent use with anticoagulant, acetaminophen may prolong the prothrombin time.

Concurrent use with phenobarbital may increase the risk of hepatotoxicity with acetaminophen.

Concurrent use with central nervous system (CNS) depression-producing medications may potentiate the CNS depressant effects of dextromethorphan.

Concurrent use with MAO inhibitors and beta-blockers may increase pressor effects of sympathomimetics of phenylephrine.

PREGNANCY AND LACTATION

This drug should be used for pregnancy and lactation only if clearly needed.

SIDE EFFECTS

The side effects may occur such as nervousness, anxiety, skin rash (erythematous or urticarial).

Less common: nausea, dizziness, pulmonary hypertension, arrhythmia, bradycardia, internal organs and peripheral vasoconstriction, respiration deficiency, paranoid hallucinations, blurred cornea.

Rare: digestive disorders, strange behaviour due to poisoning, CNS inhibition, blood dyscrasias. Hepatocellular necrosis may occur from repeated ingestion of large doses or from chronic ingestion of Acetaminophen.

Inform your doctor or pharmacist in case of any adverse reactions related to drug use.

OVERDOSAGE

No reported.

PACKAGE: 10 soft capsules/ blister. 02 blisters/ box.

STORAGE: In a hermetic container, cool and dry place, protect from light, below 30°C.

SHELF LIFE: 36 months from manufacturing date.

* Do not use if the drug is out of date.

SPECIFICATION: Home standard.

Manufactured by

PHIL INTER PHARMA Co., LTD.

No. 25, Street No. 8, VSIP, Thuan An, Binh Duong.

TP. ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

LÊ THANH HIẾU